

|   |   |
|---|---|
|  <p>Programma<br/>di Sviluppo Rurale<br/>dell'Emilia-Romagna<br/>2007/2013</p> | <b>PROVINCIA DI PARMA</b>                               |
|   | <h1>Bollettino di Produzione Integrata e Biologica</h1> |

## n. 32 del 08 agosto 2014

### PREVISIONI DEL TEMPO DAL 09 AL 14 AGOSTO 2014.

**SABATO 09:** cielo sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio con locali rovesci più probabili sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve aumento (minime 14-20°C, massime 20-31°C).

**DOMENICA 10:** cielo sereno. Temperature in lieve aumento.

**TENDENZA DEL TEMPO DA LUNEDI' 11 A GIOVEDI' 14 AGOSTO 2014:** condizioni di tempo stabile e soleggiato con possibili locali rovesci nelle ore centrali. Temperature stazionarie con massime sui 32-33°C.

### Andamento meteorologico dal 30 luglio al 05 agosto 2014

| Stazione                 | Altitudine m s.l.m. | Temperatura (°C) |        |       |                 |                  | Escursione termica | Umidità relativa media | Precipitazioni (mm) |
|--------------------------|---------------------|------------------|--------|-------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|                          |                     | Massima          | Minima | Media | Minima assoluta | Massima assoluta |                    |                        |                     |
| CASATICO                 | 350                 | 28,7             | 16,8   | 22,0  | 14,5            | 30,6             | 11,9               | 69                     | 60,8                |
| MAIATICO                 | 317                 | ...              | ...    | ...   | ...             | ...              | ...                | ...                    | ...                 |
| PIEVE CUSIGNANO          | 270                 | 27,4             | 17,9   | 22,1  | 14,8            | 29,9             | 9,5                | 71                     | 30,4                |
| LANGHIRANO               | 265                 | ..               | ...    | ...   | ...             | ...              | ...                | 75                     | 49,0                |
| SALSOMAGGIORE            | 170                 | 27,8             | 16,8   | 22,0  | 15,9            | 30,4             | 11,0               | 78                     | 21,2                |
| PANOCCHIA                | 170                 | 28,7             | 16,9   | 22,3  | 15,5            | 28,7             | 11,8               | 70                     | 57,4                |
| SIVIZZANO - Traversetolo | 136                 | 27,8             | 17,4   | 22,2  | 14,8            | 29,8             | 10,3               | 70                     | 62,8                |
| MEDESANO                 | 120                 | 29,2             | 17,2   | 22,4  | 15,7            | 31,8             | 12,0               | 76                     | ...                 |
| S. PANCRAZIO             | 59                  | 29,0             | 17,6   | 22,9  | 15,9            | 31,5             | 11,4               | 71                     | 35,6                |
| FIDENZA                  | 59                  | 29,0             | 17,7   | 23,7  | 16,6            | 31,6             | 11,3               | 72                     |                     |
| GRUGNO - Fontanellato    | 45                  | 28,9             | 17,5   | 22,7  | 16,2            | 31,1             | 11,4               | 80                     | 21,2                |
| SISSA                    | 32                  | ...              | ...    | ...   | ...             | ...              | ...                | ...                    | ...                 |
| ZIBELLO                  | 31                  | 29,1             | 16,7   | 22,3  | 15,4            | 31,5             | 12,4               | 78                     | 0,6                 |
| COLORNO                  | 29                  | 29,0             | 17,7   | 22,7  | 16,0            | 30,9             | 11,3               | 78                     | 29,2                |
| GAINAGO - Torrile        | 28                  | 28,8             | 17,6   | 22,6  | 16,0            | 31,6             | 11,2               | 72                     | 25,4                |

... = dato non rilevato.

Aggiornamenti previsioni del tempo sul sito di ARPA Emilia-Romagna Servizio IdroMeteoClima: <http://www.arpa.emr.it/sim/>

**POMODORO**

La campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro sta procedendo, finalmente, a pieno ritmo. Si sta concludendo la raccolta degli appezzamenti precoci con risultati, mediamente, molto scarsi causa l'avverso andamento stagionale. In campo si osservano nuove infezioni di Peronospora e di Batteriosi per cui si consiglia di proteggere gli appezzamenti a ciclo medio-tardivo e tardivo con endoterapici in miscela con rame. Negli appezzamenti a ciclo medio proteggere le bacche, anche dalle scottature, con poltiglia bordolese. Utile l'aggiunta di zolfo in polvere per asciugare gli organi sporulanti del patogeno e favorire l'ispessimento della buccia delle bacche. Prosegue il volo della seconda generazione della Nottua gialla con catture degli adulti e presenza larve generalmente basse. Si consiglia comunque di monitorare i propri appezzamenti per individuare eventuali attacchi sopra soglia.

**BARBABIETOLA**

*Lo stabilimento di San Quirico di Trecasali ha iniziato la campagna saccarifera venerdì 01 agosto. I primi estirpi mostrano produzioni ottime dal punto di vista quantitativo, ma il titolo polarimetrico è, al momento, mediocre. L'andamento climatico è favorevole alla Cercospora per cui, negli estirpi tardivi, occorre proteggere la coltura con trattamenti a intervalli di circa 18-20 giorni dal precedente.*

**VITE**

*La coltura è nella fase di invaiatura. Sospendere la difesa sulle varietà a raccolta precoce, mentre su quelle a raccolta tardiva ultimare la difesa con Sali di rame e antibiotritico nei vigneti con infezioni in atto di Peronospora e Muffa grigia. Sono in aumento le piante colpite da Mal dell'esca e da Giallumi della vite (Flavescenza dorata e Legno nero).*

**MAIS**

*Gli ibridi precoci sono in fase di maturazione cerosa, quelli tardivi tra fioritura e allegagione. Nei prossimi giorni inizierà la trinciatura delle piante per la produzione di silomais. La Piralide si trova in fase di larve di 3°-4° età con infestazioni elevate. Per le colture a semina precoce la difesa è conclusa, mentre per i mais seminati tardivamente o per le seconde semine può essere utile intervenire, dopo la fioritura, con larvicidi. Considerata l'alta presenza di adulti di Diabrotica aggiungere alla miscela un piretroide.*



## BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

### DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA (D.P.I.) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNATA 2013 - 2014.

LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE SONO VINCOLANTI (QUANDO NON DIVERSAMENTE INDICATO) SOLO PER LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO AI PROGRAMMI DI DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA (REG. CE 1698/2005 - MISURA 214, AI REG. CE 1580/2007 E 1234/2007, ALLE LL.RR. 28/98 E 28/99).

PER TUTTE LE ALTRE SONO DA CONSIDERARSI SOLO DEI CONSIGLI (SECONDO QUANTO STABILITO DAL DECRETO N°150/2012 SULLA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA).

Con Determinazione del Responsabile Servizio Produzioni vegetali n. 3037/2014 è stato approvato l'aggiornamento della fase di coltivazione dei DPI 2014. Tutti i testi integrali 2014 delle singole colture e l'atto di approvazione si possono scaricare all'indirizzo: [http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/dpi\\_2014/disciplinari\\_in\\_vigore](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/dpi_2014/disciplinari_in_vigore)

#### Smaltimento scorte dei prodotti fitosanitari.

È autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma esclusi nell'anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell'anno precedente.

#### Priorità nella scelta delle formulazioni.

È obbligatorio dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi e Xn quando della stessa sostanza attiva esistano anche formulazioni di classe tossicologica T o T+. È obbligatorio dare preferenza alle formulazioni Nc e Xi quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica (Xn, Corrosivi, T o T+) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R68).

#### Consigli nella scelta delle formulazioni.

È consigliabile nella scelta dei prodotti fitosanitari dare preferenza a quelli che vengono commercializzati in formulazioni meno pericolose per l'operatore agricolo e per l'ambiente. In particolare sono da preferire le formulazioni costituite da emulsioni in acqua (contrassegnate dalle lettere EW), granuli disperdibili (WG, WDG o DF), granuli solubili (SG) e sospensioni di microcapsule (CS) rispetto a quelle costituite da polveri bagnabili (PB, WP), polveri solubili (PS, WS) e concentrati emulsionabili (EC) che presentano maggiori rischi per l'operatore nella fase di preparazione della miscela e rendono più difficoltose le operazioni di lavaggio e di bonifica dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari. Le sospensioni concentrate (SC) ed i prodotti costituiti da pasta fluida, flowable (FL, FLOW) riducono il rischio tossicologico per l'operatore ma per bonificare i contenitori occorre realizzare un accurato lavaggio. L'impiego di sacchetti idrosolubili risulta essere la

soluzione ideale per la tutela dell'operatore e dell'ambiente.

### **Principi attivi previsti dal Reg. CEE n. 834/07 (produzione biologica) regolarmente registrati in Italia.**

Possono essere utilizzati tutti i formulati commerciali classificati come "Xi", "Nc" e Xn. Solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche possono essere utilizzati anche formulati commerciali classificati come "T" e "T+".

### **DEROGHE 2014**

**Per consultare l'archivio delle deroghe territoriali:**

<http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/Difesa-e-diserbo-delle-piante/Derogheai-Disciplinari-di-produzione-integrata/Deroghe-territoriali-2014>

- **17 febbraio 2014 protocollo n° 00043480:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (Reg. CE n. 1234/2007/UE, REG. N. 1698/2005, LL. RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'impiego alla semina della patata della s.a. Fipronil (formulato "Goldor Patata 5G") per il controllo degli elateridi (*Agriotes* spp.). Si precisa che il formulato dovrà essere eseguito in alternativa ad Etoprofos e con le limitazioni presenti nelle norme tecniche della Regione Emilia-Romagna.
- **17 febbraio 2014 protocollo n° 02043450:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (Reg. CE n. 1234/2007/UE, REG. N. 1698/2005, LL. RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. Pyriproxyfen per la difesa del susino e del ciliegio dalle cocciniglie.
- **27 febbraio 2014 protocollo n° 0056050:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, REG. CE 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. Lambdacialotrina in formulazione granulare per la difesa dagli elateridi sulle colture di spinacio, bieta da costa e bieta da taglio.
- **17 marzo 2014 protocollo n° 0072815:** precisazione ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) sul divieto di impiego di formulati commerciali contenenti la miscela Dithianon + Pyraclostrobin su pero.
- **28 marzo 2014 protocollo n° 0086861:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) per elevare la dose di impiego del Glifosate, a 4 litri/ettaro per formulati con una concentrazione di s.a. pari al 30,40% nei trattamenti di pre-trapianto del pomodoro e di pre-semina delle colture di barbabietola, mais, soia, sorgo e girasole.
- **15 aprile 2014 protocollo n°00123177:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. Penthiopyrad per la difesa del pero dalla maculatura e dalla ticchiolatura.
- **22 aprile 2014 protocollo n° 0159742:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena per l'impiego della s.a. Protiocanazolo per la difesa del frumento duro da fusarium.
- **07 maggio 2014 protocollo n° 0193957:** deroga regionale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) per l'uso fino al 28 agosto di Spinetoram (Delegate) che recentemente ha ottenuto un'autorizzazione eccezionale (aut. Min. del 25 marzo 2014) per la difesa del ciliegio da *Drosophila suzukii*.
- **07 maggio 2014 protocollo n° 0193994:** deroga regionale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) per l'uso fino al 28 agosto di Acybenzolar s-methyle (Bion 50WG) che recentemente ha ottenuto

un'autorizzazione eccezionale (aut. Min. del 28 aprile 2014) per la difesa del kiwi dal cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*).

- **07 maggio 2014 protocollo n° 0194070:** deroga regionale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) per elevare il numero dei Captano impiegabili per la difesa del melo dalla ticchiolatura da 3 a 5 interventi in un anno.

- **07 maggio 2014 protocollo n° 0194240:** deroga regionale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) per elevare il numero dei Thiram impiegabili per la difesa del pero dalla maculatura bruna da 4 a 8 interventi in un anno.

- **12 maggio 2014 protocollo n° 0203139:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99), valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un intervento con Deltametrina per la difesa del ciliegio da afidi e *Drosophyla* nella fase di pre-raccolta.

- **21 maggio 2014 protocollo n° 0201468:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99), valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego, **fino al 16 settembre**, di Dimetoato per la difesa del ciliegio dalla *Drosophila suzukii* e di Spinosad (formulati Spintor Fly e Tracer Fly) per la difesa del ciliegio dalla mosca (*Rhagoletis cerasi*).

- **28 maggio 2014 protocollo n° 0221743:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99), valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un intervento nematocida con 1,3 Dicloropropene su terreni destinati alla coltivazione della carota.

- **11 giugno 2014 protocollo n° 0232737:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99), valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'impiego del Benalaxyl per la difesa del **pomodoro** dalla peronospora.

- **13 giugno 2014 protocollo n° 0235222:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per un intervento con il formulato Clortosip 500 SC (a base di Clortalonil) per la difesa della barbabietola da zucchero dalla Cercospora (*Cercospora beticola*) a partire dal 20 giugno.

- **25 giugno 2014 protocollo n° 0245118** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per un trattamento formetanate hydrochloride per la difesa della cipolla da tripidi (*Thrips tabaci*).

- **02 luglio 2014 protocollo n° 0251326:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per anticipare l'esecuzione del disseccamento della patata con l'utilizzo di diquat per gli estirpi previsti a partire dal 14 luglio.

- **10 luglio 2014 protocollo n° 0258781:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida a partire dall'11 luglio per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'impiego di un secondo intervento con il formulato Clortosip 500 SC (a base di Clortalonil) e possibilità di impiegare i prodotti rameici senza il limite massimo dei tre interventi in un anno per la difesa della barbabietola da zucchero dalla Cercospora (*Cercospora beticola*).

- **18 luglio 2014 protocollo n° 0267402:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un quarto trattamento con fenillamidi per la difesa del pomodoro dalla peronospora.

- **25 luglio 2014 protocollo n° 0275473:** deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99) valida per l'intero

territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un secondo trattamento antiperonosporico su lattuga, secondo modulo, utilizzando i prodotti presenti nei disciplinari di produzione integrata.

- **31 luglio 2014 protocollo n° 0283030**: deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (**REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99**) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un quinto trattamento con CAA (Iprovalicarb, Mandipropamide, Dimetomorf) o di un quarto con Cymoxanyl per la difesa del pomodoro dalla peronospora.

- **06 agosto 2014 protocollo n° 0287127**: deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (**REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99**) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un intervento con Glifosate sulle stoppie del frumento.

- **06 agosto 2014 protocollo n° 0287186**: deroga territoriale ai disciplinari di produzione integrata (**REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e LL.RR. 28/98 e 28/99**) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un terzo intervento per la difesa della vite dalla botrite.

### **DIFESA INTEGRATA AVANZATA (DIA)**

Le aziende che hanno aderito alla Difesa Integrata Avanzata (DIA) della misura 214 azione 1 (produzione integrata) hanno l'obbligo di rispettare le norme tecniche specificate per alcune colture arboree e riportate nella tabella seguente.

Per tutto quanto non specificato ci si dovrà attenere alle norme tecniche dei Disciplinari di Produzione Integrata 2014.

| COLTURA | LIMITAZIONI   | OBBLIGATORIO*   |
|---------|---|---|
| Melo    | Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici possono essere impiegati al massimo 2 volte   | Utilizzo della confusione o del disorientamento sessuale, o di 8 interventi confusione spray o 3 interventi con il virus della granulosi            |
| Pero    | Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici possono essere impiegati al massimo 2 volte   | Utilizzo della confusione o del disorientamento sessuale, o di 8 interventi confusione spray o 3 interventi con il virus della granulosi            |
| Pesco   | Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici possono essere impiegati al massimo 2 volte   | Utilizzo della confusione o del disorientamento sessuale, o di 5 interventi confusione spray per la <i>Cydia molesta</i>                            |
| Vite    | Indipendentemente dall'avversità gli esteri fosforici non possono essere impiegati. Fermo restando la limitazione precedente l'impiego di insetticidi è ammesso solo per la difesa da Cocciniglie, Scafoideo e Tripidi Difesa dalla Tignola esclusivamente con <i>Bacillus thuringiensis</i> o con Spinosad. Non autorizzato l'impiego del Mancozeb | Utilizzo di almeno 2 <i>Bacillus thuringiensis</i> o almeno 1 intervento di Spinosad o applicazione della confusione o del disorientamento sessuale |

### **CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI**

Il controllo funzionale e la regolazione delle irroratrici deve essere eseguito solo presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1202 del 13 luglio 1999.

**Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/2005; L.R. 28/99**

Le aziende agricole che applicano i disciplinari di produzione integrata, entro un anno dalla data di adesione agli impegni previsti dalle norme sopra riportate, dovranno sottoporre le

attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci (come da elenco che segue) al controllo funzionale ed alla regolazione (precedentemente identificati come collaudo e taratura) secondo quanto definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1202/99. I controlli sugli adempimenti vengono eseguiti a partire dall'inizio della seconda annualità di adesione. Il certificato di controllo e regolazione ha validità di cinque anni sia per le macchine in uso che per le nuove.

In conseguenza della applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) della Direttiva 128/2009 solo per le macchine nuove i certificati emessi nel 2013 e nelle precedenti annualità hanno una validità ridotta a 5 anni (rispetto ai 6 anni precedentemente fissati).

Le attrezzature nuove sono esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 5 anni ma devono essere sottoposte a regolazione a partire dall'inizio della seconda annualità di adesione alle norme sopra indicate.

I contoterzisti che operano presso le aziende aderenti alle norme sopra indicate dovranno sottoporre, entro il 26 novembre 2014, le proprie attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e/o barre) al controllo funzionale ed alla regolazione secondo quanto definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1202/99.

Anche in questo caso i controlli presso le aziende agricole che si avvalgono dei contoterzisti vengono eseguiti a partire dall'inizio della seconda annualità di adesione.

Il certificato di controllo e regolazione ha validità di due anni sia per le macchine in uso che per le nuove. Le attrezzature nuove sono esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 2 anni, in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) della Direttiva 128/2009, devono comunque essere sottoposte a regolazione a partire dal 27 novembre 2014.

Le aziende che fanno ricorso al contoterzismo per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono richiedere il rilascio di una copia dell'attestato di conformità della avvenuta verifica dell'attrezzatura utilizzata, oppure la trascrizione del numero di attestato di conformità sulla fattura ed esibire tale documentazione in caso di controlli.

L'elenco aggiornato dei Centri autorizzati al controllo e taratura delle irroratrici è disponibile sul sito Internet **Centri autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna**.

Sono considerati validi ai fini del rispetto del vincolo di Controllo funzionale e regolazione delle irroratrici anche i certificati prodotti da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome, alle seguenti condizioni:

- che il controllo funzionale e la regolazione siano stati condotti conformemente alla Delibera della Giunta Regionale n.1202/99;
- che l'attestato di conformità della macchina riporti numero e data di emissione, tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura, identificazione del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P.IVA o CF), firma del tecnico che ha eseguito il controllo, dati identificativi del centro prova;
- che venga rilasciata etichetta autoadesiva da apporre sull'irroratrice.

Le tipologie di attrezzature di distribuzione dei fitofarmaci interessate ai controlli sono:

a) Macchine irroratrici per la distribuzione verticale (colture arboree).

- irroratrici aeroassistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

b) Macchine irroratrici per la distribuzione orizzontale (erbacee):

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinata alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida).

c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:

- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger (1) e barre carrellate;
- attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili) (1);
- irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume (1);
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

(1) per tali macchine la metodologia di riferimento è in fase di definizione.

### **VOLUMI DI IRRORAZIONE**

I volumi massimi di irrorazione di seguito indicati per il diserbo (ed i restanti riportati nelle Norme tecniche di coltura) sono il riferimento per la esecuzione dei normali interventi fitosanitari in piena vegetazione per fungicidi, insetticidi e acaricidi. Tali volumi devono essere ridotti di almeno il 30% nelle prime fasi vegetative (es.: prefioritura per fruttiferi e vite) e possono essere aumentati per la esecuzione di interventi per i quali è richiesta una bagnatura significativa (es.: lavaggi per Psilla o trattamenti anticoccidici) o in presenza di forme di allevamento particolarmente espanse. Quando nelle etichette dei prodotti fitosanitari è riportata sia la dose riferita ai 100 litri di acqua (concentrazione), sia la dose riferita all'ettaro (superficie) è quest'ultima che deve essere sempre rispettata. Nel rispetto della dose ad ettaro la concentrazione può infatti variare in funzione del volume di distribuzione: può aumentare nel caso si utilizzino volumi ridotti (es. bassi, ultrabassi ecc..) o deve essere ridotta qualora si utilizzino volumi più elevati. Tale variazione può essere adottata dagli utilizzatori anche quando non espressamente indicato in etichetta. La dose ad ettaro riportata in etichetta può inoltre essere ridotta in funzione dello sviluppo della coltura e delle caratteristiche dei mezzi di distribuzione salvo i casi in cui l'etichetta preveda comunque il rigoroso rispetto di tale dose.

#### **Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/2005; L.R. 28/99**

Il superamento delle indicazioni relative ai volumi di irrorazioni sopra indicati dovrà essere giustificato dal beneficiario sulle schede di autocertificazione, in base alle condizioni aziendali.

Per quanto riguarda gli interventi erbicidi sono considerati normali volumi di irrorazione compresi fra 1,5 e 5,0 hl/ha. Per i diserbanti in pre-emergenza i volumi possono raggiungere i 6 hl/ha (o altra indicazione in etichetta del prodotto).

### **FERTILIZZAZIONE**

Il costo di un'analisi viene abbondantemente ripagato dal risparmio che si ha sia sulle quantità che sul tipo di fertilizzante impiegato. Infatti, ancora oggi, in molti casi si somministrano al terreno elementi (soprattutto macroelementi quali fosforo e potassio) in quantità non idonee al mantenimento della fertilità del suolo ed alle esigenze della coltura che si vuole investire. Tutto ciò provoca inutili spese, accumulo nel terreno di elementi già

abbondanti o diminuzione di quelli carenti, produzioni insufficienti dal punto di vista quantitativo e, soprattutto, qualitativo. Si ricorda che l'azoto, essendo molto solubile, va somministrato tassativamente frazionato nel tempo, in modo da evitare percolazioni, mentre fosforo e potassio, essendo poco mobili nel terreno, si possono interrare durante la preparazione dei letti di semina. Il fosforo, se trova nel terreno elevata alcalinità (ossia terreni non acidi) si lega al calcare presente (almeno in parte) formando composti insolubili (fosfati bicalcici o tricalcici) e quindi è bene somministrarlo vicino al periodo di impianto. Il potassio va apportato in modo che si stratifichi nel terreno esplorato dalle radici del vegetale. Per una corretta fertilizzazione è anche molto importante conoscere la funzione che l'elemento nutritivo esercita sulla pianta e il momento del suo utilizzo. Infatti le colture erbacee hanno esigenze diverse tra di loro così come le colture arboree.

I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del **Bilancio previsionale** oppure avvalendosi del software specifico scaricabile dal sito [www.ermesagricoltura.it](http://www.ermesagricoltura.it) "Programma per formulazione piano di bilancio".

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello semplificato secondo le **Schede a dose standard** presenti nelle norme tecniche di coltura dei Disciplinari.

Le caratteristiche chimico-fisiche del terreno si possono desumere attraverso l'analisi del terreno oppure utilizzando i dati forniti dal Catalogo dei suoli ([www.suolo.it](http://www.suolo.it)). Per alcune colture da seme è consentito solo l'utilizzo del metodo dose standard come indicato nelle norme di coltura.

## **COLTURE ERBACEE**

**POMODORO** fase fenologica: **PRECOCI: FINE RACCOLTA - MEDI: MATURAZIONE – TARDIVI: ALLEGAGIONE**

**ASPETTI AGRONOMICI:** la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro sta procedendo, finalmente, a pieno ritmo. Si sta concludendo la raccolta degli appezzamenti precoci con risultati, mediamente, molto scarsi causa l'avverso andamento stagionale. Lo stato fitosanitario dei trapianti medio-tardivi e tardivi è peggiorato a causa delle frequenti precipitazioni e della forte umidità. Tutto ciò ha causato diffusi attacchi di Peronospora e Batteriosi. Nel caso si voglia anticipare la maturazione con etephon si consiglia di consultare la propria O.P. di riferimento in quanto ogni stabilimento di trasformazione ha esigenze particolari.

### **DIFESA**

**Peronospora:** in campo si osservano nuove infezioni di Peronospora e di Batteriosi per cui si consiglia di proteggere gli appezzamenti a ciclo medio-tardivo e tardivo con endoterapici in miscela con rame. Negli appezzamenti a ciclo medio proteggere le bacche, anche dalle scottature, con poltiglia bordolese. Utile l'aggiunta di zolfo in polvere per asciugare gli organi sporulanti del patogeno e favorire l'ispessimento della buccia delle bacche. La Regione Emilia-Romagna ha concesso deroghe ai disciplinari di produzione integrata (REG. CE 1698/2005, 1234/2007 e L.R. 28/98), valide per l'intero territorio, per un 4° intervento con fenilamidi (Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil), e in alternativa un 5° con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide) o un 4° con Cimoxanil. Si ricorda di alternare le sostanze attive e rispettare i tempi di carenza degli agrofarmaci impiegati.

**Batteriosi:** le ultime piogge, a volte miste con grandine, hanno causato una forte recrudescenza delle infezioni batteriche. Negli appezzamenti colpiti mantenere la protezione della coltura con Sali di rame.

**Nottua gialla (*Helicoverpa armigera*):** continua il volo della seconda generazione della Nottua gialla con catture degli adulti e presenza larve generalmente basse. Si consiglia comunque di monitorare i propri appezzamenti per individuare eventuali attacchi sopra soglia (2 piante su 30 con presenza di uova o larve).

**Tuta assoluta:** Il monitoraggio con trappole a feromoni sessuali evidenzia basse catture di adulti e assenza di danni in campo.

**Orobanche:** in diversi appezzamenti precoci e medi si rileva la presenza dei turioni che portano i fiori dai quali avranno origine milioni di piccoli semi. Segnalare i campi colpiti per studiare la diffusione della infestante parassita nel nostro territorio.

#### **CIPOLLA fase fenologica: RACCOLTA**

---

Il maltempo sta ritardando l'inizio delle raccolte.

#### **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO fase fenologica: RACCOLTA**

---

Lo stabilimento di San Quirico di Trecasali ha iniziato la campagna saccarifera venerdì 01 agosto. I primi estirpi mostrano produzioni ottime dal punto di vista quantitativo, ma il titolo polarimetrico è, al momento, mediocre.

#### **DIFESA**

**Cercospora:** presenti infezioni di lieve entità; per gli estirpi tardivi mantenere protetta la coltura con Flutriafol (Impala), Tetraconazolo (Domark, Concorde, Lidal), Fenbuconazolo (Indar, Simitar), Propiconazolo (Propydor), Ciproconazolo (Galeo), Procloraz (Sportak 45 EW), Procloraz + Propiconazolo (Bumper P, Novel Duo, Benprop Pro), Procloraz + Ciproconazolo (Binal CB, Tiptor Xcell), Procloraz + Flutriafol (Shut Twin, Impact Supreme), Difenconazolo (Boneco, Score 10 WG, Sponsor), Difenconazolo + Fenpropidin (Spyrale). In deroga sono autorizzati più di 3 interventi anno con Sali di rame e 2 trattamenti con Clortalonil (Clortosip 500 SC). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 20 giorni, ravvicinandoli in caso di frequenti perturbazioni. Si ricorda che su bietola al massimo possono essere effettuati 3 interventi. Si consiglia di impiegare gli IBE in miscela con prodotti con differente meccanismo d'azione. Tali prodotti, ad esclusione di Sali di rame e Clortalonil, sono attivi anche nei confronti dell'Oidio di cui si rilevano i primi sintomi in alcuni appezzamenti. Si raccomanda di utilizzare abbondante acqua (4-5 hl/ha) intervenendo nelle ore più fresche della giornata in particolare dove si impiegano IBE.

#### **FRUMENTO fase fenologica: STOPPIE**

---

**Intervento su stoppie:** le particolari condizioni climatiche e le frequenti piogge stanno favorendo l'anomalo sviluppo di sorghetta sulle stoppie del frumento. Nel caso in cui siano presenti infestazioni di tale perenne, si può intervenire, in deroga, con Glifosate (360 gr/lt) alla dose di 5 lt/ha, al fine di bonificare il terreno e ridurre il rischio di compromettere le colture in successione.

#### **MAIS fase fenologica: PRECOCI IN MATURAZIONE CEROSA – TARDIVI TRA FIORITURA E ALLEGAGIONE**

---

Nei prossimi giorni inizierà la trinciatura delle piante per la produzione di silomais. Si ricorda che il momento ideale per tale utilizzo si ha quando la sostanza secca della pianta è intorno al 35-37%. Per favorire la qualità dell'insilato si raccomanda di tagliare le piante ad almeno 15-20 cm dal suolo, di regolare la lunghezza di trinciatura su valori prossimi a 1 cm., di ultimare il silo in massimo sei giorni. Per migliorare la fermentazione lattezza occorre ridurre al minimo la fase aerobica comprimendo adeguatamente il foraggio e isolando la massa dall'ambiente.

#### **DIFESA**

**Piralide:** fase di larve di 3°-4° età con infestazioni elevate. Per le colture a semina precoce la difesa è conclusa, mentre per i mais seminati tardivamente o per le seconde semine può essere utile intervenire, dopo la fioritura, con larvicidi. Considerata l'alta presenza di adulti di Diabrotica aggiungere alla miscela un piretroide.

**Diabrotica:** è in corso il monitoraggio con trappole cromotropiche di colore giallo negli appezzamenti di mais in monosuccessione: catture abbondanti, soprattutto in zone golenali, ma non evidenziati particolari danni da nutrizione larvale.

## **SORGO** fase fenologica: DA MATURAZIONE LATTEA A CEROSA

---

### **DIFESA**

In questa fase non sono previsti interventi.

## **SOIA** fase fenologica: RIEMPIMENTO BACCELLI PER I PRIMI SEMINATI – DA TERZA FOGLIA TRILOBATA A FIORITURA PER I SECONDI RACCOLTI

---

### **DIFESA**

In questa fase non sono previsti interventi.

## **ERBA MEDICA** fase fenologica: FIENAGIONE

---

### **DIFESA**

In questa fase non sono previsti interventi.

## **ZUCCA** fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI

---

Le basse temperature hanno impedito una normale impollinazione del secondo palco per cui si notano casi di cascola e mancanza di giovani frutti.

### **DIFESA**

**Peronospora:** infezioni in atto di difficile contenimento per l'impossibilità di accesso ai campi. Non appena possibile proteggere la coltura con Sali di rame, Cyazofamide, Fluopicolide + Propamocarb, Azoxystrobin.

**Oidio:** alla comparsa delle infezioni primarie proteggere la coltura con Zolfo, Ciflufenamid, Triazolico, Azoxystrobin.

## **COLTURE ARBOREE**

---

Si segnalano infestazioni diffuse di *Metcalfa pruinosa*. In presenza di melata effettuare lavaggi della vegetazione.

**Drosophila suzukii:** nelle trappole di monitoraggio continuano le catture di adulti. In altre province si sono accertati casi di attacchi larvali su Albicocco, Susino e Pesco. In caso di danni sospetti consultare il proprio tecnico. Si ricorda che interventi con Spinosad o Etofenprox utilizzati per altre avversità, sono efficaci anche verso questo insetto.

## **VITE** fase fenologica: INVAIATURA

---

### **DIFESA**

**Peronospora:** sospendere la difesa sulle varietà a raccolta precoce, mentre su quelle a raccolta tardiva ultimare la difesa con Sali di rame nei vigneti con infezioni in atto.

**Botrite:** l'andamento stagionale è risultato molto favorevole alla malattia per cui si consiglia di provvedere ad una corretta gestione della chioma al fine di favorire l'arieggiamento della fascia produttiva. In presenza di infezioni, in particolare con danni da grandine, intervenire sulle varietà a raccolta tardiva, circa un mese prima della vendemmia, con *Aereobasidium pullulans* (Botector), *Bacillus amyloliquefaciens* (Amylo-X), *Bacillus subtilis* (Serenade Max), Bicarbonato di K, Fluazinam, Boscalid (Cantus), Ciprodinil + Fludioxonil (Switch), Fenexamid (Teldor Plus), Fluopyram (Luna Privilege), Fenpirazamine (Prolectus), Pirimetanil.

**Mal dell'esca:** sono in aumento i sintomi in campo. Si consiglia di asportare le piante fortemente colpite ed eventualmente di contrassegnare le viti con sintomi più lievi. Disinfettare gli attrezzi impiegati per le operazioni di rimonda.

**Giallumi (Flavescenza dorata, Legno nero):** si segnala un incremento di piante sintomatiche, provvedere a segnalarle.

**Tignoletta (*Lobesia botrana*):** il modello indica che è in corso il 3° volo, la deposizione delle uova e la nascita delle larve. A superamento soglia (5% di grappoli infestati da uova

o larve) intervenire con larvicidi: *Bacillus thuringiensis*, Emamectina (Affirm), Indoxacarb, Spinosad.

### **PESCO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI - RACCOLTA**

---

#### **DIFESA**

**Monilia:** con condizioni climatiche favorevoli (elevata umidità e bagnature prolungate) intervenire in pre-raccolta con Ciproconazolo (Galeo), Fenbuconazolo, Tebuconazolo, Pyraclostrobin + Boscalid (Signum), *Bacillus subtilis* (Serenade).

**Oidio:** in presenza della malattia intervenire con Zolfo.

**Cidia molesta:** continua il volo di seconda generazione e la presenza di larve. Al superamento soglia (10 catture per trappola per settimana) intervenire con i larvicidi: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, Spinosad, Emamectina (Affirm), Indoxacarb, Metoxifenozone, Etofenprox (Trebon Up).

### **SUSINO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI - RACCOLTA**

---

#### **DIFESA**

**Monilia:** in pre-raccolta è consigliabile eseguire un intervento con: *Bacillus subtilis* (Serenade), Fenbuconazolo, Tebuconazolo, Pyraclostrobin + Boscalid (Bellis Drupacee), Fludioxinil + Ciprodinil (Swicth).

**Cidia funebrana:** continua il 3° volo e la nascita larvale. Al superamento della soglia (10 catture per trappola per settimana) intervenire dopo 4-5 giorni con larvicidi: Spinosad, Emamectina (Affirm), Fosmet, Etofenprox (Trebon Up).

### **MELO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTO - MATURAZIONE**

---

#### **DIFESA**

**Ticchiolatura:** proseguire la difesa in presenza di infezioni primarie e in previsione di piogge che possono attivare infezioni secondarie con prodotti di copertura: Captano, Thiram, Ziram (attenzione ai tempi di carenza in particolare in presenza di varietà a maturazione precoce).

**Oidio:** intervenire alla comparsa dei sintomi con Zolfo.

**Carpocapsa:** prosegue il volo di seconda generazione, la deposizione di uova e la nascita larvale. Intervenire a superamento soglia (2 catture per trappola in due settimane) con larvicidi come Virus della granulosa, Spinosad, Emamectina (Affirm).

### **PERO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI – RACCOLTA**

---

#### **DIFESA**

**Ticchiolatura:** proseguire la difesa in presenza di infezioni primarie e in previsione di piogge che possono attivare infezioni secondarie con prodotti di copertura: Captano, Thiram, Ziram (attenzione ai tempi di carenza in particolare in presenza di varietà a maturazione precoce).

**Maculatura bruna:** comparsi i primi sintomi. Intervenire in caso di piogge sulle varietà solitamente colpite (Abate Fetel, Conference, Decana, Kaiser, ecc.) con Pyraclostrobin + Boscalid (Bellis), Ciprodinil + Fludioxonil (Swicth), Boscalid (Cantus), Trifloxystrobin (Flint), Penthiopirad (Fontelis), Fludioxonil, Tebuconazolo, Fosetil Al, Captano, Thiram, Ziram, Fluazinam (Nando maxi). Captano e Fluazinam vanno distanziati 20 giorni da olio bianco per non causare fitotossicità. Utilizzare Pyraclostrobin e Trifloxystrobin in miscela con un fungicida a diverso meccanismo d'azione.

**Carpocapsa:** prosegue il volo di seconda generazione, la deposizione di uova e la nascita larvale. Intervenire a superamento soglia (2 catture per trappola in due settimane) con larvicidi come Virus della granulosa, Spinosad, Emamectina (Affirm).

**Psilla:** presenza molto variabile. Controllare la presenza di antocoridi. Con melata intervenire mediante lavaggi da eseguirsi al mattino presto e in giornate soleggiate.



# BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

**NOTA GENERALE:** le seguenti indicazioni tecniche fanno riferimento a quanto previsto dai regolamenti CE sull'agricoltura biologica 834/2007 (obiettivi, principi e norme generali) e 889/2008 (norme tecniche di applicazione) e successive integrazioni e modifiche. Le disposizioni applicative si trovano nel DM n. 18354 del 27.11.09 che ha completato ed attivato il quadro normativo.

Tutte le operazioni colturali devono volgere a mantenere un equilibrio vegeto-produttivo delle piante, al fine di aumentare le difese naturali e diminuire i potenziali attacchi delle avversità, salvaguardando l'ambiente circostante.

## NORMATIVA

**Fertilizzanti commerciali:** verificare che sul prodotto ci sia l'indicazione "Consentito in agricoltura biologica" o controllare la presenza delle materie prime che compongono il prodotto all'interno dell'elenco dell'allegato I del Reg. 889/2008, indicato anche sul Decreto legislativo 217/2006. Si ricorda che **le piantine e il seme impiegato devono essere biologiche certificate**. Se non si riesce a reperire sul mercato seme biologico della varietà desiderata è possibile utilizzare seme convenzionale non trattato con prodotti non consentiti in agricoltura biologica, previa richiesta di deroga all'ENSE (Via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano – Tel. 02 690 120 46, Fax 02 690 120 49, e-mail: [deroghe.bio@ense.it](mailto:deroghe.bio@ense.it)) da farsi almeno 10 giorni.

## COLTURE ERBACEE

**POMODORO** fase fenologica: **PRECOCI: FINE RACCOLTA - MEDI: MATURAZIONE – TARDIVI: ALLEGAGIONE**

**ASPETTI AGRONOMICI:** la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro sta procedendo, finalmente, a pieno ritmo. Si sta concludendo la raccolta degli appezzamenti precoci con risultati, mediamente, molto scarsi causa l'avverso andamento stagionale. Lo stato fitosanitario dei trapianti medio-tardivi e tardivi è peggiorato a causa delle frequenti precipitazioni e della forte umidità. Tutto ciò ha causato diffusi attacchi di Peronospora e Batteriosi.

### DIFESA

**Peronospora:** in campo si osservano nuove infezioni di Peronospora e di Batteriosi per cui si consiglia di proteggere gli appezzamenti la coltura con Sali di rame. Negli appezzamenti a ciclo medio proteggere le bacche, anche dalle scottature, con poltiglia bordolese. Utile l'aggiunta di zolfo in polvere per asciugare gli organi sporulanti del patogeno e favorire l'ispessimento della buccia delle bacche.

**Batteriosi:** le ultime piogge, a volte miste con grandine, hanno causato una forte recrudescenza delle infezioni batteriche. Negli appezzamenti colpiti mantenere la protezione della coltura con Sali di rame.

**Nottua gialla (*Helicoverpa armigera*):** continua il volo della seconda generazione della Nottua gialla con catture degli adulti e presenza larve generalmente basse. Si consiglia comunque di monitorare i propri appezzamenti per individuare eventuali attacchi sopra soglia (2 piante su 30 con presenza di uova o larve).

**Tuta assoluta:** Il monitoraggio con trappole a feromoni sessuali evidenzia basse catture di adulti e assenza di danni in campo.

**Orobanche:** in diversi appezzamenti precoci e medi si rileva la presenza dei turioni che portano i fiori dai quali avranno origine milioni di piccoli semi. Segnalare i campi colpiti per studiare la diffusione della infestante parassita nel nostro territorio.

#### **CIPOLLA** fase fenologica: RACCOLTA

Il maltempo sta ritardando l'inizio delle raccolte.

#### **MAIS** fase fenologica: PRECOCI IN MATURAZIONE CEROSA – TARDIVI TRA FIORITURA E ALLEGAGIONE

Nei prossimi giorni inizierà la trinciatura delle piante per la produzione di silomais. Si ricorda che il momento ideale per tale utilizzo si ha quando la sostanza secca della pianta è intorno al 35-37%. Per favorire la qualità dell'insilato si raccomanda di tagliare le piante ad almeno 15-20 cm dal suolo, di regolare la lunghezza di trinciatura su valori prossimi a 1 cm., di ultimare il silo in massimo sei giorni. Per migliorare la fermentazione lattezza occorre ridurre al minimo la fase aerobica comprimendo adeguatamente il foraggio e isolando la massa dall'ambiente.

#### **DIFESA**

**Piralide:** fase di larve di 3°-4° età con infestazioni elevate. Per le colture a semina precoce la difesa è conclusa, mentre per i mais seminati tardivamente o per le seconde semine può essere utile intervenire, dopo la fioritura, con larvicidi: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* (si raccomanda di acidificare l'acqua a pH 5,5-6,5). Considerata l'alta presenza di adulti di Diabrotica aggiungere alla miscela Piretrine pure.

**Diabrotica:** è in corso il monitoraggio con trappole cromotropiche di colore giallo negli appezzamenti di mais in monosuccessione: catture abbondanti, soprattutto in zone golenali, ma non evidenziati particolari danni da nutrizione larvale.

#### **SORGO** fase fenologica: DA MATURAZIONE LATTEA A CEROSA

#### **DIFESA**

In questa fase non sono previsti interventi.

#### **SOIA** fase fenologica: RIEMPIMENTO BACCELLI PER I PRIMI SEMINATI – DA TERZA FOGLIA TRILOBATA A FIORITURA PER I SECONDI RACCOLTI

#### **DIFESA**

In questa fase non sono previsti interventi.

#### **ERBA MEDICA** fase fenologica: FIENAGIONE

#### **DIFESA**

In questa fase non sono previsti interventi.

#### **ZUCCA** fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI

Le basse temperature hanno impedito una normale impollinazione del secondo palco per cui si notano casi di cascola e mancanza di giovani frutti.

#### **DIFESA**

**Peronospora:** infezioni in atto di difficile contenimento per l'impossibilità di accesso ai campi. Non appena possibile proteggere la coltura con Sali di rame.

**Oidio:** alla comparsa delle infezioni primarie proteggere la coltura con Zolfo.

#### **COLTURE ARBOREE**

Si segnalano infestazioni diffuse di *Metcalfa pruinosa*. In presenza di melata effettuare lavaggi della vegetazione.

***Drosophila suzukii***: nelle trappole di monitoraggio continuano le catture di adulti. In altre province si sono accertati casi di attacchi larvali su Albicocco, Susino e Pesco. In caso di danni sospetti consultare il proprio tecnico. Si ricorda che interventi con Spinosad utilizzati per altre avversità, sono efficaci anche verso questo insetto.

#### VITE fase fenologica: INVAIATURA

---

##### DIFESA

**Peronospora**: sospendere la difesa sulle varietà a raccolta precoce, mentre su quelle a raccolta tardiva ultimare la difesa con Sali di rame nei vigneti con infezioni in atto.

**Botrite**: l'andamento stagionale è risultato molto favorevole alla malattia per cui si consiglia di provvedere ad una corretta gestione della chioma al fine di favorire l'arieggiamento della fascia produttiva. In presenza di infezioni, in particolare con danni da grandine, intervenire sulle varietà a raccolta tardiva, circa un mese prima della vendemmia, con *Aereobasidium pullulans* (Botector), *Bacillus amyloliquefaciens* (Amylo-X), *Bacillus subtilis* (Serenade Max), Bicarbonato di K.

**Mal dell'esca**: sono in aumento i sintomi in campo. Si consiglia di asportare le piante fortemente colpite ed eventualmente di contrassegnare le viti con sintomi più lievi. Disinfettare gli attrezzi impiegati per le operazioni di rimonda.

**Giallumi (Flavescenza dorata, Legno nero)**: si segnala un incremento di piante sintomatiche, provvedere a segnalarle.

**Tignoletta (*Lobesia botrana*)**: il modello indica che è in corso il 3° volo, la deposizione delle uova e la nascita delle larve. A superamento soglia (5% di grappoli infestati da uova o larve) intervenire con larvicidi: *Bacillus thuringiensis*, Spinosad.

#### PESCO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI - RACCOLTA

---

##### DIFESA

**Monilia**: con condizioni climatiche favorevoli (elevata umidità e bagnature prolungate) intervenire in pre-raccolta con *Bacillus subtilis* (Serenade).

**Oidio**: in presenza della malattia intervenire con Zolfo.

***Cidia molesta***: continua il volo degli adulti e la presenza di larve. Al superamento soglia (10 catture per trappola per settimana) intervenire con i larvicidi: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, Spinosad.

#### SUSINO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI - RACCOLTA

---

##### DIFESA

**Monilia**: in pre-raccolta è consigliabile eseguire un intervento con: *Bacillus subtilis* (Serenade).

***Cidia funebrana***: inizio 3° volo e nascita larvale. Al superamento della soglia (10 catture per trappola per settimana) intervenire dopo 4-5 giorni sulle larve con Spinosad.

#### MELO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTO - MATURAZIONE

---

##### DIFESA

**Ticchiolatura**: proseguire la difesa in presenza di infezioni primarie e in previsione di piogge che possono attivare infezioni secondarie con Sali di rame.

**Oidio**: intervenire alla comparsa dei sintomi con Zolfo.

**Carpocapsa**: prosegue il volo di seconda generazione, la deposizione di uova e la nascita larvale. Intervenire a superamento soglia (2 catture per trappola in due settimane) con larvicidi come Virus della granulosa, Spinosad.

#### PERO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI – RACCOLTA

---

##### DIFESA

**Ticchiolatura**: proseguire la difesa in presenza di infezioni primarie e in previsione di piogge che possono attivare infezioni secondarie con Sali di rame.

**Maculatura bruna:** comparsi i primi sintomi. Intervenire in caso di piogge sulle varietà solitamente colpite (Abate Fetel, Conference, Decana, Kaiser, ecc.) con Sali di rame.

**Carpocapsa:** prosegue il volo di seconda generazione, la deposizione di uova e la nascita larvale. Intervenire a superamento soglia (2 catture per trappola in due settimane) con larvicidi come Virus della granulosa, Spinosad.

**Tingide:** presenza di neanidi. Intervenire con piretro in miscela ad olio bianco o con lavaggi con sali di potassio.

**Psilla:** presenza molto variabile. Controllare la presenza di antocoridi. Con melata intervenire mediante lavaggi da eseguirsi al mattino presto e in giornate soleggiate.

#### **BOLLETTINO IRRIGAZIONE C.E.R. n. 15: elaborazione del 04/08/2014**

**E' fondamentale non tardare il riavvio delle irrigazioni.** Pertanto è consigliabile applicare la formula espressa in questo bollettino o consultare il proprio account IRRINET.

- **Pomodoro:** in assenza di precipitazioni superiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 5
- **Patata:** in assenza di precipitazioni superiori a 30 mm , irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. **Si consiglia di sospendere definitivamente l'irrigazione nelle varietà che presentano almeno il 20% di foglie ingiallite.** ET: 4
- **Cipolla:** in assenza di precipitazioni superiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. **Per le varietà nelle quali sia evidente il collasso del collo sospendere definitivamente l'irrigazione.** ET: 3.9
- **Mais** In assenza di precipitazioni superiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. **Sospendere definitivamente l'irrigazione nelle varietà che hanno raggiunto la maturazione cerosa.**
- **Bietola da zucchero** Sospendere definitivamente l'irrigazione.
- **Erba medica** sospendere temporaneamente le irrigazioni.
- **Prato stabile** sospendere temporaneamente le irrigazioni.
- **Soia** In assenza di precipitazioni superiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 5
- **Melone** irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 5
- **Cocomero** irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 5
- Livello PO al punto di prelievo Boretto al 23-07-14: 18,36 metri s.l.m.;

#### **APPUNTAMENTI – NOTIZIE – NOTE**

- Prossimo appuntamento **venerdì 22 agosto 2014 alle ore 11:00** c/o Azienda Agraria Sperimentale Stuard, str. Madonna dell' Aiuto 7/a – San Pancrazio (PR) con il seguente O.d.G.:

- Aggiornamento meteorologico;
- Bollettino di produzione integrata;
- Bollettino di produzione biologica.

Redazione a cura di Valentino Testi



In collaborazione con Cristina Piazza e Sandro Cornali



e in collaborazione con: ARPA Emilia-Romagna Servizio IdroMeteoClima - C.E.R. - PRO.BER - Organizzazioni dei Produttori AINPO, ASIPO, COPADOR - A.N.B. – Eridania Sadam – CAP Parma - Tecnici e rivendite prodotti per l'agricoltura.

**Chi fosse interessato a ricevere il Bollettino di Produzione Integrata e Biologica della provincia di Parma via mail, può farne richiesta a [vtesti@regione.emilia-romagna.it](mailto:vtesti@regione.emilia-romagna.it) o a [cornali@stuard.it](mailto:cornali@stuard.it)**

---

#### SERVIZIO INFORMAZIONI VIA SMS

Alcune informazioni relative al bollettino vengono diffuse anche via sms. Si tratta di un servizio gratuito utilizzato nel caso ci siano avvisi "urgenti" (previsione e avvertimento del rischio di comparsa di alcune avversità, previsione gelate, ecc..) che sono inviati a tecnici, aziende agricole o altri utenti del bollettino che lo richiedano.

Chi fosse interessato al servizio, se non già inserito negli anni precedenti, può farne richiesta al Consorzio Fitosanitario via mail [vtesti@regione.emilia-romagna.it](mailto:vtesti@regione.emilia-romagna.it) specificando: nome, cognome e professione (tecnico, azienda agricola o altro), coltura interessata e il numero di cellulare a cui ricevere i messaggi.

Allo stesso modo si potrà comunicare la richiesta di cancellazione dal servizio.



"SERVIZI DI SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA E DELLE NORME DI PRODUZIONE BIOLOGICA NELL'AMBITO DEL P.S.R. 2007-2013 – MISURA 214, AZIONI 1 E 2"