



Provincia di BOLOGNA

Bollettino di Difesa Integrata obbligatoria

del 17-06-2015

PREVISIONI DEL TEMPO

(15/06/15)

Il transito di un minimo depressionario di origine atlantica sull'Italia centrale interesserà parzialmente la nostra regione; avremo nuvolosità variabile con temporali più probabili e intensi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17. Temperature massime in flessione nella giornata di mercoledì dove non supereranno i 25 gradi. Miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di giovedì

Per informazioni dettagliate e in aggiornamento consultate le

[previsioni meteo ARPA Emilia Romagna](#)

COLTURE ERBACEE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Difesa

Cercospora: Presenza prime pustole sulle varietà sensibili intervenire.

Oidio: in caso di infezione epidemica intervenire

Afidi: intervenire al superamento della soglia del 30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e in assenza di ausiliari

Mamestra: si rilevano le prime presenze di larve, intervenire al superamento della soglia di 2-3 larve pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare

SOIA

Ragnetto Rosso: intervenire al superamento di 10 forme mobili per foglia su un campione di 100 foglie /ha. Se la soglia è stata superata solo sui bordi dell'appezzamento, limitarsi a trattare questi ultimi.

CIPOLLA ingrossamento bulbo

Diserbo

In presenza di graminacee intervenire. Per migliorare l'azione dei graminicidi sopracitati miscelare con bagnante

Difesa

Botrite: intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Peronospora: si rilevano infezioni in campo in previsione di piogge intervenire

Batteriosi: intervenire in presenza di sintomi

Tripidi: intervenire in caso di presenza

PATATA ingrossamento tuberi

Difesa

Tignola: al momento non si segnalano catture si sconsigliano interventi specifici

Dorifora: **controllare la nascita delle larve**, in caso di infestazione generalizzata intervenire

Notte: prosegue il volo intervenire in caso di presenza diffusa delle prime larve giovani

Peronospora: si segnalano infezioni in campo. Intervenire, possibilmente in modo preventivo rispetto alle piogge

Alternariosi: solitamente non occorrono interventi specifici in quanto i prodotti antiperonosporici impiegati sono efficaci anche contro questa crittogama

POMODORO PIENO CAMPO presenza bacche

Batteriosi: intervenire sugli impianti maggiormente sviluppati

Peronospora: intervenire , in modo preventivo rispetto alle piogge

Afidi: Intervenire al superamento della soglia del 10% di piante con colonie in accrescimento e in assenza di insetti utili

COCOMERO ingrossamento frutto/maturazione

Difesa

Peronospora: intervenire preventivamente in condizioni di elevata umidità

Afidi: intervenire alla comparsa dei primi alati

Peronospora: intervenire preventivamente in condizioni di elevata umidità

Cancro gommoso: in caso di infezioni in atto intervenire tempestivamente

Afidi: intervenire alla comparsa dei primi alati

Ragnetto rosso: alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili lanci di fitoseidi (su focolai localizzati). Oppure intervenire tempestivamente su focolai di infestazioni con foglie decolorate

MELONE ingrossamento frutto/maturazione

Difesa

Peronospora: intervenire preventivamente in condizioni di elevata umidità

Oidio: intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Cancro gommoso: in caso di infezioni in atto intervenire tempestivamente

Afidi: intervenire alla comparsa dei primi alati

Ragnetto rosso: alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili lanci di fitoseidi (su focolai localizzati). Oppure intervenire tempestivamente su focolai di infestazioni con foglie decolorate o in concomitanza di trattamenti aficidi

COLTURE ARBOREE

ACTINIDIA allegagione

Difesa

Batteriosi: Batteriosi: si segnala la presenza in campo. Si consiglia di controllare gli impianti con particolare riferimento alle piante giovani, in caso di presenza di infezioni contattare il tecnico di fiducia e/o il SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE tel. 051 5278285

ALBICOCCO ingrossamento frutti/maturazione

Difesa

Oidio: Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Monilia: intervenire con condizioni climatiche favorevoli come elevata umidità e bagnature prolungate

Anarsia: nascita larvale terminata non si consigliano interventi

Capnode: Nelle aziende che manifestano la presenza dell'insetto intervenire

SUSINO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Afide verde: intervenire al superamento soglia di 10% di germogli o frutti

Cidia funebrana: secondo volo nascita larvale. Intervenire al superamento della soglia indicativa di 10 catture per trappola per settimana

CILIEGIO accrescimento frutti/maturazione

Difesa

Monilia: da invaiatura con condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo dell'infezione come elevata umidità e bagnature prolungate è opportuno trattare

Mosca: continua il volo al momento di modesta entità. In presenza di catture intervenire sulle varietà in fase di invaiatura

Drosophila suzukii: Il monitoraggio di questi giorni rileva una presenza modesta, anche se in leggero aumento come numero di catture. Sulle varietà ad invaiatura consigliamo di intervenire, in funzione delle date di raccolta

PESCO ingrossamento frutti

Difesa

Oidio: in presenza della malattia intervenire

Monilia: in preraccolta con condizioni climatiche favorevoli come elevata umidità e bagnature prolungate

Cidia molesta: **2° volo, nascita larve.** Solo al superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana intervenire dopo 4-5 giorni dal superamento soglia con larvicidi

Anarsia: nascita larvale terminata non si consigliano interventi

MELO frutto noce

Difesa

Colpo di fuoco : si segnalano presenze in campo. Asportare tempestivamente le parti colpite e i fiori secondari. Intervenire preventivamente

Ticchiolatura: Volo ascosporico esaurito. Si rileva presenze di macchie in numerose aziende , in questi casi mantenere la copertura per evitare la comparsa di macchie secondarie .

Oidio: intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Carpocapsa: in questi giorni è previsto il volo della seconda generazione per la difesa si rimanda ai prossimi bollettini

Butteratura amara: intervenire con sali di calcio a intervalli di 10-15 giorni

PERO Ingrossamento frutti

Difesa

Colpo di fuoco: in presenza di seconde fioriture il rischio infezioni è da ritenersi elevato,

Ticchiolatura: Volo ascosporico esaurito. Si rileva presenze di macchie soprattutto su alcune varietà , in questi casi mantenere la copertura per evitare la comparsa di macchie secondarie .

Maculatura bruna: condizioni di rischio elevato. Intervenire in caso di pioggia sulle varietà solitamente colpite (abate fetel, conference, decana, kaiser, ecc.)

Carpocapsa: in questi giorni è previsto il volo della seconda generazione per la difesa si rimanda ai prossimi bollettini

Psilla: Si rileva mediamente popolazione in aumento. In presenza di forti infestazioni intervenire sulle uova gialle/ nascita delle prime neanidi.

In caso di melata effettuare lavaggi.

VITE pre-chiusura grappolo

Difesa

Peronospora: rischio alto in collina basso in pianura presenza in alcuni casi di infezioni intervenire preventivamente in previsione di piogge

Oidio: rischio alto in collina. In previsione di pioggia intervenire

Botrite : intervenire sulle varietà in pre-chiusura grappolo

Tignoletta: volo, deposizione e inizio nascita larvale. Nei vigneti solitamente infestati intervenire in presenza di uova e/o fori di penetrazione o al superamento del 5% di grappoli nei vigneti solitamente non infestati con uova e/o larve e/o fori di penetrazione

Cocciniglia (Planococcus ficus) intervenire: inizio migrazione. Intervenire in caso di presenza su foglie e germogli

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

**In tutto il territorio della Provincia di Bologna
devono essere eseguiti 2 interventi obbligatori
nei confronti dello Scafoideo**

il 1° trattamento tra il 10 e il 20 di giugno

il 2° trattamento dopo circa 30 giorni ed entro il 31 luglio

Per salvaguardare le api e i pronubi è obbligatorio sfalciare le eventuali fioriture sottostanti il vigneto almeno 48 ore prima dell'intervento

Realizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna