



Provincia di BOLOGNA

Bollettino di Difesa Integrata obbligatoria

del 22-07-2015

PREVISIONI DEL TEMPO

Fino alla giornata di venerdì /sabato tempo stabile con temperature allineate ai valori attuali . Dal fine settimana possibili arrivi di perturbazioni temporalesche con temporanei cali delle temperature.

Per informazioni dettagliate e in aggiornamento consultate le

[previsioni meteo ARPA Emilia Romagna](#)

COLTURE ERBACEE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Difesa

Cercospora: presenza di pustole confluenti intervenire.

Ripetere gli interventi a intervalli di 15-20 giorni e/o dopo piogge e irrigazione.

SOIA

Ragnetto Rosso: al superamento della soglia di 10 forme mobili per foglia su un campione di 100 foglie/ha intervenire. Se la soglia è superata solo sui bordi dell'apezzamento, limitarsi a trattare questi ultimi.

COLTURE ORTIVE

PATATA ingrossamento tuberi-maturazione

Difesa

Tignola: le catture sono in aumento prestare attenzione alle raccolte tardive in caso di catture elevate indicativamente 20 in due settimane intervenire

Peronospora: condizioni di rischio basso intervenire, possibilmente in modo preventivo rispetto alle piogge

Disseccamento parte aerea: nella varietà prossime alla raccolta è ammesso il disseccamento della parte aerea della coltura da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla raccolta con prodotti registrati per questo uso.

POMODORO PIENO CAMPO

DIFESA

Batteriosi: in caso di presenza intervenire

Peronospora: condizioni di rischio basso intervenire, in modo preventivo rispetto alle piogge

Nottua Gialla: intervenire in presenza di 2 piante con presenza di uova o larve su 30 piante controllate

Ragno rosso: intervenire in caso di presenza di focolai precoci

COLTURE ARBOREE

SUSINO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Monilia: intervenire in preraccolta con condizioni climatiche favorevoli come elevata umidità e bagnature prolungate

Cidia funebrana: volo e nascita larvale. Al superamento della soglia indicativa di 10 catture per trappola per settimana intervenire dopo 4-5 giorni

Ragno Rosso: si segnalano infestazioni al superamento del 60% di foglie occupate intervenire

PESCO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Monilia: intervenire in preraccolta con condizioni climatiche favorevoli come elevata umidità e bagnature prolungate

Cidia molesta: nascita larvale e volo terza generazione solo al superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana intervenire dopo 4-5 giorni dal superamento soglia con larvicidi

Anarsia: volo dove è stata superata la soglia di 7 catture per trappola per settimana o 10 catture in due settimane intervenire dopo 8-9 giorni con larvicidi

Tripide estivo: intervenire se presente nell'anno precedente

Cicaline: intervenire con infestazioni diffuse

Ragno Rosso: si segnalano infestazioni al superamento del 60% di foglie occupate intervenire

MELO ingrossamento frutti

Difesa

Carpocapsa: volo di seconda generazione e nascita larvale al superamento della soglia di 2 catture per trappola in due settimane dopo 6-7 giorni intervenire con prodotti larvicidi

Ragno rosso: si rilevano le prime presenze al superamento di 90% di foglie occupate in assenza di predatori intervenire

PERO ingrossamento frutti

Difesa

Maculatura bruna: condizioni di rischio medio e comparsa di sintomi. Intervenire in caso di pioggia e/o irrigazioni sulle varietà solitamente colpite (abate fetel, conference, decana, kaiser, ecc.)

Carpocapsa: volo di seconda generazione e nascita larvale al superamento della soglia di 2 catture per trappola in due settimane dopo 6-7giorni con prodotti larvicidi

Psilla: In presenza di melata intervenire con lavaggi

VITE ingrossamento acini

Difesa

Peronospora: intervenire prima di un evento piovoso

Oidio: rischio infezioni conidiche alto intervenire in previsione di pioggia

Tignoletta: Inizio terzo volo per la difesa si rimanda ai prossimi bollettini

Ragnetto giallo: intervenire al superamento della soglia di del 30-45% di foglie con forme mobili presenti

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

**In tutto il territorio della Provincia di Bologna
devono essere eseguiti 2 interventi obbligatori
nei confronti dello Scafoideo**

il 1° trattamento tra il 10 e il 20 di giugno

il 2° trattamento dopo circa 30 giorni ed entro il 31 luglio

Per salvaguardare le api e i pronubi è obbligatorio sfalciare le eventuali fioriture sottostanti il vigneto almeno 48 ore prima dell'intervento

Realizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna