



Provincia di BOLOGNA

Bollettino di Difesa Integrata obbligatoria

del 05-08-2015

PREVISIONI DEL TEMPO

(03/08/15)

La rimonta del campo di alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato con possibilità di brevi rovesci di pioggia sui rilievi appenninici nelle ore centrali della giornata. Temperature massime in progressivo aumento con picchi di 35/36 gradi nelle giornate di giovedì 6/8 e Venerdì 7/8. Possibile nuovo peggioramento del tempo nel prossimo week-end per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica.

Per informazioni dettagliate e in aggiornamento consultate le

[previsioni meteo ARPA Emilia Romagna](#)

COLTURE ERBACEE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Difesa

Cercospora: presenza diffusa intervenire sugli estirpi tardivi.

Ripetere gli interventi a intervalli di 15-20 giorni e/o dopo piogge e irrigazione.

Mamestra: si rilevano presenze di larve, intervenire al superamento della soglia di 2-3 larve pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare.

COLTURE ORTIVE

POMODORO PIENO CAMPO

DIFESA

Peronospora: condizioni di rischio basso intervenire in modo preventivo rispetto alle piogge

Ragno rosso: in caso di presenza di focolai precoci intervenire su raccolte tardive

Nottua Gialla : in presenza di 2 piante con presenza di uova o larve su 30 piante controllate intervenire

COLTURE ARBOREE

SUSINO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Monilia: intervenire in preraccolta con condizioni climatiche favorevoli come elevata umidità e bagnature prolungate

Cidia funebrana: volo e nascita larvale. Al superamento della soglia indicativa di 10 catture per trappola per settimana intervenire dopo 4-5 giorni

Ragno Rosso: si segnalano infestazioni, intervenire al superamento del 60% di foglie occupate

PESCO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Monilia: intervenire in preraccolta con condizioni climatiche favorevoli come elevata umidità e bagnature prolungate

Cidia molesta: volo e nascita larvale solo al superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana intervenire dopo 4-5 giorni dal superamento soglia con larvicidi

Anarsia: volo e nascita larvale dove è stata superata la soglia di 7 catture per trappola per settimana o 10 catture in due settimane intervenire dopo 8-9 giorni con larvicidi

Cimici: si segnalano presenze e danni principalmente su nettarine nelle aree di confine con la Provincia di Modena causati da HALYOMORPHA HALYS. Vi invitiamo alla massima attenzione e ricordiamo che alcuni principi attivi utilizzati su altri fitofagi risultano efficaci anche al contenimento di questo insetto .

Tripide estivo: intervenire se presente nell'anno precedente

Cicaline: con infestazioni diffuse è possibile intervenire

Ragno Rosso: si segnalano infestazioni intervenire al superamento del 60% di foglie occupate

MELO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Carpocapsa: quasi terminata la nascita larvale della seconda generazione intervenire al superamento della soglia di 2 catture per trappola in due settimane dopo 6-7 giorni con prodotti larvicidi

Cimici: si segnalano presenze e danni nelle aree di confine con la Provincia di Modena causati da HALYOMORPHA HALYS. Vi invitiamo alla massima attenzione e ricordiamo che alcuni principi attivi utilizzati su altri fitofagi risultano efficaci anche al contenimento di questo insetto .

Ragno rosso : si rilevano infestazioni al superamento di 90% di foglie occupate in assenza di predatori intervenire

PERO ingrossamento frutti /maturazione

Difesa

Maculatura bruna: condizioni di rischio medio e comparsa di sintomi. Intervenire in caso di pioggia e/o irrigazioni sulle varietà solitamente colpite (abate fetel, conference, decana, kaiser, ecc.)

Carpocapsa: inizio volo di terza generazione intervenire al superamento della soglia di 2 catture per trappola in due settimane dopo 6-7 giorni con prodotti larvicidi

Psilla: in presenza di melata intervenire con lavaggi

Cimici: si segnalano presenze e danni sulle varietà in raccolta nelle aree di confine con la Provincia di Modena causati da HALYOMORPHA HALYS. Vi invitiamo alla massima attenzione e se necessario ad intervenire

VITE ingrossamento acini /invaiaatura

Difesa

Peronospora: intervenire prima di un evento piovoso

Oidio: in previsione di pioggia intervenire

Botrite: intervenire nei vigneti solitamente attaccati o in caso di andamento climatico favorevole

Tignoletta: nascita larvale di terza generazione al superamento della soglia di 5% dei grappoli infestati intervenire

Ragnetto giallo: al superamento della soglia di del 30-45% di foglie con forme mobili presenti intervenire

Realizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna