

Bollettino straordinario per la difesa del frumento dalla Septoria 2015:

(comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale dell'Emilia Romagna)

a cura del dott. Tiziano Galassi (SFR-Bologna):

In considerazione del fatto che:

- 1) La coltura ha raggiunto lo stadio medio di accrescimento del 2°-3°internodo e in previsione che lo stadio fenologico della foglia bandiera possa essere raggiunto entro la secondo metà di aprile ;
- 2) Il modello previsionale in uso da parte della Regione Emilia-Romgna, sulla base delle previsioni meteorologiche , valuta al momento una pressione infettiva di media entità .
Si autorizza, a partire dal giorno 8 aprile, ad intervenire contro la septoriosi secondo le modalità riportate nei disciplinari di produzione integrata

Integrazione tecnica a cura della dott.ssa Clelia Tosi (SFR-sez. Ferrara):

INDICAZIONI TECNICHE PER **SEPTORIA GRANO**: occorre ricordare che se sono stati fatti dei fungicidi contro questa avversità in associazione all'applicazione dei diserbanti, questi normalmente risulteranno inefficaci in quanto **DISTRIBUITI NEL PERIODO NON CORRETTO**.

Gli impianti di grano raggiungono la maggiore sensibilità alla septoria nel periodo vicino alla emissione della foglia a Bandiera o fase BCH39 quest'anno mediamente prevista nella seconda settimana di aprile (tra il 7 ed il 12).

In quel periodo se ci saranno condizioni favorevoli al fungo sarà utile trattare. (Verificare in campo lo stadio fenologico).

Una soglia alternativa, già valutata positivamente per 3 anni dal Servizio Fitosanitario, considera utili per l'infezione alle piante i cicli di pioggia a partire dalla fase BCH31. In previsione del 4° ciclo è necessario trattare. Secondo questo metodo ad oggi abbiamo già avuto 2 cicli e quello pasquale sarà il 3°.

Il classico modello previsionale, inoltre, per adesso, indica ancora un rischio medio.

Quindi per ora si può dire che è ancora **PREMATURO TRATTARE** almeno fino al giorno 8 aprile.

Per la **RUGGINE BRUNA** è ancora prematuro trattare.