



# Provincia di Ravenna

## Bollettino di Difesa


### Integrata obbligatoria

**04 novembre 2015**

**PREVISIONI DEL TEMPO:**

Indicazione in sintesi e link con sito ARPA: <http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/regionali>

**PROFONDITA' DI FALDA**



Negli ultimi mesi è stato effettuato un minor numero di rilievi della profondità di falda. Dai dati disponibili risulta un livello di falda nella nostra provincia analogo a quello dell'autunno 2013 e più profondo, soprattutto per il punto di Lugo, rispetto al 2014.

N.B. E' possibile consultare i dati regionali di falda aggiornati al seguente indirizzo web:

<http://cloud.consorziocer.it/FaldaNET/retefalda/index>

## COLTURE ARBOREE

### ACTINIDIA.

**CANCRO BATTERICO:** intervenire nei frutteti di *Actinidia deliciosa* e *Actinidia chinensis* **dopo la raccolta, ad inizio caduta foglie**, ripetere l'intervento al 50-60% di caduta foglie e alla completa caduta foglie impiegando SALI di RAME. Fare attenzione sia alle dosi che al prodotto scelto (autorizzato contro questa avversità). Completare la difesa intervenendo dopo la potatura secca (entro 24-36 ore) e alla ripresa vegetativa (gemma cotonosa).

### ALBICOCCO e SUSINO.

**BATTERIOSI:** si consiglia di intervenire, **con piogge e bagnature persistenti, negli impianti con gravi defogliazioni in atto** impiegando SALI di RAME. Fare attenzione che il prodotto scelto sia autorizzato contro questa avversità.

### PESCO.

**BATTERIOSI:** si consiglia di intervenire, **con piogge e bagnature persistenti, negli impianti con gravi defogliazioni in atto** impiegando SALI DI RAME. Fare attenzione che il prodotto scelto sia autorizzato contro questa avversità.

### MELO e PERO.

**CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI** (*Nectria galligena* Bres./*Cylindrocarpon mali* (All.) Woll. e *Sphaeropsis malorum* Pec.): negli impianti gravemente colpiti dalla malattia si consiglia di asportare i rami colpiti dai cancri e di trattare al 20-30% di caduta foglie impiegando SALI di RAME; è opportuno ripetere il trattamento al 70-80% di caduta foglie.

### Diserbo frutteto-vigneto

In alternativa al controllo meccanico delle infestanti è possibile intervenire. L'epoca ottimale per l'esecuzione del diserbo va dal post raccolta fino all'inizio caduta foglie.

### COLTURE ERBACEE: cereali autunno-vernini

Diserbo.

Se si riscontrano infestanti emerse è possibile intervenire in **pre emergenza o post emergenza precoce**.

### COLTURE ORTICOLE

**CIPOLLA a semina autunnale: 1°- 2° foglia**

Diserbo.

Intervenire a partire dalla seconda foglia.

**Mosche dei bulbi:** controllare gli impianti e intervenire, dopo avere accertato la presenza dei primi danni.

Realizzato dal  
Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna