



Provincia di Ravenna

Bollettino di Difesa
Integrata obbligatoria

14 ottobre 2015

PREVISIONI DEL TEMPO:

Indicazione in sintesi e link con sito ARPA: <http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/regionali>

COLTURE ARBOREE

ALBICOCCO e SUSINO.

FITOPLASMI: controllare gli impianti e in presenza di piante con sintomi (precoce filloptosi) si consiglia di contattare il proprio tecnico.

BATTERIOSI: si consiglia di intervenire, **con piogge e bagnature persistenti**, negli impianti con **gravi defogliazioni in atto** impiegando SALI di RAME 40-50 g/hl di principio attivo. Fare attenzione che il prodotto scelto sia autorizzato contro questa avversità.

PESCO.

CANCRI RAMEALI: intervenire, **con piogge e bagnature persistenti**, solo sulle percoche o su pesche e nettarine con oltre il 15% di piante colpite.

BATTERIOSI: si consiglia di intervenire, **con piogge e bagnature persistenti**, negli impianti con **gravi defogliazioni in atto** impiegando SALI DI RAME 40-50 g/hl di principio attivo. Fare attenzione che il prodotto scelto sia autorizzato contro questa avversità.

MELO.

COLPO DI FUOCO BATTERICO: si consiglia di intervenire entro 24 ore dopo la pioggia.

TICCHIOLATURA ESTIVA: *Venturia inaequalis* (Cooke) Winter, *Spilocaea pomi* Fries.
Si consiglia di intervenire negli impianti colpiti.

MARCIUMI: *Gloeosporium album* Osterw. = *Phlyctaena vagabunda* Desm.; *Neofabraea alba* (E.J. Guthrie).
In caso di piogge, intervenire in pre-raccolta, indicativamente 30 - 40 gg dalla raccolta stessa.

MOSCA DELLA FRUTTA: *Ceratitis capitata* Wiedemann.

Max 1 tratt./anno contro questa avversità, fare attenzione alla presenza degli adulti (rilevabili tramite trappole). Intervenire in presenza di punture fertili.

BUTTERATURA AMARA: Sulle varietà sensibili è il momento di iniziare gli interventi che vanno distanziati tra loro di 10-15 giorni e proseguiti fino alla raccolta.

PERO.

COLPO DI FUOCO BATTERICO: si consiglia di intervenire entro 24 ore dopo la pioggia.

OLIVO: piena invaiatura Leccino-inizio invaiatura Frantoio.

MOSCA DELL'OLIVO: *Bactrocera oleae* Gmelin.

Il monitoraggio evidenzia una diminuzione del volo degli adulti ma ovideposizione quasi assente.

Pertanto non è necessario alcun trattamento larvicida.

Considerato lo stato di maturazione delle olive e al fine di contenere gli eventuali attacchi tardivi della mosca, si consiglia di procedere con una raccolta anticipata (a partire dal 15/20 ottobre).

VITE.

MAL DELL'ESCA: *Gli agenti responsabili di questa gravissima malattia del legno sono probabilmente i funghi dei generi Phaeoacremonium, Fomitiporia e Phaeomoniella. In ogni caso, la determinazione dei funghi responsabili del complesso esca è tuttora in corso.*

L'andamento stagionale ha favorito lo sviluppo dei patogeni e attualmente in molti vigneti, anche di giovane età (2-3 anni), la malattia si manifesta in modo preoccupante, mostrando un aumento dei sintomi di tipo apoplettico.

Si consiglia di:

- 1) contrassegnare le piante con sintomi evidenti o sospetti per non poterle assieme a quelle sane;
- 2) nei casi di piante lievemente colpite (frequenti negli impianti giovani 2-3 anni), si consiglia di asportare e distruggere la parte del ceppo invasa dal fungo eliminando totalmente il legno infetto e allevando un nuovo germoglio sano;
- 3) si consiglia altresì di asportare ed eliminare le piante morte.

Diserbo frutteto-vigneto

In alternativa al controllo meccanico delle infestanti è possibile intervenire. L'epoca ottimale per l'esecuzione del diserbo va dal post raccolta fino all'inizio caduta foglie.

COLTURE ERBACEE: cereali autunno-vernini

Diserbo.

Se si riscontrano infestanti emerse è possibile intervenire in **Pre-semina**. Si può anche trattare in **pre emergenza o post emergenza precoce**.

COLTURE ORTICOLE

CIPOLLA a semina autunnale: frusta/prima foglia.

Diserbo.

Intervenire in questa fase.

Realizzato dal
Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna