



Provincia di Ravenna

Bollettino di Difesa


Integrata obbligatoria

25 novembre 2015

PREVISIONI DEL TEMPO:

Indicazione in sintesi e link con sito ARPA: <http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/regionali>

PROFONDITA' DI FALDA



Negli ultimi mesi è stato effettuato un minor numero di rilievi della profondità di falda. Dai dati disponibili risulta un livello di falda nella nostra provincia analogo a quello dell'autunno 2013 e più profondo, soprattutto per il punto di Lugo, rispetto al 2014.

N.B. E' possibile consultare i dati regionali di falda aggiornati al seguente indirizzo web:

<http://cloud.consorziocer.it/FaldaNET/retefalda/index>

COLTURE ARBOREE

ACTINIDIA.

CANCRO BATTERICO: intervenire nei frutteti di *Actinidia deliciosa* e *Actinidia chinensis* ad inizio caduta foglie, ripetere l'intervento al 50-60% di caduta foglie e alla completa caduta foglie. Completare la difesa intervenendo dopo la potatura secca (entro 24-36 ore) e alla ripresa vegetativa (gemma cotonosa).

ALBICOCCO, CILIEGIO e SUSINO.

CORINEO e BATTERIOSI: si consiglia di intervenire, a completa caduta foglie.

PESCO.

BATTERIOSI: si consiglia di intervenire, a completa caduta foglie.

BOLLA e CORINEO: si consiglia di intervenire a completa caduta foglie.

MELO e PERO.

CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI (*Nectria galligena* Bres./*Cylindrocarpon mali* (All.) Woll. e *Sphaeropsis malorum* Pec.): negli impianti gravemente colpiti dalla malattia si consiglia di asportare i rami colpiti dai cancri e di trattare al 20-30% di caduta foglie; è opportuno ripetere il trattamento al 70-80% di caduta foglie.

Realizzato dal
Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna