



# Provincia di Ravenna

## Bollettino di Difesa


### Integrata obbligatoria

**02 dicembre 2015**

#### PREVISIONI DEL TEMPO:

Indicazione in sintesi e link con sito ARPA: <http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/regionali>

#### PROFONDITA' DI FALDA



Negli ultimi mesi è stato effettuato un minor numero di rilievi della profondità di falda. L'ultimo rilievo evidenzia una risalita della falda in conseguenza delle piogge autunnali.

N.B. E' possibile consultare i dati regionali di falda aggiornati al seguente indirizzo web:

<http://cloud.consoziocer.it/FaldaNET/retefalda/index>

---

---

## COLTURE ARBOREE

### ACTINIDIA.

**CANCRO BATTERICO:** intervenire nei frutteti di *Actinidia deliciosa* e *Actinidia chinensis* ad inizio caduta foglie, ripetere l'intervento al 50-60% di caduta foglie e alla completa caduta foglie. Completare la difesa intervenendo dopo la potatura secca (entro 24-36 ore) e alla ripresa vegetativa (gemma cotonosa).

### ALBICOCCO, CILIEGIO e SUSINO.

**CORINEO e BATTERIOSI:** si consiglia di intervenire, a completa caduta foglie.

### PESCO.

**BATTERIOSI:** si consiglia di intervenire, a completa caduta foglie.

**BOLLA e CORINEO:** si consiglia di intervenire a completa caduta foglie.

### MELO e PERO.

**CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI** (*Nectria galligena* Bres./*Cylindrocarpon mali* (All.) Woll. e *Sphaeropsis malorum* Pec.): negli impianti gravemente colpiti dalla malattia si consiglia di asportare i rami colpiti dai cancri e di trattare al 20-30% di caduta foglie; è opportuno ripetere il trattamento al 70-80% di caduta foglie.

Realizzato dal  
Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna