



Bollettino di produzione integrata e biologica n. 11 del 26 maggio 2016

Le indicazioni del presente bollettino sono relative all'applicazione della "Difesa integrata obbligatoria" e forniscono indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla "Difesa integrata volontaria" e degli ulteriori vincoli previsti dai Disciplinari di produzione integrata in applicazione delle seguenti norme: Regolamento 1698/2005/UE; Regolamento 1305/2013/UE; Regolamento 1308/2013/UE e Legge Regionale n. 28/99.

Queste indicazioni hanno valenza di carattere regionale e quindi non possono rappresentare tutte le diverse peculiarità territoriali.

Il bollettino è strutturato in due sezioni: la prima relativa alla Difesa integrata (obbligatoria e volontaria) e la seconda con informazioni sulle Tecniche agronomiche.

I testi ufficiali dei Disciplinari 2016 sono pubblicati sul sito della Regione Emilia Romagna e si possono scaricare da:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioniagroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2016>

Per informazioni sulle previsioni meteo consultare il link: <http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/regionali>

Per l'accesso al Bollettino agrometeorologico settimanale consultare il link: http://www.arpa.emr.it/sim/?agrometeo/bollettino_settimana



BOLLETTINO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

- Difesa integrata obbligatoria
- Difesa integrata volontaria

Il bollettino riporta le norme relative alla "Difesa integrata obbligatoria" e fornisce indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla "Difesa integrata volontaria". Dove non esplicitamente specificato, le indicazioni riportate hanno valenza sia per la "Difesa integrata obbligatoria" che per la "Difesa integrata volontaria".

I modelli previsionali sullo sviluppo delle principali avversità parassitarie sono consultabili al link <http://fitospa.agrinet.info>

Informazioni per la difesa integrata volontaria:

I testi ufficiali dei Disciplinari 2016 per la parte Difesa e controllo delle infestanti sono pubblicati sul sito della Regione E.R. e si possono scaricare dal link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2016>

Le deroghe concesse per la difesa integrata volontaria sono consultabili al link <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/deroghe>

ATTENZIONE

Il 23 maggio è stata emessa un' integrazione alle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti, che prevede l'autorizzazione all'impiego di nuovi prodotti fitosanitari, revoche e ulteriori modifiche del disciplinare di produzione integrata. L'elenco delle modifiche è consultabile al link

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/deroghe>

Colture erbacee

Barbabetola da zucchero

Fase: chiusura interfila

Diserbo

Intervenire solo in caso di infestazioni particolari

Afide

Il 17 maggio è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con dimetoato per la difesa della bietola e della bietola da seme dalle infestazioni di afide nero e divieto di impiego di pirimicarb sulle medesime colture.

Cleono

In **difesa integrata volontaria** intervenire al superamento della soglia di 2 adulti per vaso trappola/settimana o del 10% di piante delle file più esterne con erosioni fogliari.

Nottue fogliari

Si segnalano le prime comparse. In **difesa integrata volontaria** la soglia è di 2-3 larve per pianta con distruzione del 10% dell'apparato fogliare.

Mais

Fase: 6-12 foglie

Diserbo

Post-emergenza: intervenire dalla 3^a foglia con inerbimenti sulla fila, soprattutto dove si sono riscontrate riduzioni di efficacia dei graminicidi specifici nei confronti del giavone.

Il 23 aprile è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato AF-X12016, contenente microrganismo *Aspergillus flavus* ceppo M1CL34911 e valida per il periodo 21 aprile - 18 agosto 2016.

Il 27 aprile è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "SEMPRA" a base di halosulfuron-metile entro il 18 agosto 2016 per il diserbo in post emergenza del mais.

Nottue terricole

Si segnala la presenza. In **difesa integrata volontaria** la soglia di intervento è la presenza diffusa di attacchi iniziali.

Mais dolce

Fase: 5-8 foglie

L'11 maggio è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "Merlin FLEXX" a base di isoxaflutole per il diserbo. L'impiego consentito nel periodo 21 aprile - 18 agosto 2016.

Riso

Fase: emergenza-3 foglie

Diserbo

Il 27 aprile è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato Stam Novel Flo 2016 a base di Propanile entro il 30 luglio 2016 per il controllo delle infestanti del riso e una seconda deroga per l'utilizzo del formulato "Facet L" a base di quinclorac entro il 30 luglio 2016 per il diserbo del riso in post emergenza.

Soia

Fase: emergenza-quarta foglia trilobata

Diserbo

Post-emergenza: dalla fase di prima foglia trilobata intervenire in presenza di infestanti.

Il 4 aprile è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo di fluazifop-p-butile in sostituzione del cicloxidim per il diserbo delle graminacee.

Sorgo

Fase: emergenza-6 foglie

Diserbo

Post-emergenza: intervenire dalla 4^a alla 6^a foglia con infestazioni miste.

Colture arboree

Diserbo arboreo

Per la **difesa integrata volontaria** il diserbo su tutte le colture arboree è ammesso solo localizzato sulla fila e l'area trattata deve essere inferiore al 50% del totale.

Prodotti rameici

Difesa integrata volontaria: ricordarsi che i prodotti rameici possono essere impiegati

solo nella misura massima di 6 kg di sostanza attiva (rame metallo) per ettaro nell'arco dell'anno. Il calcolo va effettuato dai trattamenti eseguiti dopo il 22 febbraio 2016.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

Sono in corso i monitoraggi territoriali, attualmente si segnala la presenza di adulti in fase di accoppiamento, principalmente nella provincia di Modena e in parte nelle province di Reggio Emilia, Bologna e Ferrara e in particolare nelle aree di confine con la provincia di Modena. A breve inizieranno le ovodeposizioni. La presenza dell'insetto è rilevata soprattutto sui bordi dei frutteti e sulle siepi adiacenti.

Actinidia

Fase: allegagione-ingrossamento frutto

Cancro batterico

Vista l'elevata presenza di sintomi della batteriosi si consiglia di effettuare interventi preventivi in previsione di pioggia anche nelle aziende che al momento non manifestano la presenza della malattia. E' importante controllare bene gli impianti per verificare se ci sono macchie fogliari a contorno poligonale e avvizzimenti, nel qual caso asportare le parti colpite e allontanarle dagli impianti.

Il 27 aprile è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "SITOFEX" a base di forchlorfenuron per la difesa dell'actinidia dal cancro batterico (PSA), impiego consentito nel periodo 21 aprile-18 agosto 2016.

Il 28 aprile è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "BION 50 WG" a base di acibenzolar-S-metile per la difesa dell'actinidia dal cancro batterico (PSA); impiego consentito nel periodo 21 aprile - 18 agosto 2016

Sempre il 28 aprile è stata emessa un'ulteriore deroga valida per l'intero territorio regionale per l'impiego di alcuni formulati a base di rame per la difesa dell'actinidia dal cancro batterico (PSA); impiego consentito nel periodo 27 aprile – 24 agosto 2016.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base dei composti di rame autorizzati per 120 giorni:Kop-Twin, Cuprofix Ultra, Poltiglia Disperss, Cuprocaffaro Micro, Airone Più, Bordoflow New, Poltiglia 20 PB Green, Cobre Nordox Super 75 WG, Zetaram Hi Tech.

Albicocco

Fase: ingrossamento frutto-raccolta

Oidio

Si consiglia di intervenire negli impianti solitamente colpiti.

Afide farinoso

In caso di presenza localizzare l'intervento nelle aree infestate.

Anarsia

Presenza di adulti, ovideposizione in corso e inizio nascita larvale. Si ricorda che la soglia di intervento è di 7 catture per trappola a settimana o 10 catture in due settimane. In **difesa integrata volontaria** la soglia non è vincolante per chi applica la confusione e per chi utilizza il *Bacillus thuringiensis*.

Capnode

Sono segnalate presenze di adulti negli ambienti collinari.

Forficula

In caso di danni riscontrati nell'anno precedente, si consiglia di applicare un anello di colla sul tronco delle piante in modo da formare una barriera ed impedire alle forficule di salire sulle piante e danneggiare la produzione.

Ciliegio

Fase: accrescimento frutti-raccolta

Monilia

Da invaiatura, con condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo dell'infezione, quali elevata umidità e bagnature prolungate, è opportuno intervenire.

Afidi

Intervenire in caso di infestazioni. In **difesa integrata volontaria** intervenire alla presenza nelle aree ad elevato rischio di infestazioni e al superamento della soglia del 3% di organi infestati nelle restanti aree.

Il 13 maggio è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio regionale per l'esecuzione di un intervento con deltametrina contro gli afidi nella fase di pre raccolta. Si ricorda che la deltametrina è attiva anche nei confronti di *Drosophila suzukii*.

Drosophila suzukii

I monitoraggi in campo segnalano alta presenza dell'insetto. Si rilevano consistenti ovodeposizioni e danni alla raccolta. La fase di rischio ha inizio in corrispondenza dell'invaiatura. Si consiglia di intervenire a partire dall'invaiatura.

Il 6 maggio è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "EXIREL 2016" a base di cyantraniliprole; impiego consentito nel periodo 4 maggio-12 agosto 2016.

Il 16 maggio è stata emessa una precisazione sulla deroga del 06/05/2016 valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "EXIREL 2016" a base di cyantraniliprole.

Mosca del ciliegio

Continuano gli sfarfallamenti degli adulti. Intervenire nella fase di invaiatura solo dopo avere accertato la presenza degli adulti nelle trappole cromotropiche gialle (vincolante per la **difesa integrata volontaria**).

Melo

Fase: accrescimento frutto-frutto noce

Butteratura amara

Sulle varietà sensibili si consiglia di intervenire.

Oidio

Presenza di germogli infetti. Intervenire sulle varietà più recettive nelle aree a maggiore rischio.

Ticchiolatura

E' terminato il volo ascosporico. Si rileva una presenza consistente della malattia. Negli impianti dove non si evidenziano sintomi, sospendere gli interventi. Negli impianti colpiti si consiglia di mantenere coperta la vegetazione in previsione di pioggia.

Afide lanigero

Si segnala la presenza in alcune aree. In **difesa integrata volontaria** intervenire al superamento della soglia di 10 colonie su 100 organi. Verificare la presenza di *Aphelinus mali* che può contenere efficacemente le infestazioni.

Carpocapsa

Il volo è in fase calante, l'ovideposizione è quasi al termine e prosegue la nascita larvale. Dove è stata superata la soglia di 2 adulti/trappola intervenire con prodotti larvicidi. In **difesa integrata volontaria** questa soglia costituisce un vincolo (sono escluse le aziende in confusione sessuale).

Olivo

Fase: mignolatura

Occhio di pavone o cicloconio

Si segnala la presenza della malattia a seguito delle temperature miti del periodo. Eventuali interventi fitosanitari vanno posizionati nella fase di "oliva a grano di pepe".

Tignola

Sta iniziando la prima generazione che si sviluppa sui fiori. Eventuali trattamenti fitosanitari vanno posizionati dopo l'allegagione nella fase di "oliva a grano di pepe" e in funzione dell'ovodeposizione.

Pero

Fase: accrescimento frutti-frutto noce

Colpo di fuoco

Presenza di fioriture secondarie, il periodo è a rischio medio/alto, in particolare negli impianti giovani e nei frutteti solitamente colpiti. In presenza di forti temporali con vento e di grandinate, si consiglia di intervenire. In caso di germogli infetti, tagliare le parti colpite e bruciarle nel minore tempo possibile.

Si ricorda che è importante eliminare le fioriture secondarie.

Maculatura bruna

Sono iniziati i voli dei conidi per cui il rischio infettivo, confermato dal modello previsionale, è alto. In previsione di pioggia si consiglia di intervenire.

Ticchiolatura

E' terminato il volo ascosporico. Si rileva una presenza consistente della malattia. Negli impianti dove non si evidenziano sintomi, sospendere gli interventi. Negli impianti colpiti si consiglia di mantenere coperta la vegetazione in previsione di pioggia.

Carpocapsa

Il volo è in fase calante, l'ovideposizione è quasi al termine e prosegue la nascita larvale. Dove è stata superata la soglia di 2 adulti/trappola intervenire con prodotti larvicidi. In **dife-**

sa integrata volontaria questa soglia costituisce un vincolo (sono escluse le aziende in confusione sessuale).

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

Si consiglia di verificare aziendali la necessità di un intervento insetticida eventualmente localizzato o limitato alle aree di maggiore infestazione.

Psilla

Si osserva una situazione disforme da zona a zona, con adulti in accoppiamento, presenza di uova, neanidi e prime ninfe. In **difesa integrata volontaria** si può intervenire solo con presenza elevata di uova.

Pesco

Fase: ingrossamento frutti-indurimento nocciolo

Batteriosi

Intervenire sulle varietà solitamente colpite in previsione di piogge prolungate che determinano bagnature superiori alle 48 ore e con temperature medie comprese dai 14° C ai 19° C.

Fusicocco

Le condizioni sono ottimali per la sporulazione, intervenire in presenza di prolungate bagnature.

Monilia

Intervenire ad indurimento nocciolo sulle varietà suscettibili in presenza di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (bagnature fogliari prolungate).

Oidio

Si consiglia di intervenire in presenza di sintomi.

Afide farinoso

In caso di presenza localizzare l'intervento nelle aree infestate.

Afide verde

Intervenire al superamento della soglia del 3% di organi infestati sulle nettarine e del 10% su pesche e percoche. Questa soglia è vincolante per chi applica la **difesa integrata volontaria**.

Anarsia

Presenza di adulti, ovideposizione in corso e inizio nascita larvale. Si ricorda che la soglia di intervento è di 7 catture per trappola a settimana o 10 catture in due settimane. In **difesa integrata volontaria** la soglia non è vincolante per chi applica la confusione e per chi utilizza il *Bacillus thuringiensis*.

Cydia molesta

E' iniziato il secondo volo, controllare le trappole e intervenire al superamento della soglia di 10 catture/rappola per settimana. Questa soglia è vincolante per chi applica la **difesa integrata volontaria**. Si consiglia di verificare la presenza di getti colpiti dalle larve della prima generazione anche nelle aziende che applicano la confusione sessuale.

Susino

Fase: varietà europee e cino-giapponesi ingrossamento frutti

Batteriosi

Intervenire sulle varietà cino-giapponesi solitamente colpite, in previsione di piogge prolungate che determinano bagnature superiori alle 48 ore e con temperature medie comprese dai 14°C ai 19° C.

Afide farinoso

In caso di presenza localizzare l'intervento nelle aree infestate.

Afide verde

Intervenire al superamento della soglia del 10% di organi infestati. Il rispetto della soglia è vincolante per chi applica la **difesa integrata volontaria**.

Cydia funebrana

Il volo è in esaurimento. Non sono consigliati interventi fitosanitari.

Vite

Fase: bottoni fiorali separati-inizio fioritura

Oidio

Sono già visibili i sintomi delle infezioni primarie. Il rischio infettivo è elevato, si consiglia di tenere coperta la vegetazione. Il potenziale di inoculo ascosporico maturato va dal 70% al 90%.

Peronospora

Sono visibili i sintomi relativi alle piogge dell'11 maggio. Il potenziale di inoculo ascosporico maturato va dal 60% al 90%. Il 10% del potenziale di inoculo sta terminando la fase di germinazione e potrebbe intercettare le piogge previste a partire dal fine settimana. In questa fase fenologica il rischio è elevato, pertanto si consiglia di intervenire in previsione di pioggia.

Tignoletta

Il volo degli adulti è terminato. Sulla prima generazione non sono necessari interventi fitosanitari. In **difesa integrata volontaria** i trattamenti contro la prima generazione non sono ammessi.

Colture orticole

Cipolla

Fase: semina primaverile: 8-10 foglie; semina autunnale: raccolta

Diserbo

Intervenire in post-emergenza in presenza di infestanti.

Batteriosi

Intervenire con prodotti rameici in presenza dei primi sintomi.

Botrite

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Peronospora

Intervenire in previsione di pioggia.

Tripidi

Intervenire in caso di presenza.

Cocomero

Fase: allegazione-ingrossamento frutto

Oidio

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Afidi

Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni o effettuare lanci di ausiliari.

Ragnetto rosso

Intervenire alla comparsa dell'insetto con lanci di ausiliari.

Melone

Fase: allegazione-ingrossamento frutto

Oidio

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Afidi

Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni o effettuare lanci di ausiliari.

Ragnetto rosso

Intervenire alla comparsa dell'insetto con lanci di ausiliari.

Patata

Fase: chiusura interfila-ingrossamento tuberi

Peronospora

La pressione infettiva è medio-alta. Intervenire in previsione di pioggia.

Dorifora

Controllare la nascita larvale. Intervenire in caso di infestazione generalizzata (soglia vincolante per la **difesa integrata volontaria**).

Nottue terricole

Intervenire in caso di presenza diffusa delle giovani larve (soglia vincolante per la **difesa integrata volontaria**).

Tignola

Il volo nel complesso è basso, pertanto si consiglia di non intervenire. Controllare le trappole per il monitoraggio degli adulti. In **difesa integrata volontaria** l'impiego delle trappole è vincolante. In prima generazione la soglia indicativa è di 20 catture cumulate in 2 settimane.

Pisello

Fase: allegazione-raccolta

Peronospora

Intervenire in previsione di pioggia.

Il 6/5/2016 è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio regionale per l'esecuzione di un secondo intervento con cymoxanil per la difesa dalla peronospora.

Afidi

Intervenire in presenza di infestazioni diffuse e con colonie in accrescimento.

Pomodoro

Fase: trapianto-allegazione primo palco

Diserbo

Post-trapianto: in funzione delle infestanti attese intervenire con i prodotti specifici.

Batteriosi

Negli impianti con vegetazione più sviluppata si consiglia di intervenire.

Peronospora

Intervenire in previsione di pioggia sugli impianti più sviluppati (dal terzo palco fogliare).

Nottue terricole

Si rileva la presenza. In **difesa integrata volontaria intervenire** al superamento della soglia di 1 larva per 5 metri lineari di fila in quattro punti di 5 metri lineari cadauno lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello sviluppo.

Cavoli di Bruxelles e cavoli a foglia

ATTENZIONE: è vietata la vendita e l'utilizzo di prodotti a base di metazaclor e di pirimicarb.

BOLLETTINO REGIONALE TECNICHE AGRONOMICHE

Scelta varietale

La lista delle varietà raccomandate riportate negli allegati alle schede tecniche di coltura è da considerarsi come un consiglio funzionale al rispetto del disciplinare di produzione e non un vincolo.

Assume carattere vincolante per i soli regolamenti che prevedono il sostegno alle spese previste da un piano di investimento aziendale. In questi casi vale il seguente vincolo:

Per colture frutticole e asparago il piano di riconversione varietale deve rispettare per ogni specie la messa a dimora di almeno il 70% della superficie con le cultivar previste nelle Liste di orientamento varietale.

Avvicendamento

Le tecniche di avvicendamento conformi ai Disciplinari di produzione integrata sono riportate nel capitolo 7 “Avvicendamento” delle Norme generali e nelle Norme tecniche di coltura disponibili al link:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2016>

Si ricorda che oltre ai i vincoli di intervallo minimo e di successione colturale riportati nelle Norme tecniche di ogni singola coltura, la regola delle tre colture diverse in cinque anni deve essere rispettata sempre nel corso di tutti gli anni di impegno, sia dagli aderenti alla Azione 1 “Produzione integrata” della Misura 214 del Psr 2007-2013, che dagli aderenti alla Operazione 10.1.01 della Misura 10 del PSR 20014-2020. In entrambi i casi sopra citati sia in caso di “Introduzione” che di “Mantenimento”.

Tale regola deve quindi essere applicata anche dalle Aziende che proseguono gli impegni assunti in base al Reg. (CE) 1698/2005 inclusa la verifica delle colture presenti negli anni precedenti. Relativamente alla verifica di colture presenti negli anni precedenti, per le aziende con impegni in corso e per le sole semine dell'autunno 2015, non si applica la distinzione delle colture in base al genere.

Per la sola applicazione in ambito Marchio “QC” e all'interno dei Programmi Operativi della OCM Ortofrutta si applicano solo i vincoli di intervallo minimo e di successione colturale riportati nelle Norme tecniche di ogni singola coltura.

Fertilizzazione

I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio software specifico scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna - http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/dpi_2016/norme-general-2016


In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura. Per alcune colture da seme è possibile utilizzare solo il metodo schede a dose standard.

I piani di fertilizzazione devono essere redatti in ciascuna annualità:


- entro il 28 febbraio per le colture erbacee e foraggere
- entro il 15 aprile per le colture orticole, arboree e sementiere.

Per la corretta predisposizione dei piani di fertilizzazione, oltre alla conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno, occorre disporre del dato delle precipitazioni nel periodo autunno invernale. Se non è disponibile un dato da capannina in loco e/o un pluviometro aziendale, si possono utilizzare le informazioni riportate nei bollettini agro-meteo settimanali e mensili del Servizio Idro meteo clima di ARPAE (<http://www.arpa.emr.it/sim/>).


Cartina delle precipitazioni utile per valutare eventuali incrementi azotati nelle schede a dose standard in caso di surplus pluviometrico.



Cartina delle precipitazioni utile per valutare le perdite di "azoto pronto" nel metodo del bilancio.



Cartina delle precipitazioni utile per valutare le perdite di azoto nel mese di febbraio col metodo del bilancio.



Supporto alla fertilizzazione per il frumento

Nei bollettini agro-meteo settimanali di ARPAE è ora disponibile un supporto alla fertilizzazione, ancora in fase sperimentale, che fornisce una previsione a breve termine (2 giorni) e a medio termine (7 giorni) dei fenomeni di ruscellamento superficiale e di fuoriuscita dell'acqua dai primi strati di terreno che potrebbero determinare la perdita delle forme azotate. Tale informazione può essere utile per evitare di effettuare concimazioni azotate qualora siano previste nei giorni immediatamente seguenti precipitazioni che possono determinare un alto rischio di perdite.

Nell'ultimo bollettino settimanale agro-meteo, il n° 18/2016, alla pagina 17/18 è riportata la previsione delle possibili perdite fino al giorno 18 maggio. Vedi Link:

http://www.arpa.emr.it/sim/?agrometeo/bollettino_settimana

Irrigazione

Le indicazioni per la applicazione delle tecniche di irrigazione conformi ai Disciplinari di produzione integrata sono riportate nel capitolo 12 "Irrigazione" delle Norme generali e nelle Norme tecniche di coltura disponibili al link:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2016>

L'accesso al sistema Irrinet ai fini della applicazione dell'Impegno aggiuntivo facoltativo n.25 della Operazione 10.1.01 (Produzione integrata) e della Misura 11 (Agricoltura Biologica) è disponibile al link: http://www.irriframe.it/irriframe/home/Index_er

Elaborazione del 24 maggio

Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet, le seguenti colture di Cocomero, Melone ed orticole in serra o in tunnel e barbabietola da zucchero e da seme, aglio, cipolla, fagiolino, fragola, cocomero, melone, patata, pomodoro da industria, orticole in pieno campo e colture arboree, ad esclusione della vite.