



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



**Regione Emilia-Romagna**

## L'Europa investe nelle zone rurali

Organismo responsabile: C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali  
Autorità di Gestione: Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca

 <p><b>Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020</b></p>	<p><b>ALLEGATO</b> n. 09 del 26/06/2019</p> <p><b>COLTURE ORTICOLE DA MERCATO FRESCO</b></p> <p><b>Provincia di Bologna</b></p>	 <p><b>CRPV</b> soc. coop. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI</p>
--	---	---

Attenzione all'impiego di prodotti rameici: si invita a verificare con cura le colture registrate riportate nelle nuove etichette.

### Colture in serra

#### CETRIOLO in coltura protetta

Fase fenologica: trapianti – raccolta

##### Difesa

Arieggiare le serre e limitare le irrigazioni per evitare ristagni idrici.

**OIDIO**: alla comparsa dei primi sintomi intervenire con bicarbonato di potassio o zolfo o metrafenone (al massimo 2 interventi all'anno) o bupirimate (al massimo 2 interventi all'anno).

Con lo zolfo si consiglia di adottare le dosi d'impiego minime da etichetta per ridurre i rischi di fitotossicità. Sconsigliato lo zolfo colloidale. Lo zolfo è tossico per gli adulti di fitoseide.

**PERONOSPORA**: in condizioni predisponenti la malattia intervenire preventivamente con zoxamide (al massimo 3 interventi) o propamocarb (massimo 2) o fosetyl-Al.

**NEMATODI**: in caso di presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni intervenire con fluopyram in pre-trapianto attraverso l'irrigazione a goccia. Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Isopyrazam e Fluxaproxad al massimo 2 interventi all'anno.

**AFIDI**: in presenza di infestazioni intervenire con spirotetramat (al massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (al massimo 1 intervento all'anno) o flonicamid (al massimo 2 interventi all'anno) o sulfoxaflo. Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari.

Da inizio raccolta si consiglia di privilegiare la lotta biologica: alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo i primi lanci settimanali di *Aphidius colemani* (0,5-1/m<sup>2</sup>) oppure con *Crisoperla carnea*.

Se si interviene chimicamente dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida a seconda dell'ausiliare introdotto:

- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide (*Phytoseiulus persimilis*)
- 15-20 giorni dopo il lancio di *Orius* spp.

**RAGNETTO ROSSO:** alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Amblyseius andersonii* oppure con *Phytoseiulus persimilis*. In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox o bifenazate o spiromesifen o abamectina. Quest'ultimo è efficace anche contro i tripidi.

**TRIPIDI:** alla prima comparsa, su colture in raccolta, ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Amblyseius cucumeris*, eventualmente associato ad *Orius* spp. In alternativa intervenire con spinosad.

## Melanzana in coltura protetta

Fase fenologica: sviluppo vegetativo-raccolta

---

### Difesa

**MUFFA GRIGIA** (*Botrytis cinerea*): in caso di andamento climatico particolarmente umido intervenire formulati a base di piraclostrobin+boscalid o ciprodinil+fludioxonil.

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con spirotetramat (al massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (al massimo 1 all'anno) o flupyradifurone (al massimo 1 all'anno) o sulfoxaflor. Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari.

Da inizio raccolta si consiglia di privilegiare la lotta biologica: alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo i primi lanci settimanali di *Aphidius colemani* (0,5-1/m<sup>2</sup>) oppure con *Crisoperla carnea*.

Se si interviene chimicamente dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida a seconda dell'ausiliare introdotto:

- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide (*Phytoseiulus persimilis*)
- 15-20 giorni dopo il lancio di *Orius* spp.

**DORIFORA:** si segnala la presenza dell'insetto. In presenza di giovani larve si consiglia di intervenire con metaflumizone (al massimo 2 interventi).

**RAGNETTO ROSSO:** alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Amblyseius andersonii* (alla primissima presenza) oppure con *Phytoseiulus persimilis*. In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox o bifenazate o spiromesifen (al massimo 2) o abamectina. Quest'ultimo è efficace anche contro i tripidi.

Complessivamente sono consentiti al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità.

**TRIPIDI:** alla presenza intervenire con spinosad (al massimo 3 interventi all'anno) o spinetoram (deroga in seguito ad uso eccezionale) oppure, alla prima comparsa, ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Amblyseius cucumeris*, eventualmente associato ad *Orius* spp. In alternativa intervenire con spinosad.

**MIRIDI:** alla presenza intervenire con etofenprox (al massimo 3 interventi all'anno).

**Deroga** N° 495469 del 29 maggio 2019: è consentito l'impiego di spinetoram (EXALT 2019) per la difesa della lattuga e della melanzana in serra e in pieno campo dai tripidi (*Frankliniella occidentalis*). Si tratta di un uso eccezionale valido per 120 giorni a partire dal 01 giugno 2019 al 01 ottobre 2019.

# MELONE IN COLTURA PROTETTA

Fase fenologica: raccolta

---

## Difesa

Arieggiare le serre e limitare le irrigazioni per evitare ristagni idrici.

**CANCRO GOMMOSO:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con azoxistrobin o difenoconazolo+ciflufenamid (al massimo 1 intervento all'anno).

Consentiti al massimo 2 interventi all'anno tra azoxistrobin e trifloxistrobin.

**OIDIO:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con bicarbonato di potassio o zolfo o metrafenone (al massimo 2 interventi all'anno) o bupirimate (al massimo 2 interventi all'anno).

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni climatiche favorevoli alla malattia: sulle colture più sviluppate intervenire con dimetomorf o mandipropamide o azoxistrobin o zoxamide (al massimo 3 interventi all'anno) o cyazofamide (al massimo 3 interventi all'anno). Complessivamente tra dimetomorf, iprovalicarb e mandipropamide sono consentiti al massimo 4 trattamenti all'anno.

**AFIDI:** alla presenza dei primi alati intervenire con spirotetramat (al massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (al massimo 1 intervento all'anno) o flonicamid (al massimo 2 interventi all'anno non consecutivi) o sulfoxaflor (al massimo 2 interventi all'anno).

Si ricorda il divieto di trattare le colture in fioritura.

**RAGNETTO ROSSO:** in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox, bifenazate o spiromesifen.

# Peperone in coltura protetta

Fase fenologica: sviluppo vegetativo - raccolta

---

## Difesa

Arieggiare le serre e limitare le irrigazioni per evitare ristagni idrici.

**CANCRENA PEDALE (*Phytophthora capsici*):** intervenire durante le prime fasi vegetative alla comparsa dei primi sintomi con i formulati registrati a base di *Trichoderma asperellum*+*T. gamsii* o *Trichoderma asperellum*+*T. atroviride* o propamocarb (al massimo 2 interventi con irrigazione a goccia).

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con acetamiprid (al massimo 1 all'anno) o flupyradifurone (al massimo 1 all'anno) o sulfoxaflor o pimetrozine (ammesso solo se si fa lancio di insetti utili). Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari.

Da inizio raccolta si consiglia di privilegiare la lotta biologica: alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo i primi lanci settimanali di *Aphidius colemani* (0,5-1/m<sup>2</sup>) oppure con *Crisoperla carnea*.

Se si interviene chimicamente dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida a seconda dell'ausiliare introdotto:

- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide (*Phytoseiulus persimilis*)
- 15-20 giorni dopo il lancio di *Orius* spp.

**TRIPIDI:** alla presenza intervenire con spinosad (al massimo 3 interventi all'anno) oppure, alla prima comparsa, ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Orius laevigatus*.

**NOTTUE FOGLIARI:** alla presenza intervenire con *Bacillus thuringiensis*, clorotraniliprole (al massimo 2 interventi all'anno) o con emamectina (al massimo 2 interventi all'anno) o con metaflumizone (al massimo 2 interventi all'anno).

**RAGNETTO ROSSO:** alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Phytoseiulus persimilis*. In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox o bifenazate o spiromesifen o abamectina. Quest'ultimo è efficace anche contro i tripidi.

**PIRALIDE:** alla presenza di adulti nelle trappole oppure di ovideposizioni o dei primi fori larvali intervenire con *Bacillus thuringiensis* o clorotraniliprole (al massimo 2 trattamenti).

## Pomodoro in coltura protetta

Fase fenologica: sviluppo vegetativo-inizio raccolta

---

### Difesa

Arieggiare le serre e limitare le irrigazioni per evitare ristagni idrici.

**MUFFA GRIGIA (*Botrytis cinerea*):** in caso di andamento climatico particolarmente umido intervenire con ciprodinil+fludioxonil o piraclostrobin+boscalid.

Consentiti al massimo 2 interventi per ciclo contro questa avversità.

Con fludioxonil ammesso al massimo 1 intervento all'anno. Tra piraclostrobin, famoxadone, azoxistrobin e trifloxistrobin consentiti al massimo 3 interventi all'anno. Tra boscalid, fluopiram, fluxapiraxad, pentiopirad e isopirazam consentiti al massimo 3 interventi all'anno.

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni predisponenti la malattia eseguire trattamenti con sali di rame o metalaxil-m+rame (tra metalaxil e metalaxil-m al massimo 3 trattamenti all'anno) o piraclostrobin+dimetomorf. Tra piraclostrobin, famoxadone, azoxistrobin e trifloxistrobin consentiti al massimo 3 interventi all'anno. Complessivamente tra dimetomorf, iprovalicarb e mandipropamide al massimo 4 interventi all'anno.

Si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di rame metallo.

**TIGNOLA DEL POMODORO (*Tuta absoluta*):** si consiglia di installare le trappole a feromone sessuale per il monitoraggio del volo dei maschi. Per la difesa si può fare ricorso all'impiego di diffusori per confusione sessuale. Alla presenza intervenire con *Bacillus thuringiensis* o emamectina o clorotraniliprole.

**NOTTUA GIALLA DEL POMODORO:** si consiglia di installare le trappole a feromone sessuale per il monitoraggio del volo dei maschi. Alla presenza di uova o larve su 2 piante per appezzamento ogni 30 piante controllate intervenire con *Bacillus thuringiensis* o emamectina o clorotraniliprole o indoxacarb.

**RAGNETTO ROSSO:** in caso di presenza generalizzata intervenire con exitiazox o bifenazate o spiromesifen o abamectina. Quest'ultimo è efficace anche contro i tripidi.

Contro questa avversità sono consentiti al massimo 2 interventi all'anno e non si possono impiegare più di 2 sostanze attive in miscela.

## Colture in pieno campo

### ASPARAGO

Fase fenologica: post-raccolta

---

#### Difesa

**RUGGINE:** intervenire con prodotti rameici o azoxystrobin o difenoconazolo o piraclostrobin+boscalid (al massimo 2 interventi all'anno).

Si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di rame metallo.

Complessivamente al massimo 2 interventi tra difenoconazolo, tebuconazolo e ciproconazolo.

Complessivamente al massimo 2 interventi tra azoxystrobin e piraclostrobin.

**CRIOCERA:** in caso di elevata presenza di larve o adulti durante i primi due anni di impianto intervenire con deltametrina.

#### Diserbo

Eseguire una lavorazione meccanica nell'interfila e un trattamento disseccante con glifosate o acido pelargonico contro graminacee e dicotiledoni sulla fila. Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

Successivamente intervenire sulla fila con pendimetalin+clomazone o isoxaben+oryzalin o oxadiazon.

#### Fertilizzazione

Adottando le schede Dose Standard per la concimazione, i massimali da rispettare per produzioni da 5,5 a 8,5 t/ha sono:

**Azoto:** 160 kg/ha frazionato al trapianto e nel corso del ciclo colturale.

**Fosforo:** distribuire alla preparazione del terreno; 150 kg/ha dotazione scarsa; 100 kg/ha dotazione media; 50 kg/ha dotazione elevata.

**Potassio:** distribuire alla preparazione del terreno: 240 kg/ha dotazione scarsa; 160 kg/ha dotazione media; 60 kg/ha dotazione elevata.

### BIETOLA DA COSTA

Fase fenologica: da semina/trapianto a raccolta

---

#### Difesa

**BOTRITE:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con piraclostrobin+boscalid (al massimo 2 interventi all'anno). Efficace anche contro cercospora.

**CERCOSPORA:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con sali di rame. Efficaci anche contro le batteriosi. Si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di rame metallo.

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con acetamiprid (al massimo 1 intervento all'anno) o lambdacialotrina (al massimo 3 interventi per ciclo tra tutti i piretroidi, compreso etofenprox).

**ALTICA:** in presenza di infestazioni diffuse intervenire con acetamiprid (al massimo 1 trattamento).

**CHIOCCIOLE E LIMACCE:** in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali intervenire con metaldeide esca o fosfato ferrico.

## Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 2 giorni prima della semina, 8 giorni prima del trapianto.

Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In pre-semina è possibile utilizzare met amitron.

In pre-emergenza: contro graminacee e dicotiledoni utilizzare met amitron o cloridazon o S-metolachlor.

S-metolachlor è ammesso solo tra febbraio e agosto.

Attenzione: con cloridazon impiegare al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni.

In post-emergenza: contro le dicotiledoni impiegare fenmedifam.

## CAVOLI

Fase fenologica: trapianto-inizio raccolta

---

### Difesa

**Attenzione:** verificare sempre le colture (tipologie di cavolo) riportate nelle etichette degli agrofarmaci che si impiegano.

**BATTERIOSI:** in presenza di condizioni favorevoli alla malattia intervenire con sali di rame.

Si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di sostanza attiva.

**ALTERNARIA:** su cavolfiore intervenire, alla comparsa dei sintomi, con difenoconazolo o difenoconazolo+fluxapiraxad o piraclostrobin+boscalid. Con difenoconazolo sono consentiti al massimo 2 interventi per ciclo (3 su cicli lunghi). Con fluxapiraxad e boscalid sono consentiti complessivamente al massimo 2 interventi per ciclo (3 su cicli lunghi).

**ALTICA:** sui nuovi impianti in presenza di infestazioni intervenire con betaciflutrin (al massimo 2 interventi, solo su bruxelles, cappucci, verza, cavolfiore, broccolo e cime di rapa e solo in pieno campo) o deltametrina (al massimo 2 interventi, solo su cavoli a foglia, bruxelles, cappucci, verza, cavolfiore, broccolo e cime di rapa) o acetamiprid (al massimo 2 interventi, solo su bruxelles, cappucci, verza, cavolfiore, broccolo e cime di rapa).

Con i piretroidi sono consentiti al massimo 3 interventi per ciclo (4 su cicli sopra i 70 giorni).

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con lambdacialotrina o acetamiprid (al massimo 2 interventi) o azadiractina o spirotetramat o sulfoxaflor. Questi insetticidi hanno efficacia anche contro gli aleurodidi.

Con i piretroidi sono consentiti al massimo 3 interventi per ciclo (4 su cicli sopra i 70 giorni).

**ALEURODIDI:** alla presenza del 10% di piante infestate intervenire con olio essenziale di semi d'arancio o deltametrina. Con i piretroidi sono consentiti al massimo 3 interventi per ciclo (4 su cicli sopra i 70 giorni).

**NOTTUE E CAVOLAIA:** alla comparsa dei primi danni intervenire con *Bacillus thuringiensis* o emamectina o clorantraniliprole o metaflumizone o indoxacarb (solo su cappucci).

**CHIOCCIOLE E LIMACCE:** in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali intervenire con metaldeide esca o fosfato ferrico.

### Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 8 giorni prima del trapianto.

Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.  
In post-trapianto contro dicotiledoni è possibile utilizzare clopiralid o piridate (solo su cavoli a testa e a infiorescenza).

In post-trapianto contro graminacee è possibile utilizzare ciclossidim (ammesso solo su cavoli a testa e a foglia) o propaquizafop (solo su broccolo, cavolfiore e cappuccio) o quizalofop-p-etile (solo su cavoli a testa, cavolfiore e broccolo).

## CICORIA in pieno campo

Fase fenologica: trapianto - raccolta

---

### Difesa

**BATTERIOSI:** in presenza di condizioni favorevoli alla malattia intervenire con sali di rame (si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di sostanza attiva).

**MARCIUME BASALE** (Sclerotinia e B. cinerea): intervenire durante le prime fasi vegetative con i formulati registrati a base di *Trichoderma asperellum*+*T. gamsii* (solo su sclerotinia) o piraclostrobin+boscalid o ciprodinil+fludioxonil.

Contro questa avversità sono consentiti al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale.

Al massimo 2 interventi all'anno tra ciprodinil+fludioxonil e fludioxonil.

Al massimo 2 interventi all'anno tra piraclostrobin e azoxistrobin indipendentemente dall'avversità.

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni predisponenti la malattia intervenire con azoxistrobin. Sono consentiti al massimo 2 interventi all'anno tra piraclostrobin e azoxistrobin indipendentemente dall'avversità. Azoxistrobin è efficace anche contro la ruggine.

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con spirotetramat (massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (massimo 1 intervento per ciclo).

**TRIPIDI:** in caso di infestazione generalizzata intervenire con abamectina (massimo 1 intervento).

**NOTTUE FOGLIARI:** alla comparsa delle prime infestazioni intervenire con *Bacillus thuringiensis*.

**MIRIDI:** alla presenza intervenire con etofenprox (al massimo 2 interventi e solo tra il 15 giugno e il 30 settembre).

**CHIOCCIOLE E LIMACCE:** in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali intervenire con metaldeide esca o fosfato ferrico.

### Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 8 giorni prima del trapianto. Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In pre-trapianto contro graminacee annuali e dicotiledoni possono essere impiegati benfluralin, pendimetanil o propizamide.

In post-trapianto utilizzare propizamide contro graminacee annuali e dicotiledoni. Contro eventuali infestazioni di graminacee utilizzare ciclossidim.

## FAGIOLINO

Fase fenologica: da semina a raccolta

---

## Difesa

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con acetamiprid (massimo 1 intervento) o lambdacialotrina (al massimo 1 trattamento all'anno) o deltametrina (al massimo 2 trattamenti all'anno) o fluvalinate (massimo 1 intervento per ciclo). Con i pretroidi sono consentiti complessivamente al massimo 3 interventi per ciclo colturale.

**PIRALIDE:** nelle zone soggette ad infestazione intervenire con emamectina (al massimo 2 interventi) o clorotraniliprole (al massimo 2 interventi).

**NOTTUE FOGLIARI:** in caso di presenza accertata intervenire con emamectina (al massimo 2 interventi) o clorotraniliprole (al massimo 2 interventi).

## Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 8 giorni prima del trapianto. Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree. Effettuare il trattamento almeno 2 giorni prima della semina.

In pre-emergenza: diversi formulati a base di clomazone o di pendimetalin contro graminacee e dicotiledoni. Attenzione al rispetto del tempo di sicurezza.

In post-emergenza contro le dicotiledoni possono essere impiegati imazamox o bentazone.

In post-emergenza contro le graminacee è possibile utilizzare ciclossidim o propaquizafop o quizalofop-p-etile.

## INDIVIA RICCIA E SCAROLA in pieno campo

Fase fenologica: trapianto-raccolta

---

## Difesa

**BATTERIOSI:** in presenza di condizioni favorevoli alla malattia intervenire con sali di rame (si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di sostanza attiva).

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con spirotetramat (massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (massimo 1 intervento per ciclo).

**TRIPIDI:** si segnala la comparsa dei primi individui. Alla presenza intervenire con abamectina (massimo 1 intervento).

**NOTTUE FOGLIARI:** alla comparsa delle prime infestazioni intervenire con *Bacillus thuringiensis*.

**MIRIDI:** alla presenza intervenire con etofenprox (al massimo 2 interventi e solo tra il 15 giugno e il 30 settembre).

**CHIOCCIOLE E LIMACCE:** in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali intervenire con metaldeide esca o fosfato ferrico.

## Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 8 giorni prima del trapianto. Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In pre-trapianto contro graminacee annuali e dicotiledoni possono essere impiegati benfluralin, pendimetanil o propizamide.

In post-trapianto utilizzare propizamide contro graminacee annuali e dicotiledoni. Contro eventuali infestazioni di graminacee utilizzare ciclossidim.



# LATTUGA in pieno campo

Fase fenologica: trapianto - raccolta

---

## Difesa

**BATTERIOSI:** in presenza di condizioni favorevoli alla malattia intervenire con sali di rame (si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di sostanza attiva).

**PERONOSPORA:** al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro la peronospora sui trapianti effettuati dal 1 gennaio al 15 giugno. Al massimo 2 interventi per ciclo colturale contro la peronospora sui trapianti effettuati dal 15 giugno al 1 settembre.

In previsione di condizioni predisponenti la malattia eseguire trattamenti con mandipropamide o ametoctradina+dimetomorf (al massimo 2 all'anno) o fluopicolide+propamocarb (al massimo 1 all'anno) o piraclostrobin+dimetomorf o metalaxil+rame (al massimo 1 all'anno) o metalaxil-m+rame (al massimo 1 all'anno) o propamocarb+fosetyl-Al (al massimo 2 per ciclo).

Si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di rame metallo.

Al massimo 3 interventi all'anno tra azoxistrobin e piraclostrobin.

Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, e 3 interventi all'anno, tra mandipropamide, iprovalicarb e dimetomorf.

**AFIDI:** in presenza di infestazioni si consiglia di impiegare al primo intervento, su piante giovani, uno dei seguenti piretroidi: lambdacialotrina (massimo 1 intervento all'anno) o deltametrina (al massimo 3 interventi) o zetacipermetrina o tau-fluvalinate (al massimo 2 interventi, non ammesso in coltura protetta) o alfacipermetrina. Con i piretroidi complessivamente consentito al massimo 1 intervento per ciclo indipendentemente dall'avversità per trapianti dal 1 gennaio a 15 giugno. Ne sono consentiti al massimo 3 per trapianti dal 15 giugno al 31 dicembre. È consentito anche l'impiego di spirotetramat (massimo 2 interventi all'anno) o sulfoxaflor (massimo 2 interventi all'anno).

Contro gli afidi sono consentiti complessivamente al massimo 3 interventi per ciclo sui trapianti dal 1 gennaio a 15 giugno. È consentito al massimo 1 intervento per ciclo sui trapianti dal 15 giugno a 1 settembre.

**TRIPIDI:** si segnala la comparsa dei primi individui. Alla presenza intervenire con abamectina (massimo 1 intervento per ciclo) o spinosad (al massimo 3 interventi all'anno) o spinetoram (deroga in seguito ad uso eccezionale).

**NOTTUE FOGLIARI:** in presenza di infestazioni intervenire con metaflumizone (al massimo 2 trattamenti all'anno) o emamectina (al massimo 2 trattamenti all'anno) o indoxacarb (al massimo 3 trattamenti all'anno) o clorantraniliprole (al massimo 2 trattamenti all'anno) o spinetoram (deroga in seguito ad uso eccezionale).

Complessivamente sono consentiti al massimo 3 interventi per ciclo contro le nottue fogliari (ad esclusione dei prodotti biologici).

**MIRIDI:** alla presenza intervenire con etofenprox (al massimo 2 interventi).

**CHIOCCIOLE E LIMACCE:** in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali intervenire con metaldeide esca o fosfato ferrico.

**Deroga** N° 495469 del 29 maggio 2019: è consentito l'impiego di spinetoram (EXALT 2019) per la difesa della lattuga e della melanzana in serra e in pieno campo dai tripidi (*Frankliniella occidentalis*). Si tratta di un uso eccezionale valido per 120 giorni a partire dal 01 giugno 2019 al 01 ottobre 2019.

## Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 8 giorni prima del trapianto. Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In pre-trapianto contro graminacee annuali e dicotiledoni possono essere impiegati benfluralin, pendimetanil o propizamide.

Con infestazioni di *Galinsoga parviflora* utilizzare oxadiazon (ammesso solo in pieno campo).

In post-trapianto utilizzare propizamide contro graminacee annuali e dicotiledoni. Contro eventuali infestazioni di graminacee utilizzare propaquizafop o quizalofop-p-etile o ciclossidim.

## Melanzana in pieno campo

Fase fenologica: sviluppo vegetativo-raccolta

---

### Difesa

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con spirotetramat (al massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (al massimo 1 all'anno) o flupyradifurone (al massimo 1 all'anno) o sulfoxaflor.

**DORIFORA:** in presenza di giovani larve si consiglia di intervenire con metaflumizone (al massimo 2 interventi).

**RAGNETTO ROSSO:** alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Amblyseius andersonii* (alla primissima presenza) oppure con *Phytoseiulus persimilis*. In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox o bifenazate o abamectina. Quest'ultimo è efficace anche contro i tripidi.

Complessivamente sono consentiti al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità.

**TRIPIDI:** alla presenza intervenire con spinosad (al massimo 3 interventi all'anno) o spinetoram (deroga in seguito ad uso eccezionale) oppure, alla prima comparsa, ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Amblyseius cucumeris*, eventualmente associato ad *Orius* spp. In alternativa intervenire con spinosad.

**MIRIDI:** alla presenza intervenire con etofenprox (al massimo 3 interventi all'anno) o betaciflutrin.

**Deroga** N° 495469 del 29 maggio 2019: è consentito l'impiego di spinetoram (EXALT 2019) per la difesa della lattuga e della melanzana in serra e in pieno campo dai tripidi (*Frankliniella occidentalis*). Si tratta di un uso eccezionale valido per 120 giorni a partire dal 01 giugno 2019 al 01 ottobre 2019.

## MELONE in pieno campo

Fase fenologica: sviluppo vegetativo-raccolta

---

### Difesa

**CANCRO GOMMOSO:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con azoxistrobin o difenoconazolo+ciflufenamid o difenoconazolo+fluxapiraxad.

Consentiti al massimo 2 interventi all'anno tra azoxistrobin e trifloxistrobin.

Consentito al massimo 1 intervento con prodotti contenenti difenoconazolo.

Consentiti al massimo 2 interventi all'anno tra fluopiram, fluxapiraxad e isopirazam.

**OIDIO:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con bicarbonato di potassio o zolfo o metrafenone (al massimo 2 interventi all'anno) o bupirimate (al massimo 2 interventi all'anno).

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni climatiche favorevoli alla malattia: sulle colture più sviluppate intervenire con dimetomorf o mandipropamide o azoxistrobin o zoxamide (al massimo 3 interventi all'anno) o cyazofamide (al massimo 3 interventi all'anno). Complessivamente tra dimetomorf, iprovalicarb e mandipropamide sono consentiti al massimo 4 trattamenti all'anno.

**AFIDI:** alla presenza dei primi individui intervenire con spirotetramat (massimo 2 interventi all'anno) o sulfoxaflor o flonicamid (massimo 2 interventi all'anno).

**RAGNETTO ROSSO:** alla prima comparsa ricorrere alla lotta biologica eseguendo lanci di *Phytoseiulus persimilis*. In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox o bifenazate o abamectina. Quest'ultimo è efficace anche contro i tripidi.

## PREZZEMOLO

Fase fenologica: da semina o trapianto a raccolta

---

### Difesa

**MORIA DELLE PIANTINE** (Pythium): effettuare ampi avvicendamenti ed evitare i ristagni idrici.

Alla semina e all'emergenza intervenire con *Trichoderma* spp.

**SCLEROTINIA:** si consiglia di effettuare ampie rotazioni. In caso di accertata presenza della malattia negli anni precedenti intervenire con pyraclostrobin+boscalid. Questo fungicida è efficace anche contro la septoriosi. Complessivamente tra azoxystrobin e pyraclostrobin sono consentiti al massimo 3 interventi all'anno.

**SEPTORIOSI:** al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia intervenire con sali di rame o azoxystrobin (al massimo 2 interventi all'anno). Complessivamente tra azoxystrobin e pyraclostrobin sono consentiti al massimo 4 interventi all'anno.

**PERONOSPORA:** fluopicolide+propamocarb (al massimo 1 all'anno). Trattamento efficace anche contro la moria delle piantine.

**OIDIO:** alla comparsa dei primi sintomi intervenire con zolfo.

### Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 2 giorni prima della semina.

Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In post-emergenza contro graminacee è possibile utilizzare ciclossidim.

## SEDANO

Fase fenologica: trapianto-raccolta

---

### Difesa

**BATTERIOSI:** in presenza di condizioni favorevoli alla malattia intervenire con sali di rame (si raccomanda di non superare 4 kg/ha anno di sostanza attiva).

**SEPTORIOSI:** si consiglia di effettuare ampie rotazioni. Con condizioni predisponenti la malattia eseguire trattamenti con formulati a base di sali di rame (massimo 4 kg/ha anno di sostanza attiva), difenoconazolo (massimo 3 interventi all'anno), azoxystrobin (massimo 3 all'anno) o piraclostrobin+boscalid (massimo 2 all'anno).

Complessivamente con strobilurine (azoxystrobin e piraclostrobin) consentiti al massimo 3 interventi indipendentemente dall'avversità.

**AFIDI:** alla comparsa delle prime infestazioni intervenire su piante giovani con piretrine o azadiractina o lambdacialotrina (massimo 1 intervento all'anno, non ammessa in coltura protetta). Attenzione al rispetto dell'intervallo di sicurezza. Questi insetticidi hanno efficacia anche contro gli aleurodidi.

**TRIPIDI:** in caso di infestazione generalizzata intervenire con abamectina (Vertimec EC) o spinosad (al massimo 3 interventi).

**CHIOCCIOLE E LIMACCE:** in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali intervenire con metaldeide esca o fosfato ferrico.

### **Diserbo**

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 8 giorni prima del trapianto.

Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In pre-trapianto: utilizzare pendimetalin contro graminacee e dicotiledoni.

## **SPINACIO**

Fase fenologica: da semina a raccolta

---

### **Difesa**

**BOTRITE:** in condizioni predisponenti la malattia intervenire con piraclostrobin+boscalid (al massimo 2 interventi all'anno). Efficace anche contro cercospora.

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni predisponenti la malattia eseguire trattamenti con piraclostrobin+dimetomorf (al massimo 3 interventi all'anno) o mandipropamide o fluopicolide+propamocarb (ammesso solo in pieno campo). Quest'ultimo è efficace anche contro Pythium.

**AFIDI:** in presenza di infestazioni intervenire con acetamiprid (massimo 1 interventi all'anno) o lambdacialotrina (massimo 3 interventi all'anno per cicli inferiori a 50 giorni, 4 per cicli superiori a 50 giorni). Questi principi attivi sono efficaci anche contro l'altica.

**ALTICA:** gli interventi indicati per gli afidi hanno efficacia anche sull'altica.

**NOTTUE FOGLIARI:** in presenza di infestazioni intervenire con spinosad (al massimo 3 trattamenti all'anno) o lambdacialotrina o etofenprox (al massimo 2 trattamenti all'anno) o indoxacarb (al massimo 3 trattamenti all'anno) o clorotraniliprole (al massimo 2 trattamenti all'anno). Complessivamente tra lambdacialotrina e etofenprox sono consentiti al massimo 3 interventi all'anno per cicli inferiori a 50 giorni, 4 per cicli superiori a 50 giorni.

## Diserbo

Per la pulizia del letto di semina è possibile impiegare glifosate contro graminacee e dicotiledoni. Effettuare il trattamento almeno 2 giorni prima della semina, 8 giorni prima del trapianto.

Attenzione: rispettare il limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree.

In pre-semina è possibile utilizzare metamitron.

In pre-emergenza: contro graminacee e dicotiledoni utilizzare metamitron o S-metolachlor o cloridazon+metamitron.

S-metolachlor è ammesso solo tra febbraio e agosto.

Attenzione: con cloridazon impiegare al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni.

In post-emergenza: contro le dicotiledoni impiegare fenmedifam.

Contro le graminacee impiegare propaquizafop o quizalofop-p-etile o quizalofop-etile isomero D o ciclossidim.

## ZUCCA

Fase fenologica: da sviluppo a allegagione

---

### Difesa

**AFIDI:** alla presenza dei primi alati intervenire con acetamiprid (al massimo 1 intervento all'anno) o flonicamid (al massimo 2 interventi all'anno) o sulfoxaflor.

**OIDIO:** in condizioni predisponenti la malattia intervenire con bicarbonato di potassio o zolfo o penconazolo o difenoconazolo o bupirimate (al massimo 2 interventi all'anno). Tra difenoconazolo e penconazolo sono consentiti al massimo 3 interventi.

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni climatiche favorevoli alla malattia: sulle colture più sviluppate intervenire con dimetomorf (ammesso solo in pieno campo), zoxamide (al massimo 3 interventi all'anno) o cyazofamide (al massimo 2 interventi all'anno) o fluopicolide+propamocarb (al massimo 1 intervento).

## ZUCCHINO IN PIENO CAMPO

Fase fenologica: da trapianti/semina a raccolta

---

### Difesa

**AFIDI:** alla presenza dei primi alati intervenire con spirotetramat (al massimo 2 interventi all'anno) o acetamiprid (al massimo 1 intervento all'anno) o flonicamid (al massimo 2 interventi all'anno non consecutivi) o sulfoxaflor (al massimo 2 interventi all'anno) o flupiradifurone (al massimo 1 intervento all'anno).

**OIDIO:** in condizioni predisponenti la malattia intervenire con bicarbonato di potassio o zolfo o bupirimate (al massimo 2 interventi all'anno).

**RAGNETTO ROSSO:** in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate intervenire con exitiazox, bifenazate o abamectina.

**PERONOSPORA:** in previsione di condizioni climatiche favorevoli alla malattia: sulle colture più sviluppate, protette dal tessuto non tessuto, intervenire con dimetomorf (ammesso solo in pieno campo), zoxamide (al massimo 3 interventi all'anno) o cyazofamide (al massimo 2 interventi all'anno).

Per le orticole in coltivazione biologica fare riferimento al bollettino regionale di produzione biologica al seguente link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/archivio-bollettini/bolletini-2019/bollettino-regionale-di-produzione-biologica>

Si ricorda che l'elenco delle deroghe emesse può essere consultato a questo indirizzo: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/deroghe/deroghe-territoriali-2019>

Si ricorda che le norme tecniche attualmente in vigore possono essere consultate a questo indirizzo: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/2019/disciplinari-2019>

**Redazione** a cura di: Sergio Gengotti