



Bollettino di produzione integrata e biologica n. 28 del 14 settembre 2017



Bollettino Regionale di difesa integrata
Difesa integrata obbligatoria
Difesa integrata volontaria

A causa di problemi organizzativi, anche per quest'anno, non si è al momento in grado di garantire gli abituali supporti ai programmi di difesa integrata con bollettini provinciali a carattere settimanale.

Tale attività si prevede che possa essere ripristinata quanto prima.

In questa fase verranno predisposti periodici bollettini regionali di difesa integrata che garantiranno l'applicazione della "Difesa integrata obbligatoria" e forniranno indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla "Difesa Integrata Volontaria" prevista dai seguenti provvedimenti: Regolamento 1698/2005/UE; Regolamento 1305/2013/UE; Regolamento 1308/2013/UE; Legge Regionale n. 28/98; Legge Regionale n. 28/99.

Per informazioni Meteo consultate il link <http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/regionali>

I modelli previsionali sullo sviluppo delle principali avversità parassitarie sono consultabili alla pagina <http://fitospa.agrinet.info>

Informazioni per la difesa integrata volontaria

L'aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata per l'anno 2017 è stato approvato con determina n. 2685 del 24/02/2017. I testi ufficiali dei DPI 2017 sono consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna al link

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017>

Le deroghe concesse per la difesa integrata volontaria sono consultabili al link <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/deroghe/deroghe-territoriali-2017>

Si evidenzia che nel capitolo 10 delle Norme Generali, a pagina 10, è stato introdotto un vincolo specifico per l'impiego del rame:

"Se si utilizzano dei prodotti fertilizzanti fogliari contenenti rame metallico (Cu) la sua quantità distribuita deve essere registrata perché concorre al raggiungimento del limite previsto dalle norme fitosanitarie (tali quantitativi devono essere indicati nelle schede di registrazione della difesa)".

Si ricorda che su tutte le colture la quantità massima di rame impiegabile in un anno è di 6 kg/ha di sostanza attiva.

Trattamenti in fioritura delle colture

Durante il periodo della fioritura delle colture è **vietato** eseguire trattamenti insetticidi, acaricidi o con altri presidi sanitari che risultino tossici per le api. Per fioritura si intende il periodo che va dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi (art. 15 L.R. n° 35/88). Prima degli interventi, in presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento (Decreto R.E.R. n° 130 del 4/3/1991).

COLTURE ERBACEE

Impegni aggiuntivi facoltativi (I.A.F.) della Misura 10.1.01- impegno 20 (Erbacee e orticole difesa avanzata) del PSR 2014-2020

Cominciare il monitoraggio delle popolazioni di adulti di elateridi posizionando il feromone di *Agriotes sordidus* nelle trappole YATLORf.

Si ricorda che nel corso del 2016 le modalità di installazione delle trappole per gli elateridi sono state modificate da una apposita deroga. Pertanto le trappole (3 ogni 10 ha) "...possono essere posizionate liberamente sulla superficie da monitorare privilegiando le porzioni aziendali con maggiore rischio di presenza di elateridi (valutando sostanza organica, copertura vegetale continua e avvicendamenti colturali, danni negli anni precedenti, ecc.)".

I rilievi sulle catture eseguite con le trappole YATLORf hanno cadenza mensile e vanno inviate alla mail: monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it

Impegni aggiuntivi facoltativi (I.A.F.) della Misura 10.1.01- impegno 17 e 20 (Erbacee e orticole difesa avanzata) del PSR 2014-2020

Si segnala che a questo link

[http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017)

[agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017)

sono state pubblicate le modalità operative per gli impegni aggiuntivi 17 e 20 (nome file "Comunicazione sulle disposizioni applicative degli impegni aggiuntivi facoltativi (I.A.F.) 17 e 20 della operazione 10.1.01").

Mais

Fase: raccolta

Rischio fumonisine

In base alla simulazione effettuata il 22 agosto il livello attuale di rischio contaminazione da fumonisine, con soglia 4.000 ppb per alimentazione umana, è alto nelle località del ferrarese monitorate e medio/basso nelle altre aree.

Rischio aflatossine

In base alla simulazione effettuata il 22 agosto (Modello AFLA-Maize) il rischio alla raccolta (soglia 5 ppb AFB1) è alto nelle località del ferrarese monitorate e medio, in generale, in tutta la Regione, pertanto ci si attende un'alta frequenza di campi con produzione di mais al di sopra della soglia di 5 ppb.

Soia e Sorgo

Fase: raccolta

In seguito alla raccolta delle colture, prestare attenzione alle eventuali coltivazioni limitrofe sulle quali possono migrare in massa miridi e cimici.

COLTURE ARBOREE

Cimice asiatica

L'insetto è presente su tutto il territorio regionale con livelli di infestazione eterogenei. Prestare attenzione alle colture non ancora raccolte per verificare l'eventuale presenza dell'insetto. Le trappole a feromoni di aggregazione continuano a catturare e si rilevano adulti alla ricerca di siti di svernamento (abitazioni, costruzioni rurali, ecc.).

Diserbo arboree

In **difesa integrata volontaria** il diserbo su tutte le colture arboree è ammesso solo localizzato sulla fila, l'area trattata deve essere inferiore al 50% del totale.

Actinidia

Fase: maturazione

Cimice asiatica

Su questa coltura sono segnalati alcuni casi di danni soprattutto su kiwi giallo, si consiglia di intensificare i monitoraggi. I formulati impiegabili contro *Metcalfa pruinosa* sono attivi anche contro la cimice asiatica.

In data 4 settembre è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con deltametrina per il controllo della cimice asiatica su *Actinidia chinensis* (kiwi giallo, es. Sungold – Cv. Gold 3).

Il 3 luglio 2017 è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento con clorpiyrifos metile (formulati Reldan LO o Runner LO) per il controllo delle popolazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture di pero, melo, pesco e actinidia.

In riferimento alla sopraccitata deroga, il 7 luglio 2017 è stata emessa una precisazione specifica per l'actinidia: la deroga permette l'esecuzione di 1-2 interventi (almeno uno dei quali deve essere eseguito con uno dei formulati oggetto di autorizzazione eccezionale: Reldan LO o Runner LO) con dosi di 200 ml/hl e un dosaggio massimo di 4 litri/Ha e non di 5 litri/Ha come erroneamente indicato nella deroga del 3 luglio, in quanto questo ultimo dosaggio è specifico per le colture di pero, melo e pesco.

Metcalfa

Si segnala una presenza elevata. In **difesa integrata volontaria** intervenire solo in caso di infestazione in atto.

Melo

Fase: raccolta

Colpo di fuoco

Intervenire entro 24 ore dopo grandinate e forti temporali.

Gloeosporium album

Periodi piovosi a partire da 30-40 giorni dalla raccolta sono favorevoli all'insorgenza di marciumi che si manifestano durante la fase di post-raccolta. Nel caso intervenire sulle varietà sensibili (es. Cripps Pink). In **difesa integrata volontaria** sono ammessi 2 interventi all'anno sulle cv. a raccolta dopo il 15 settembre.

Cimice asiatica

Si segnala una presenza ancora modesta dell'insetto su questa coltura, anche se in alcuni casi sono stati rilevati danni ai frutti. Si consiglia di intensificare i monitoraggi.

Il 3 luglio è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento con clorpyrifos metile (formulati Reldan LO o Runner LO) per il controllo delle popolazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture di pero, melo, pesco e actinidia. I due formulati a base di clorpyrifos metile hanno ottenuto un'autorizzazione eccezionale per l'impiego sulle colture di pero, melo, pesco e actinidia nel periodo 26 giugno - 23 ottobre 2017.

Qualora su melo fosse già stato effettuato precedentemente un trattamento con qualunque formulato a base di clorpyrifos metile, è consentita l'esecuzione di un secondo intervento, esclusivamente con uno dei due formulati oggetto di autorizzazione eccezionale, nel rispetto del limite cumulativo di 5 litri/ha.

IL 7 agosto è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento con la s.a. etofenprox per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle cultivar di melo a raccolta a partire dal primo settembre.

Mosca della frutta

Le trappole segnalano assenza o bassa presenza di adulti e al momento non si rilevano danni alla coltura.

Piralide del mais

Il 30 agosto è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con indoxacarb, nel rispetto dei vincoli di impiego presenti nei DPI (massimo 4 interventi all'anno), per la difesa di pero e melo da attacchi di piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*).

Olivo

Fase: accrescimento frutti

Occhio di pavone o cicloconio

La presenza è segnalata su tutto il territorio regionale. In questa fase è possibile fare interventi rameici in presenza di piogge.

Mosca dell'olivo

Si registrano catture in leggero aumento in tutti gli areali e qualche sporadica ovideposizione. In **difesa integrata volontaria** gli interventi ovo-larvicidi sono ammessi al

superamento della soglia di 6-8% di drupe con punture fertili (uova e larve) a seconda della produttività della pianta.

Pero

Fase: raccolta

Colpo di fuoco

Intervenire entro 24 ore dopo grandinate e forti temporali.

Cimice asiatica

I monitoraggi territoriali evidenziano la presenza di adulti, ninfe, neanidi e anche ovature. L'insetto è presente su tutto il territorio regionale con livelli di infestazione eterogenei. In campo si rilevano frutti con danni. Si raccomanda di intensificare i controlli sulle varietà ancora da raccogliere.

Il 15 giugno 2017 è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento a base di thiaclopid, per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*).

Il 3 luglio 2017 è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento con clorpirifos metile (formulati Reldan LO o Runner LO) per il controllo delle popolazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture di pero, melo, pesco e actinidia.

I due formulati a base di clorpirifos metile hanno ottenuto un'autorizzazione eccezionale per l'impiego sulle colture di pero, melo, pesco e actinidia nel periodo 26 giugno - 23 ottobre 2017.

Qualora su pero fosse già stato effettuato precedentemente un trattamento con qualunque formulato a base di clorpirifos metile è consentita l'esecuzione di un secondo intervento, esclusivamente con uno dei due formulati oggetto di autorizzazione eccezionale, nel rispetto del limite cumulativo di 5 litri/ha.

Il 21 luglio 2017 è stata concessa una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un intervento con etofenprox per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle cv. di pero, raccolte dopo William rossa.

Il 9 agosto è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento con la s.a. etofenprox per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle cultivar di pero raccolte dopo William rossa.

Piralide

Il 30 agosto è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con indoxacarb, nel rispetto dei vincoli di impiego presenti nei DPI (massimo 4 interventi all'anno), per la difesa di pero e melo da attacchi di piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*).

Pesco

Fase: post raccolta

Fusicocco

Le piogge previste a fine settimana e le attuali temperature sono favorevoli per la sporulazione del patogeno.

Batteriosi delle drupacee

Si ricorda che sugli impianti, in particolare dove sono stati rilevati attacchi negli anni precedenti, è utile intervenire nella fase di caduta foglie con prodotti rameici autorizzati.

Kaki

Fase: accrescimento frutti

Mosca della frutta

Al momento le catture effettuate con le trappole sono assenti o molto basse.

Vite

Fase: raccolta

Botrite

In **difesa integrata volontaria** sono ammessi al massimo 2 trattamenti/anno. Nelle aziende grandinate o dove ci sono delle rotture degli acini è consigliabile intervenire nel periodo che va dall'invaiaura a 3-4 settimane dalla raccolta.

Flavescenza dorata e mal dell'esca

Sintomi visibili, si consiglia di asportare e distruggere le piante.

COLTURE ORTICOLE

Impegni aggiuntivi facoltativi (I.A.F.) della Misura 10.1.01 - impegno 20 (Erbacee e orticole difesa avanzata) del PSR 2014-2020

Cominciare il monitoraggio delle popolazioni di adulti di elateridi posizionando il feromone di *Agriotes sordidus* nelle trappole YATLORf.

Si ricorda che nel corso del 2016 le modalità di installazione delle trappole per gli elateridi sono state modificate da una apposita deroga. Pertanto le trappole (3 ogni 10 ha) "...possono essere posizionate liberamente sulla superficie da monitorare privilegiando le porzioni aziendali con maggiore rischio di presenza di elateridi (valutando sostanza organica, copertura vegetale continua e avvicendamenti colturali, danni negli anni precedenti, ecc.)".

I rilievi sulle catture eseguite con le trappole YATLORf hanno cadenza mensile e vanno inviate alla mail: monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it

Impegni aggiuntivi facoltativi (I.A.F.) della Misura 10.1.01- impegno 17 e 20 (Erbacee e orticole difesa avanzata) del PSR 2014-2020

Si segnala che a questo link

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017>

sono state pubblicate le modalità operative per gli impegni aggiuntivi 17 e 20 (nome file scaricabile in pdf “Comunicazione sulle disposizioni applicative degli impegni aggiuntivi facoltativi (I.A.F.) 17 e 20 dell’operazione 10.1.01”).

Carota

Fase: ingrossamento fittone

Alternaria

Intervenire in presenza di bagnature prolungate o presenza di sintomi iniziali sugli impianti più sviluppati.

Nottue

Intervenire solo dopo aver accertato la presenza.

Nematodi

In **difesa integrata volontaria** sono ammessi trattamenti chimici solo in caso di accertata presenza dei nematodi. Nelle infestazioni di livello medio-basso si consiglia l'utilizzo di piante biocide (rucola, senape, rapisto, senape indiana, rafano). In aggiunta è utile impiegare *Paecilomyces lilacinus* che in questo periodo è efficace contro le uova di varie specie di nematodi (Meloidogyne, Globodera, Heterodera, Pratylenus).

Cavolo nero

Nottue

Intervenire solo dopo aver accertato la presenza.

In data 7 settembre è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con il formulato Altacor per il controllo delle nottue sulla coltura del cavolo nero. Il formulato Altacor (a base di clorantraniliprole) con DM del 3 agosto 2017 ha ottenuto una registrazione eccezionale per il controllo delle nottue sulla coltura del cavolo nero nel periodo 03.08.2017 - 30.11.2017.

Cipolla autunnale

Fase: pre-semi

Fusariosi

In terreni con problemi di fusariosi si consigliano ampie rotazione e/o l'impiego di varietà tolleranti.

Diserbo

Effettuare il diserbo in pre-semi e in pre-emergenza in funzione della presenza e tipologia delle infestanti.

Fagiolino

Sclerotinia

Il 9 agosto è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con il formulato "Luna Sensation" a base di fluopyram + trifloxystrobin per la difesa del fagiolino dalla sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*).

Nottue fogliari

Intervenire solo dopo averne accertato la presenza.

Piralide

Verificare la presenza. In **difesa integrata volontaria**, è possibile intervenire nelle zone soggette a infestazione, dalla fase di formazione del baccello fino in prossimità della raccolta.

Fragola

Vaiolatura o maculatura zonata

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Nottue fogliari

Verificare la presenza delle larve. In **difesa integrata volontaria** la soglia di intervento è l'infezione generalizzata.

Lattuga

Peronospora

Si consiglia di intervenire in presenza di prolungate bagnature.

Miridi

Si osservano danni. Evitare lo sfalcio dei fossi o prati adiacenti la coltura.

Tripidi

Il 21 luglio 2017 è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un intervento con acrintrina (in alternativa a lambdacialotrina e nel rispetto dei limiti e dei vincoli presenti nei Disciplinari) per il controllo delle infestazioni di tripidi su lattuga.

Melanzana

Fase: ingrossamento frutto - raccolta

Miridi

Prestare attenzione all'eventuale presenza.

Ragnetto rosso

In **difesa integrata volontaria** la soglia di intervento per il trattamento chimico (massimo 1 all'anno) è rappresentata dalla presenza di focolai d'infestazione con foglie decolorate; per il lancio di ausiliari la soglia è data dalla presenza.

Il 27 giugno 2017 è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento acaricida impiegando una delle s.a. presenti nelle norme tecniche dei Disciplinari e nel rispetto dei limiti di etichetta, per la difesa da attacchi di ragnetto rosso.

Prezzemolo

Septoriosi

Il 18 agosto è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un trattamento fungicida per la lotta alla septoria del prezzemolo con la sostanza attiva difenoconazolo (formulato commerciale Score 25 EC) che ha avuto l'autorizzazione ministeriale per uso eccezionale fino al 30.11.2017.

Zucchini

Oidio

Intervenire alla presenza dei primi sintomi.

Il 13 giugno 2017 è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'impiego della s.a. isopyrazam in alternativa a fluopyram per la difesa dello zucchini dall'oidio (*Sphaerotecha fuliginea*) nel rispetto del limite totale dei 2 interventi realizzabili con le due sostanze attive.

Ragnetto rosso

In **difesa integrata volontaria** la soglia di intervento è la presenza. Sono ammessi al massimo 2 interventi all'anno.

Zucca

Ragnetto rosso

Verificare la situazione in campo e intervenire in presenza di infestazioni generalizzate o focolai. In **difesa integrata volontaria** è ammesso 1 solo intervento all'anno.

Il 27 luglio 2017 è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un secondo intervento acaricida impiegando una delle s.a. presenti nelle norme tecniche dei Disciplinari e nel rispetto dei limiti di etichetta, per la difesa della zucca da attacchi di ragnetto rosso.

Bollettino regionale per la fertilizzazione

Predisposizione dei piani di fertilizzazione

I quantitativi di macroelementi (N, P₂O₅ e K₂O) da apportare devono essere calcolati utilizzando o il metodo del bilancio previsionale o il metodo delle schede a dose standard. I piani di fertilizzazione nella prima versione preventiva per ciascuna annualità devono essere redatti, conservati e consultabili:

- entro il 28 febbraio per le colture erbacee e foraggere;

- entro il 15 aprile per le colture orticole, arboree e sementiere.

Sul sito internet della Regione Emilia-Romagna alla pagina Norme Generali dei Disciplinari di Produzione Integrata è possibile scaricare la versione 2017 del programma per la disposizione dei piani di fertilizzazione al seguente link http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/dpi_2017/norme-general-2017

Dalla medesima pagina si può visualizzare la carta, desunta dal bollettino agrometeo n° 4/2017 di ARPAE, con le precipitazioni cumulate dal 1° ottobre 2016 al 30 gennaio 2017.

Bollettino regionale per l'irrigazione

Per garantire il potenziale produttivo delle colture, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet, tutte le colture.

ATTENZIONE - Indicazioni specifiche per coltura:

- **Vite** A causa del perdurare della siccità e delle caratteristiche climatiche anomale di questa estate, in deroga a quanto previsto dal disciplinare di produzione, è consigliabile irrigare le viti anche dopo la fase di invaiatura. Particolare riguardo verso le restituzioni idriche è da riservare agli impianti in allevamento.

- **Colture arboree** Su tutte le colture arboree, ove sia già stata effettuata la raccolta, è consigliabile programmare con continuità l'irrigazione post-raccolta, al fine di evitare danni alle colture e preparare le piante al riposo invernale, evitando di pregiudicare la ripresa vegetativa primaverile.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 37 mm su pesco con interfilarie inerbita con un consumo giornaliero nel giorno di calcolo di 3.7 mm sarà pari a 10 giorni (37/3.7). I consumi giornalieri di ciascuna coltura sono individuabili mediante l'uso delle tabelle dei Disciplinari di Produzione Integrata o tramite il servizio Irrinet.

E' opportuno verificare la quantità di acqua disponibile contenuta nel terreno, prima di effettuare l'irrigazione al fine di distribuire il corretto volume irriguo, rispondendo in modo razionale alle reali esigenze delle colture.

Indicazioni relative agli evapotraspirati specifici per ciascuna coltura ed alle necessità irrigue specifiche sono disponibili tramite il servizio Irrinet all'indirizzo www.irriframe.it
Si ricorda che il servizio di consulenza irrigua Irrinet è gratuito.

Provvedimenti conseguenti alla siccità 2017

La scarsità idrica che caratterizza i corsi d'acqua della regione, ad esclusione del Po, ha fatto sì che ARPAE abbia emanato divieti di prelievo idrico, consultabili alla pagina https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3860

Si consiglia gli agricoltori titolari di concessione di prelievo da corso d'acqua di consultare la lista dei divieti, così come i casi in cui è possibile derogare da tali provvedimenti. La dichiarazione di adesione a IRRINET o ai DPI (schede irrigue) viene considerata positivamente ai fini della concessione delle deroghe.

IAF25 Operazione 10.1.01 (Produzione integrata) del PSR 2014-20

Si informano le aziende aderenti che al link <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017> è stato pubblicato il testo completo della **“GUIDA all’utilizzo di IrrINET per l’Impegno Aggiuntivo Facoltativo 25 (IAF25) delle Operaz. 10.1.01 (Produzione integrata) e 11 (produzione biologica) del PSR Emilia Romagna 2014-20”**.

Si informa inoltre che la coltura del Girasole (pur essendo sinora erroneamente inserita nella lista di quelle ammissibili all’IAF25) non è gestita dal sistema IrrINET e che le superfici di questa coltura eventualmente inserite nelle domande di pagamento 2016 e 2017 non potranno conseguentemente essere ammesse al finanziamento con l’IAF 25 non avendo adempiuto agli impegni previsti.

Di seguito si riporta un riassunto dei requisiti previsti e le corrispondenti azioni da intraprendere, descritte nella citata GUIDA, per evitare di incorrere in sanzioni già rilevate nel corso del 2016.

N.	Requisito	Come verificare la conformità
1	Iscrizione a Irrinet	Sul sito www.irriframe.it inserire le proprie credenziali (email e password) ottenute in fase di registrazione e verificare l’accesso. Per registrarsi a Irrinet: http://www.irriframe.it/irriframe/user/new?Reg=08&css=headerER
2	Inserimento CUA in azienda	vedi capitolo 2. “Guida all’utilizzo di IrrINET..”
3	Associazione degli appezzamenti alla azienda con CUA	vedi capitolo 3. “Guida all’utilizzo di IrrINET..”
4	Inserire la superficie corretta negli appezzamenti della azienda con CUA	vedi capitolo 4. “Guida all’utilizzo di IrrINET..”
5	Le informazioni irrigue devono essere visualizzate nel corso della stagione irrigua e la lista irrigazioni deve riportare le irrigazioni effettuate	vedi capitolo 5. “Guida all’utilizzo di IrrINET..”