



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale




**Regione Emilia-Romagna**

**L'Europa investe nelle zone rurali**

Organismo responsabile: C.R.P.V. -Centro Ricerche Produzioni Vegetali

Autorità di Gestione: Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Provincia di Modena                               |
|                                                                                   | Bollettino di produzione<br>Integrata e Biologica |

**BOLLETTINO** n. 23 Del 19/07/2021

#### PREVISIONI METEO

1. PREVISIONI METEO: [link Arpae Meteo Emilia Romagna](#)

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

#### Note Generali

Le indicazioni di seguito riportate **sono vincolanti** per la Difesa Integrata Volontaria, cioè per le aziende inserite nei programmi relativi: ai Regolamenti comunitari 1698/2005 – Misura 214 e 1305/2013 Tipo di Operazione 10.1.01, Decreto Ministeriale n. 9084 del 28/8/2014 “Produzione Integrata in Disciplina ambientale in applicazione del Regolamento Unione europea 1308/2013, LL. RR. 28/99; mentre sono **da considerare come consigli** per tutte le altre aziende (Difesa integrata obbligatoria, vedi Decreto 150/2012).

### **PARTE GENERALE**

**Sono stati approvati in data 23-02-2021 i disciplinari 2021**

**Abbruciamento residui vegetali .**

Per un’opportuna diffusione si informa che da lunedì scatterà su tutto il territorio regionale la fase di grave pericolosità per gli incendi boschivi. La seguente comunicazione verrà pubblicata anche sui principali portali web di settore della Regione Emilia-Romagna.

A partire dal 5 luglio 2021, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha disposto di attivare su tutto il territorio regionale la fase di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, che durerà fino al giorno 18 luglio 2021 fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteorologiche.

Durante il periodo di grave pericolosità è ovunque vietato l'abbruciamento dei residui vegetali risultanti dai lavori agricoli e forestali.

I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:

- 115 da chiamare in caso d'incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
- 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);
- 800841051 numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi.

Chi anche in maniera involontaria provoca un incendio boschivo o adotta comportamenti che possano innescarlo, rischia sanzioni amministrative e penali e può essere condannato al risarcimento dei danni.

I disciplinari attualmente in vigore sono consultabili al link.

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale>

Le deroghe concesse per la difesa integrata volontaria sono disponibili al link

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/deroghe-ai-disciplinari/deroghe-territoriali-2021>

A questo link troverete i **prodotti fitosanitari autorizzati per situazioni di emergenza fitosanitaria** che non necessitano di deroga e rientrano nell'uso possibile dei disciplinari di produzione integrata.

[https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/deroghe-ai-disciplinari/deroghe-territoriali-2021/2021\\_4\\_23\\_prodotti-fitosanitari-uso-emergenza-no-deroga-pi.pdf](https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/deroghe-ai-disciplinari/deroghe-territoriali-2021/2021_4_23_prodotti-fitosanitari-uso-emergenza-no-deroga-pi.pdf)

#### Miscele estemporanee

Nelle miscele estemporanee di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di Sodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; è ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento. In ogni caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

#### Uso eccezionale prodotti fitosanitari:

- È autorizzata l'estensione d'impiego su su actinidia (Acnidia deliciosa e Acnidia chinensis) per il controllo della PSA del prodotto fitosanitario denominato "Sitofex" contenente la sostanza attiva forchlorfenuron (CPPU), valida dal 12 marzo al 9 luglio 2021
- È autorizzata l'estensione d'impiego su pisello da seme e da industria senza baccello contro Peronospora pisi del prodotto fitosanitario denominato "Zoxium 240 sc" contenente la sostanza attiva Zoxamide, valida dal 12 marzo al 9 luglio 2021. In base a quanto previsto nelle norme generali in merito alle deroghe ai disciplinari di produzione integrata, per questo utilizzo non è necessaria la deroga.
- È autorizzato l'uso di emergenza in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria su riso del prodotto fitosanitario denominato "Avanza" contenente la sostanza attiva Benzobicyclon, valido dal 12 marzo al 10 luglio 2021
- Estensione d'impiego per uso d'emergenza del seguente p.f. a base della s.a. isoclast™ active (sulfoxaflor) CLOSER (reg. n. 16886) su susino contro afidi è stata autorizzata per un periodo di 120 giorni, dal 18 marzo 2021 con termine il 18 luglio 2021.

#### Diserbi in uso eccezionale

| Coltura           | Prodotto          | Composizione        | Periodo validità         | Status deroga DPI        |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| medica da seme    | <b>Activus ME</b> | pendimetalin 400g/l | 11-02-2021<br>10-06-2021 | deroga del 04-03-2021    |
| trifoglio da seme | <b>Activus ME</b> | pendimetalin 400g/l | 11-02-2021<br>10-06-2021 | <b>deroga non emessa</b> |

|                                      |                      |                       |                                                                 |                                                           |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| coriandolo da seme                   | <b>Foxpro</b>        | bifenox 480 g/l       | 01-04-2021<br>29-07-2021                                        | deroga del 22-03-2021                                     |
| pomodoro da industria<br>trapiantato | <b>Foxpro</b>        | bifenox 480 g/l       | 18-03-2021<br>15-07-2021                                        | deroga del 24-03-2021                                     |
| Prezzemolo                           | <b>Falcon Mk</b>     | propaquizafop 100 g/l | 01-04-2021<br>29-07-2021                                        | <b>deroga non necessaria</b>                              |
| basilico                             | <b>Falcon Mk</b>     | propaquizafop 100 g/l | 01-04-2021<br>29-07-2021                                        | <b>deroga non necessaria</b>                              |
| Coriandolo da seme                   | <b>Agil</b>          | propaquizafop 100 g/l | 01-04-2021<br>29-07-2021                                        | <b>deroga non necessaria</b>                              |
| Bietola da costa e da<br>foglia      | <b>Agil</b>          | propaquizafop 100 g/l | 01-05-2021-<br>29-06-2021<br>e da<br>01-09-2021-<br>30-10-2021  | <b>deroga non necessaria</b>                              |
| vite                                 | <b>U 46 M Class</b>  | MCPA 200 g/l          | 01-04-2021<br>29-07-2021                                        | deroga del 08-04-2021                                     |
| pomacee                              | <b>Matsuda 25 WG</b> | flazasulfuron 25%     | 08-04-2021<br>05-08-2021<br><b>impiego entro<br/>31-05-2021</b> | etichetta del 08-04-2021 <b>deroga<br/>non necessaria</b> |
| pomacee                              | <b>Chikara 25 Wg</b> | flazasulfuron 25%     | 08-04-2021<br>05-08-2021<br><b>impiego entro<br/>30-04-2021</b> | etichetta del 08-04-2021 <b>deroga<br/>non necessaria</b> |
| drupacee                             | <b>Matsuda 25 WG</b> | flazasulfuron 25      | 08-04-2021<br>05-08-2021<br><b>impiego entro<br/>31-05-2021</b> | etichetta del 08-04-2021 <b>deroga<br/>non necessaria</b> |
| drupacee                             | <b>Chikara 25 Wg</b> | flazasulfuron 25%     | 08-04-2021<br>05-08-2021<br><b>impiego entro<br/>30-04-2021</b> | etichetta del 08-04-2021 <b>deroga<br/>non necessaria</b> |

|                 |                      |                   |                                                                 |                                                           |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| frutta a guscio | <b>Matsuda 25 WG</b> | flazasulfuron 25  | 08-04-2021<br>05-08-2021<br><b>impiego entro<br/>31-05-2021</b> | etichetta del 08-04-2021 <b>deroga<br/>non necessaria</b> |
| frutta a guscio | <b>Chikara 25 Wg</b> | flazasulfuron 25% | 08-04-2021<br>05-08-2021<br><b>impiego entro<br/>30-04-2021</b> | etichetta del 08-04-2021 <b>deroga<br/>non necessaria</b> |

**Anno 2021 - Prodotti fitosanitari autorizzati in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53**, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non necessitano di ulteriore deroga per l'utilizzo per chi aderisce alla misura 10.1 -produzione integrata, secondo quanto previsto nelle norme generali dei disciplinari di produzione integrata sotto riportato.

“Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche per altre colture o impieghi.

La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione di emergenza riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B Allegato I Dlgs 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene – CMR”.

“È consentita la concia di tutte le sementi e del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tale impiego, se non diversamente indicato nelle schede di coltura”

Tabella A: Prodotti fitosanitari di sintesi utilizzabili in produzione integrata

| PRODOTTO FITOSANITARIO | SOSTANZA ATTIVA | COLTURE                                                                                                                                                                                                            | AVVERSITÀ, ERBICIDA                                    | ATTIVITÀ        | PERIODO                       |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Zoxium ®240 SC         | Zoxamide        | pisello da seme e da industria senza baccello                                                                                                                                                                      | Peronospora                                            |                 | dal 12 marzo al 9 luglio 2021 |
| Sitofex                | Forchlorfenuron | actinidia                                                                                                                                                                                                          | Cancro batterico ( <i>Pseudomonas pv. actinidiae</i> ) | <i>syringae</i> | dal 12 marzo al 9 luglio 2021 |
| Apron XL               | Metalaxil-M     | concia dei semi e dei bulbi di carota, cetriolo, cavoli (cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, cavolo rapa), bietola da costa e da foglia, lattughe e insalate, erbe fresche, cipolla, cocomero | Pythium e Peronospora                                  |                 | dal 12 marzo al 9 luglio 2021 |
| Vertimec EC            | Abamectina      | noce                                                                                                                                                                                                               | <i>Panonychus ulmi</i>                                 |                 | dal 12 marzo al 9 luglio 2021 |

|               |               |                                    |                                                                                                                               |                                                                |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Closer        | Sulfoxaflor   | susino                             | afide farinoso del susino ( <i>Hyalopterus pruni</i> ), afide verdastrò piccolo del susino ( <i>Brachycaudus helichrysi</i> ) | dal 18 marzo al 18 luglio 2021                                 |
| Falcon MK     | Propaquizafop | prezzemolo e basilico              | diserbo post-emergenza o post-trapianto                                                                                       | dal 1 aprile al 29 luglio 2021                                 |
| Agil          | Propaquizafop | coriandolo da seme                 | diserbo post-emergenza                                                                                                        | dal 1 aprile al 29 luglio 2021                                 |
| Agil          | Propaquizafop | bietola da foglia e da costa       | diserbo post-emergenza o post-trapianto                                                                                       | dal 1 maggio al 29 giugno e dal 1 settembre al 30 ottobre 2021 |
| Matsuda 25 WG | Flazasulfuron | pomacee, drupacee, frutta a guscio | diserbo                                                                                                                       | Dal 8 aprile al 5 agosto 2021                                  |

Tabella B: Prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica (Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 del 17 dicembre che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008) e in produzione integrata

| PRODOTTO FITOSANITARIO | SOSTANZA ATTIVA           | COLTURE                                                                               | AVVERSITÀ, ERBICIDA   | ATTIVITÀ | PERIODO                             |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| Ibisco                 | COS_OGA                   | baby leaf (pieno campo e serra)                                                       | peronospora           |          | dal 3 novembre 2020 al 2 marzo 2021 |
| Ibisco                 | COS_OGA                   | lattughe e simili (pieno campo e serra)                                               | peronospora           |          | dal 3 novembre 2020 al 2 marzo 2021 |
| Ibisco                 | COS_OGA                   | rucola (pieno campo e serra) spinacio (pieno campo e serra)                           | peronospora           |          | dal 3 novembre 2020 al 2 marzo 2021 |
| 3logy                  | Eugenolo,geraniolo,timolo | fragola e piccoli frutti                                                              | botrite               |          | dal 11 febbraio al 10 giugno 2021   |
| 3logy                  | Eugenolo,geraniolo,timolo | lattughe e insalate incluse baby leaf (comprese le brassicacee) (pieno campo e serra) | botrite e sclerotinia |          | dal 11 febbraio al 10 giugno 2021   |
| 3logy                  | Eugenolo,geraniolo,timolo | solanacee (pomodoro, peperone, melanzana) (pieno campo e serra)                       | botrite               |          | dal 1 marzo 2021 al 28 giugno 2021  |
| 3logy                  | Eugenolo,geraniolo,timolo | finocchio (pieno campo)                                                               | sclerotinia           |          | dal 1 agosto al 28 novembre 2021    |
| Attracap               | Metarhizium brunnei       | patata                                                                                | larve di elateridi    |          | dal 17 febbraio al 16 giugno 2021   |

|              |                                     |                                                 |                                                                    |                                     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NEEMAZAL-T/S | Azadiractina                        | vite da uva e da tavola                         | cocciniglie                                                        | dal 17 febbraio al 16 giugno 2021   |
| Oikos        | Azadiractina                        | patata                                          | elateridi                                                          | dal 3 marzo al 30 giugno 2021       |
| Nemguard SC  | Estratto d'aglio                    | barbabietola da zucchero                        | punteruolo della barbabietola ( <i>Lixus junci</i> )               | dal 11 marzo al 8 luglio 2021       |
| AF-X1 2021   | Aspergillus flavus ceppo MUCL 54911 | mais                                            | aflatossine                                                        | dal 12 marzo al 9 luglio 2021       |
| Plantivax    | Laminarina                          | frumento, orzo, triticale, avena, segale, sorgo | oidio, ruggine e septoria                                          | dal 12 marzo al 9 luglio 2021       |
| Taegro       | Bacillus amyloliquefaciens FZB24    | actinidia                                       | botrite (in fioritura)                                             | dal 1 aprile al 29 luglio 2021      |
| Prev-am plus | Olio essenziale di arancio dolce    | frumento                                        | afidi                                                              | dal 1 aprile al 29 luglio 2021      |
| Prev-am plus | Olio essenziale di arancio dolce    | olivo (da olio e da tavola)                     | sputacchina                                                        | dal 1 aprile al 29 luglio 2021      |
| Prev-am plus | Olio essenziale di arancio dolce    | basilico                                        | peronospora                                                        | dal 15 maggio al 11 settembre 2021  |
| Prev-am plus | Olio essenziale di arancio dolce    | pomodoro (pieno campo e serra)                  | peronospora e acari                                                | dal 15 maggio al 11 settembre 2021  |
| Prev-am plus | Olio essenziale di arancio dolce    | mais e mais dolce                               | acari                                                              | dal 1 giugno al 28 settembre 2021   |
| Limocide     | Olio essenziale di arancio dolce    | basilico                                        | peronospora                                                        | dal 15 maggio all'11 settembre 2021 |
| Limocide     | Olio essenziale di arancio dolce    | pomodoro (pieno campo e serra)                  | acari<br>peronospora                                               | dal 15 maggio all'11 settembre 2021 |
| Asset Five   | Piretrine pure                      | carota e ravanello                              | mosca delle radici ( <i>Delia antiqua</i> e <i>Delia radicum</i> ) | dal 1 aprile al 29 luglio 2021      |
| Asset Five   | Piretrine pure                      | cereali                                         | afidi                                                              | dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021 |
| Asset Five   | Piretrine pure                      | erba medica                                     | afidi                                                              | dal 15 aprile al 12 agosto 2021     |
| Asset Five   | Piretrine pure                      | olivo                                           | sputacchina ( <i>Philaenus spumarius</i> )                         | dal 20 aprile al 17 agosto 2021     |

|            |                |                 |                                                |                                         |
|------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Asset Five | Piretrine pure | kiwi e nocciolo | cimice asiatica<br>afidi                       | dal 10 giugno al 7 ottobre 2021         |
| Asset Five | Piretrine pure | olivo           | mosca dell'olivo<br>( <i>Bactrocea oleae</i> ) | dal 1 luglio al 28 ottobre 2021         |
| Asset Five | Piretrine pure | cavolo rapa     | afidi                                          | dal 1 ottobre 2021 al 28 gennaio 2022   |
| Asset Five | Piretrine pure | sedano          | afidi                                          | dal 1 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 |

## Indicazioni Legislative

### Comunicato del DG Agricoltura Caccia e Pesca relativo alla proroga delle Operazioni della Misura 10 e 11 in scadenza al 31/12/2020

In considerazione del nuovo quadro comunitario è stata valutata la possibilità, a livello regionale, di prevedere per il 2021 il prolungamento di un anno dei contratti agroambientali in scadenza al 31/12/2020 per i Tipi di operazione 10.1.01 (Produzione integrata) e 10.1.07 (Regime sodivo) della Misura 10 (Misure agro-clima-ambientali) e 11.1.01 (Introduzione agricoltura biologica) e 11.2.01 (Mantenimento agricoltura biologica) della Misura 11.

Per potere acquisire certezza giuridica circa il prolungamento, è tuttavia necessario attendere l'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del Programma di Sviluppo rurale che richiederà ancora diverse settimane.

**Si informano quindi i beneficiari di tali tipi di operazione che potranno presentare la domanda di pagamento nel corso del 2021 solo mantenendo tutti gli impegni previsti.**

Al momento è già previsto nella proposta di modifica del PSR anche un bando per la misura 11 con adesione al 1/1/2022 che renderà possibile la prosecuzione degli aiuti agli aderenti al bando 2016 prorogato e la possibilità di nuove adesioni a chi ha aderito al bio dal 30/1/2020 (data ultima di adesione al bando 2020).

Al seguente link (<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2021/misure-agroambientali>) sono riportate le principali informazioni riguardanti le modalità di adesione e di gestione per le aziende interessate alla prosecuzione nel 2021 degli impegni scaduti al 31/12/2020 per i tipi di Operazione 10.1.01 (Produzione integrata) e 11.1.01 e 11.2.01 (Agricoltura biologica)."

Per il tipo di operazione 10.1.03 (Sostanza organica) non vi è invece la possibilità di prolungare i contratti in scadenza in quanto, successivamente alla concessione del bando 2016, sono state apportate modifiche al PSR che ne modificano significativamente l'applicazione.

### Revisione europea del rame

**"Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno" la s.a. è stata rinnovata per 7 anni fino al 31 dicembre 2025; sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.**

### Trattamenti in fioritura

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale del 04 marzo 2019 n. 2, inerente **"Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna"** (abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), le prescrizioni per i trattamenti in fioritura sono come di seguito riportate:

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

Per consultare l'intera normativa [BURERT n 64 del 04 marzo 2018](#).

## Mitigazione della deriva

Si segnala che al seguente link sono reperibili alcuni approfondimenti tecnici riguardanti le macchine irroratrici, l'agricoltura biologica e la mitigazione della deriva:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/bollettini/archivio-bollettini/bollettini-2019/approfondimenti>

## Controllo funzionale per le macchine irroratrici

Il controllo e la regolazione delle irroratrici devono essere eseguiti presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016.

Le aziende agricole in produzione integrata e biologica che applicano la Misura 10 e 11 del PSR 2014-20 e la Misura 214 – Azione 2 del PSR 2007-13, devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria ("regolazione strumentale"), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

A partire dal 1° gennaio 2021 l'attestato di conformità avrà durata di 3 anni, pertanto:

- un'irroratrice controllata e regolata fino al 31 dicembre 2020 compreso dovrà essere ricontrollata dopo 5 anni;
- un'irroratrice controllata e regolata a partire dal 1° gennaio 2021 dovrà essere ricontrollata dopo 3 anni.

Si rammenta che per motivi di natura tecnica alcune tipologie di irroratrici non sono assoggettabili alla metodologia di regolazione strumentale adottata dalla Regione Emilia-Romagna. A tal fine si veda quanto anticipato nell'Approfondimento n. 1 del 30 Marzo 2018 pubblicato sul sito della Regione al seguente link: [Approfondimento n. 1 del 30.03.2018](#)

Nota: sulla base di disposizioni assunte a livello regionale, si segnala che il collaudo dell'irroratrice dopo scadenza dell'attestato di conformità può essere rimandato a condizione che le previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale risultino attuate prima di qualsiasi trattamento eseguito successivamente alla scadenza dell'attestato stesso.

Ne deriva che nessun trattamento fitosanitario può essere eseguito con attestato di conformità scaduto.

Il Disciplinare 2021 precisa inoltre che "La sostituzione autonoma degli ugelli durante il periodo di validità dell'attestato di conformità con tipologie diverse da quelle adottate in fase di controllo funzionale e regolazione strumentale non richiede un nuovo intervento da parte dei Centri autorizzati. Tuttavia, tale operazione può comportare una sostanziale variazione delle modalità di utilizzo definite in sede del collaudo originario (volume di distribuzione, pressione di esercizio). In tali casi si suggerisce di prendere contatto con il Centro autorizzato che ha eseguito la regolazione strumentale al fine di definire la variazione delle modalità di utilizzo conseguente al cambio di ugelli effettuato in modo da registrare autonomamente i nuovi parametri di regolazione per opportuna memoria aziendale".

## Nuove proroghe previste per le tre abilitazioni relative ai prodotti fitosanitari (acquisto ed utilizzo, consulenza e vendita) e per gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2021.

Con l'approvazione del "Decreto Milleproroghe" (DL 183/2020 convertito con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) è stato definito che la proroga di validità di 12 mesi si estende a tutte le abilitazioni e attestati che hanno la scadenza naturale nel 2021, e che sono:

- abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari)
- abilitazioni alla consulenza
- abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari
- attestati di funzionalità delle macchine irroratrici

Il link per scaricare il documento è il seguente:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avvisi/2021/prodotti-fitosanitari-nuove-proroghe-per-abilitazioni-e-attestati-di-funzionalita-irroratrici>

## NOTA IRRIGAZIONE 06 LUGLIO 2021



Si invitano tecnici ed agricoltori a non sottostimare le esigenze irrigue.

E' possibile irrigare tutte le colture, anche in deroga ai disciplinari.

- Fragola Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 3,5 mm
- Melone Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 5 mm
- Cocomero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 5,5 mm
- Cipolla Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5 Sospendere le irrigazioni al collasso del colletto.
- Patata Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5 Sospendere le irrigazioni al raggiungimento del 25% di foglie gialle. E' ammessa l'irrigazione preraccolta per facilitare le operazioni colturali.
- Pomodoro da industria Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Bietola da zucchero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. Sospendere l'irrigazione nelle colture del primo modulo di estirpo ET: 5
- Mais Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 6
- Erba medica Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Prato stabile Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Fagiolino Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5

| COLTURA   | INTERFILARE INERBITO     |       | INTERFILARE LAVORATO     |       | NOTE |
|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------|
|           | Consumo giornaliero mm/d | medio | Consumo giornaliero mm/d | medio |      |
| POMACEE   | 5                        |       | 4,5                      |       |      |
| ALBICOCCO | 5                        |       | 4,5                      |       |      |
| SUSINO    | 4,5                      |       | 4                        |       |      |
| CILIEGIO  | 5                        |       | 4,5                      |       |      |
| PESCO     | 4,5                      |       | 4                        |       |      |
| VITE      | 4                        |       | 3,5                      |       |      |
| ACTINIDIA | 5                        |       | 4,5                      |       |      |

E' consigliabile irrigare i vigneti anche qualora non abbiano raggiunto la fase fenologica di pre-chiusura grappolo.

Si ricorda che per allevare in modo opportuno le piante giovani è necessario irrigarle evitando assolutamente stress idrici.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 45 mm su un susino con interfilare inerbito che consuma 4,5 mm, determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (45/4,5).

Gli impianti arborei messi a dimora recentemente potrebbero soffrire per il perdurare della siccità, laddove la falda è situata ad una profondità superiore di 100 cm dal piano di campagna. E' possibile consultare la profondità di falda sul portale della Regione Emilia Romagna FALDANET <http://faldanet.consorziocer.it/Faldanet/retefalda/index>

Per verificare la profondità della falda ipodermica nella propria azienda è anche possibile installare un piezometro. E' disponibile un

breve tutorial per costruire e installare con semplicità un piezometro nella propria azienda <https://www.youtube.com/watch?v=kBOspiWta5g>

La fertirrigazione degli impianti arborei a partire già dall'anno di impianto è necessaria per favorire l'ottimale sviluppo della pianta, in particolar modo dell'apparato radicale.

Si invitano tecnici e agricoltori a rilevare o stimare l'acqua disponibile nel terreno per evitare eccessi d'acqua nel terreno. Situazioni di asfissia e comunque di eccesso di acqua disponibile, soprattutto se protratti nel tempo, possono causare difetti nell'assorbimento di nutrienti e disfunzioni metaboliche che possono determinare cali di resa anche considerevoli o addirittura portare la pianta alla morte.

Per approfondire le modalità di calcolo dell'acqua disponibile, per toccare con mano sensori e centraline meteo, per vedere in azione gli impianti irrigui più innovativi o semplicemente per fare domande sulla propria situazione irrigua aziendale, l'Area dimostrativa delle tecnologie irrigue di Acqua Campus sarà aperta su prenotazione, contattando Gioele Chiari al 3497504961.

### Fertirinet

A partire dalla campagna 2019 è disponibile l'applicativo FERTIRINET per la gestione della fertirrigazione per le colture di mais, pomodoro, patata e pero.

Il nuovo servizio è presente in IRRINET e fornisce un consiglio di fertilizzazione a norma DPI e permette anche la registrazione anch'essa a norma delle operazioni eseguite. L'applicazione tiene conto del tipo di coltura, fase fenologica, tipo di suolo, condizioni meteo rilevate e previste, oltre che delle irrigazioni e fertilizzazioni eseguite (incluse le eventuali fertilizzazioni ordinarie), nonché coltura precedente.

Al servizio si accede, per i nuovi utenti, previa registrazione attraverso il link [https://www.irriframe.it/irriframe/home/Index\\_er](https://www.irriframe.it/irriframe/home/Index_er).

Per chi è già utente IrriNet è sufficiente inserire i seguenti input richiesti per ottenere il calcolo: "Dati chimici del suolo" e "Dati della coltura per la fertirrigazione"

| Data del rilevamento | Livello del fiume PO |
|----------------------|----------------------|
| 06 Luglio 2021       | 3,72 mslm            |

Si comunica che la Guida all'utilizzo di IrriNet per l'Impegno Aggiuntivo Facoltativo 25 (IAF 25) della TO 10.1.01 e M11 è stata aggiornata con l'edizione 2021 [https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi\\_2021/disciplinari-2021](https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi_2021/disciplinari-2021)

### Impegno aggiuntivo 25 (Impiego del sistema Irrinet):

Nella edizione 2021 della Guida all'utilizzo di IrriNet si è dato maggior rilievo sull'importanza, ai fini della esecuzione del bilancio idrico, di:

- associare di tutti gli appezzamenti con IAF 25 all'azienda con il CUAA.
- aggiornare le colture prima dell'inizio della stagione irrigua inserendo una data di start relativa alla stagione irrigua corrente.

La versione attualmente caricata sul sito è stata aggiornata anche con un indice contenente i link per andare direttamente ai capitoli a cui si è interessati.

## PARTE SPECIFICA

### Colture Arboree

## Note Colture Arboree

Diserbo arboree

Erbicidi fogliari totali per il controllo delle infestanti emerse (graminacee+dicotiledoni) :

- Glifosate , autorizzato su tutte le principali specie con i seguenti limiti di impiego (riferito a formulati a 360 g/litro):

Negli Impianti in produzione di pomacee, drupacee, actinidia , vite, olivo :

max 9 lt /anno per ettaro trattato se non si usano anche erbicidi residuali e 6 lt/anno per ettaro trattato se si usano anche erbicidi residuali

Negli Impianti in allevamento di pomacee, drupacee, actinidia , vite, olivo e negli impianti di noce e nocciolo

max 9 lt /anno per ettaro trattato

- Glifosate + 2.4 D autorizzato solo per pomacee,noce, nocciolo max 1 intervento/anno rispettando i limiti di impiego del glifosate. Per un miglior controllo di dicotiledoni perenni.

in alternativa solo per la vite:

Acido pelargonico.

Prodotto ad azione caustica attivo nei confronti dei polloni e delle infestanti

#### **Erbicidi fogliari per il controllo delle sole infestanti dicotiledoni emerse:**

##### **Spollonanti/Erbicidi**

Carfentrazone: autorizzato per actinidia,susino, melo,pero,pesco e vite. Prodotto di contatto attivo sia nei confronti dei polloni che delle infestanti dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo. Utilizzato come erbicida la dose max per singolo intervento è di 0.3 l/ha trattato, utilizzato come spollonante la dose è di 0.3 l/ettolitro con un max di 1 l/ha totale ( da piano culturale).

Pyrafluofen –metil: autorizzato per actinidia,albicocco,ciliegio,susino, melo,pero,pesco e vite. Prodotto di contatto attivo sia nei confronti dei polloni che delle infestanti dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo. Su actinidia ( e olivo ) l' impiego come erbicida è ( in termini di dosaggio) equiparato all' impiego come spollonante. Sulle altre colture ammesso l' uso come spollonante a 0.8 l/ha trattato per singolo intervento o l' impiego sinergizzante di altri erbicidi alla dose di 0.25-0.3 l/ha trattato.

##### **Erbicidi**

MCPA: autorizzato solo per pomacee. Prodotto sistemico attivo anche su dicotiledoni perenni

Fluroxipir: autorizzato solo per melo. Max 1 intervento/anno .Prodotto sistemico attivo anche su dicotiledoni perenni

#### **Erbicidi per il controllo delle sole infestanti graminacee emerse:**

| Sostanza attiva    | Colture autorizzate                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Propaquizafop      | <b>albicocco-susino-ciliegio-pomacee-noce-pesco-vite</b> |
| Fluazifop-p-butile | <b>Pesco-susino-ciliegio-vite-pomacee</b>                |
| ciclossidim        | <b>Pomacee-vite</b>                                      |
| Quizalofop-p-etile | <b>Albicocco-susino-ciliegio-pesco-pomacee-noce-vite</b> |

#### **Erbicidi residuali applicabili in questo periodo**

Molecole candidate alla sostituzione (CS)

Pendimetalin, diflufenican ,oxyfluorfen e propyzamide sono sottoposte ad una particolare regolamentazione. Negli impianti in produzione è ammesso l' utilizzo di una sola di queste molecole, alternativo a quello delle altre (max 1 intervento /anno ). Per la sola specie pero i DPI 2021 prevedono la possibilità di usare due di queste molecole. L' uso di molecole CS non impatta sull' utilizzo degli altri erbicidi residuali ( isoxaben per frutteto, isoxaben, flazasulfuron e penoxulam per vigneto).

#### **Frutteto (pomacee e drupacee).**

#### **Erbicidi disponibili (con alcune note da tenere in particolare considerazione).**

| Sostanza attiva | Dose (Ha trattato) | Note                                          |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| diflufenican    | <b>0,5 l/ha</b>    | contro dicotiledoni e graminacee. Molecola CS |

|                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (diflufenican + glifosate)              | <b>6 l/ha</b>                       | contro dicotiledoni e graminacee, ha attività sia fogliare che residuale. Per l'impiego nelle drupacee deve essere applicato non oltre la fase di fioritura.<br><br>Diflufenican Molecola CS      |
| flazasulfuron<br>formato Matsuda 25 WG) | (<br><b>consigliato 60-100 g/ha</b> | Concesso uso eccezionale (120 gg) da 8 aprile<br><br><b>Utilizzabile fino a a 31 maggio</b><br><br>Contro dicotiledoni e graminacee . Non utilizzare su terreni sabbiosi ( oltre 80 % ds sabbia). |

### Vigneto.

Erbicidi disponibili (con alcune note da tenere in particolare considerazione).

| Sostanza attiva            | Dose (Ha trattato)                            | Note                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pendimetalin               | <b>dose etichetta del formulato</b>           | contro dicotiledoni e graminacee, entro fase di pre-fioritura<br><br>Molecola CS                                                                                        |
| (diflufenican + glifosate) | <b>6 l/ha</b>                                 | contro dicotiledoni e graminacee, ha attività sia fogliare che residuale. Non deve essere applicato oltre la fase di fioritura. Diflufenican Molecola CS                |
| flazasulfuron<br>al 25 %)  | ( formulati<br><b>consigliato 70-100 g/ha</b> | Solo per impianti in produzione contro dicotiledoni e graminacee nel periodo di inverno-inizio primavera. Da utilizzare ad anni alterni, escludendo i terreni sabbiosi. |
| (oryzalin+penoxulam)       | <b>5 l/ha</b>                                 | <b>Utilizzabile negli impianti in produzione dal quarto anno</b> contro dicotiledoni e graminacee <b>da marzo</b> a luglio<br><br>Non più reperibile in commercio       |
| Penoxulam                  | <b>0.75</b>                                   | <b>Utilizzabile negli impianti in produzione dal terzo anno</b> contro dicotiledoni e graminacee<br><br><b>da marzo</b> a luglio. Alternativo a flazasulfuron           |

## Usi eccezionali

E' uscito il decreto per uso eccezionale su Melo Pero Pesco Nettarine e Noce Nocciolo del CLORPYRIFOS METILE (SUNDEK CIMICE 2021) con validità dal 11/05/2021 al 17/08/2021

dose max 3 lt/ha 1 trattamento tempo di carenza 50gg pomacee 21gg drupacee 60gg Noce Nocciolo

Attenzione riporta la frase:

È fatto divieto di utilizzo del prodotto nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

## MELO

### Fase fenologica: accrescimento frutti

---

#### Difesa

**COLPO DI FUOCO** rischio infettivo per l'inizio di questa settimana ALTO. Soprattutto in caso di comparsa di secondi fiori si possono utilizzare prodotti a base di BACILLUS SUBTILIS o BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS o AUREOBASIDIUM PULLULANS. Esegui interventi preventivi con: ACIBENZOLAR-S-METILE (Bion, induttore di resistenza, max 6 trattamenti)

**TICCHIOLATURA** in presenza d'infezione in campo si consiglia di ripristinare la copertura con: MANCOZEB (MAX 4) o METIRAM (max 3) e FLUAZINAM (max 4) DITIANON o CAPTANO (max 10) tra Ditianon + Captano max 10. I prodotti di copertura si possono eventualmente aggiungere:

FLUXAPIROXAD (max 3) o PENTHYOPIRAD (max 2) o FLOUPYRAM (max 3) totale max 4 trattamenti con SDHI (Fluxapyroxad, Penthiopyrad, Floupiram Boscalid ) Gli SDHI hanno anche un'attività antioidica

Per interventi curativi dopo una pioggia miscelare ai prodotti di copertura DIFENCONAZOLO (max 4 come somma di tutti gli IBE)

**OIDIO:** intervenire in caso di presenza con ZOLFO . Si ricorda che eventuali interventi effettuati con SDHI o IBE sono efficaci anche per il controllo dell'OIDIO.

**CARPOCAPSA** sfarfallamenti adulti I generazione 94-98%, presenza adulti in calo. Ovodeposizione 67-81%. Nascita larvale 36-56%. Al superamento soglia, 2 catture per trappola in 1-2 settimane non vincolante per le aziende che applicano i metodi della Confusione o della Distrazione sessuale, intervenire con larvicidi: FOSMET (max 2) EMAMECTINA (max 2) SPINOSAD (max 3) SPINETORAM (max 1, max 3 Spinetoram + Spinosad)

**EULIA:** sfarfallamenti adulti II generazione iniziati sabato nelle aree più calde. Presenza residua di uova che stanno schiudendo, nel fine settimana riprenderà l'ovodeposizione. Presenti larve che stanno impupandosi.

**PANDEMIS:** sfarfallamenti adulti di I generazione 3-10%. Sta iniziando l'ovodeposizione. Presenti soprattutto larve negli ultimi stadi di sviluppo che stanno impupandosi.

**CIMICE ASIATICA** si catturano adulti della nuova generazione. Presenze rilevate nei frutteti, anche a livelli elevati, con danni visibili su frutti. Si consiglia di monitorare i frutteti ed eseguire interventi specifici, eventualmente localizzati ai bordi del frutteto, con ACETAMIPRID o FOSMET (max 2)

I dati delle catture delle trappole installate sul territorio della Regione Emilia Romagna si possono da oggi visualizzare su questo sito web <https://big.csr.unibo.it/projects/cimice/monitoring.php>

Settimana 12 luglio – 18 luglio 2021

I dati raccolti dalla rete di monitoraggio mostrano come la presenza di adulti e ninfe sia in aumento rispetto alla settimana precedente, è invece ancora in calo la presenza di neanidi. Dalle prossime settimane è atteso un progressivo incremento delle ovodeposizioni. Nelle prime due settimane di luglio le catture medie di esemplari di H. halys per trappola sono simili o leggermente superiori a quelle registrate nel 2020. Si ricorda di verificare l'effettiva presenza di infestazioni negli appezzamenti con produzione attraverso monitoraggi attivi (ispezioni visive e frappe), ponendo particolare attenzione alle zone perimetrali dei frutteti e alla parte alta delle piante.

Michele Preti & Giacomo Vaccari

## PERO

### Fase fenologica: accrescimento frutti - raccolta Morettini

#### Difesa

**COLPO DI FUOCO** rischio infettivo per l'inizio di questa settimana ALTO. Soprattutto in caso di comparsa di secondi fiori si possono utilizzare prodotti a base di BACILLUS SUBTILIS o BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS o AUREOBASIDIUM PULLULANS. Seguire interventi preventivi con: ACIBENZOLAR-S-METILE (Bion, induttore di resistenza, max 6 trattamenti)

**TICCHIOLATURA** Si consiglia di ripristinare la copertura in presenza d'infezione in campo con: MANCOZEB o METIRAM (Mancozeb+Metiram max 3), FLUAZINAM, ZIRAM (max 4, 2 in prefioritura), DITIANON o CAPTANO (max 10) tra Ditianon + Captano max 16) eventualmente addizionati a FOSETIL AL o FOSFONATO DI K (in max 10)

Per interventi curativi dopo una pioggia miscelare ai prodotti di copertura DIFENCONAZOLO o TEBUCONAZOLO (max 3, 5 in totale tra tutti i IBE)

**MACULATURA BRUNA** Rischio infettivo medio-alto la scorsa settimana (soprattutto a partire da venerdì) ma in calo con le attuali previsioni. In calo, a partire da oggi anche l'indice di sporulazione.

Nel captaspore i voli di conidi si sono mantenuti bassi fino a venerdì 16, per poi aumentare in maniera consistente nelle giornate di sabato e domenica.

Si consideri che dopo la pioggia la quantità di conidi di *S. vesicarium* si incrementa ulteriormente, e raggiunge il suo picco massimo nei 2 giorni successivi e l'infettività si dimezza nei 3 giorni successivi fino ad azzerarsi il 5° e 6° giorno dopo l'evento di sporulazione.

Intervenire in previsione di pioggia, irrigazioni o condizioni di elevata umidità sulle cv sensibili con prodotti di copertura MANCOZEB o METIRAM (Mancozeb+Metiram max 3) o CAPTANO (max 10) tra Ditianon + Captano max 16) eventualmente addizionati a CYPRODINIL + FLUDIOXINIL (max 3 tra Cyprodinil e Fludioxonil) oppure BOSCALID (max 3) o PENTHIOPYRADIN (max 2) o FLUXAPYROXADIN (max 3) o FLUOPIRAM (max 3) o ISOPYRAZAM (max 2) In totale max 4 trattamenti con SDHI (Fluxapyroxad, Penthiopyrad, Fluopiram Boscalid e Isopyrazam) eseguiti distanziati in almeno 2 blocchi, oppure TEBUCONAZOLO (Max 3) o DIFENCONAZOLO (Max 5 in totale 5 IBE.)

E' stato approvato l'uso emergenziale di mefenfentrifluconazolo nel formulato "REVYSION PERO" (Max 2, in totale 5 IBE) su pero per il contenimento della maculatura bruna (*Stemphylium* spp.). Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21.05.2021 con validità dal 21.05.2021 fino al 17/9, con limite di impiego al tempo di carenza di 28 giorni dalla raccolta. Tale formulato è utilizzabile all'interno dei disciplinari di produzione integrata senza necessità di ulteriore deroga.

**CARPOCAPSA** sfarfallamenti adulti I generazione 94-98%, presenza adulti in calo. Ovodeposizione 67-81%. Nascita larvale 36-56%. Al superamento soglia, 2 catture per trappola in 1-2 settimane non vincolante per le aziende che applicano i metodi della Confusione o della Distrazione sessuale, intervenire con larvicidi: FOSMET (max 2) EMAMECTINA (max 2) SPINOSAD (max 3) SPINETORAM (max 1, max 3 Spinetoram + Spinosad)

**EULIA:** sfarfallamenti adulti II generazione iniziati sabato nelle aree più calde. Presenza residua di uova che stanno schiudendo, nel fine settimana riprenderà l'ovodeposizione. Presenti larve che stanno impupandosi.

**PANDEMIS:** sfarfallamenti adulti di I generazione 3-10%. Sta iniziando l'ovodeposizione. Presenti soprattutto larve negli ultimi stadi di sviluppo che stanno impupandosi.

**PSILLA DEL PERO** in presenza di consistente deposizione di uova intervenire con SPIROTETRAMAT (max 2, 1 contro questa avversità) o ABAMECTINA (max 2) o SPINETORAM (max 1, Spinetoram + Spinosad max 3).

**CIMICE ASIATICA** si catturano adulti della nuova generazione. Presenze rilevate nei frutteti, anche a livelli elevati, con danni visibili su frutti. Si consiglia di monitorare i frutteti ed eseguire interventi specifici, eventualmente localizzati ai bordi del frutteto, con ACETAMIPRID o FOSMET (max 2)

I dati delle catture delle trappole installate sul territorio della Regione Emilia Romagna si possono da oggi visualizzare su questo sito web <https://big.csr.unibo.it/projects/cimice/monitoring.php>

Settimana 12 luglio – 18 luglio 2021

I dati raccolti dalla rete di monitoraggio mostrano come la presenza di adulti e ninfe sia in aumento rispetto alla settimana precedente, è invece ancora in calo la presenza di neanidi. Dalle prossime settimane è atteso un progressivo incremento delle ovodeposizioni. Nelle prime due settimane di luglio le catture medie di esemplari di *H. halys* per trappola sono simili o leggermente superiori a quelle registrate nel 2020. Si ricorda di verificare l'effettiva presenza di infestazioni negli appezzamenti con produzione attraverso monitoraggi attivi (ispezioni visive e frappe), ponendo particolare attenzione alle zone perimetrali dei frutteti e alla parte alta delle piante.

Michele Preti & Giacomo Vaccari

## PESCO

**Fase fenologica: accrescimento frutti - raccolta**

---

### Difesa

**OIDIO:** da scamicatura intervenire con ZOLFO o BUPIRIMATE (max 2) o TETRACONAZOLO o FLUTRIAFOL Tetraconazolo e Fluatria max 4 come somma IBE

**CIDIA MOLESTAAI** superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana se non si sono utilizzati ovicidi intervenire con: BACILLUS THURINGIENSIS o EMAMECTINA (max 2) o ETOFENPROX (max 2, attivo anche per forficule e cimici) o FOSMET (ma Fosmet + Formetanate max 3) o INDOXACARB (max 4 attivo anche per forficule) o SPINOSAD (max 3, attvo anche per forficule) o SPINETORAM (max 1, Spinosad+ Spinetoram max 3 ) o ACETAMIPRID

**ANARSIA:** gli sfarfallamenti degli adulti di prima generazione stanno terminando, presenza adulti in calo. Ovodeposizione 68-85%. Nascita larvale 29-52%. Solo nel caso del superamento della soglia di 7 catture per trappola per settimana o 10 catture per trappola in 2 settimane, intervenire dopo circa una settimana dal superamento della soglia (ovvero alla nascita larvale) impiegando TRIFLUMURON (Max 2) oppure CLORANTRANIPROLE (Max 2) oppure EMAMECTINA (Max 2) oppure INDOXACARB (Max 4) oppure ACETAMIPRID oppure ETOFENPROX (Max 2) oppure SPINETORAM (Max 1 e Max 3 tra spinetoram e spinosad) oppure SPINOSAD (Max 3) oppure BACILLUS THURINGIENSIS

## SUSINO

**Fase fenologica: Susino accrescimento frutti - raccolta**

---

### Difesa

**CIDIA FUNEBRANA** sfarfallamenti adulti II gen. iniziata nelle aree più calde. Ovodeposizione terminata ma riprenderà a breve. Presenti larve di tutte le età, prevalentemente negli ultimi stadi di sviluppo. Sostituire fondi e feromoni nella trappole da monitoraggio.

Al superamento della soglia di 10 catture per trappola intervenire con SPINETORAM (max 1) o SPINOSAD (max 3 Spinosad+ Spinetoram) o EMAMECTINA (max 3) o FOSMET (max 2) OPPURE ETOFENPROX concesso in deroga (Trebon UP - art. 53 uso eccezionale).

## VITE

**Fase fenologica: chiusura grappolo - inizio invaiatura cv bianche precoci**

---

## Difesa

**PERONOSPORA:** il modello segnala che la germinazione delle oospore è tra 62 e il 94%. Non ci sono famiglie di oospore germinate pronte ad intercettare piogge nei prossimi 2-3giorni. Ci sono famiglie in maturazione che potrebbero intercettare eventuali piogge nel fine settimana.

La situazione di campo è sostanzialmente buona, con poche infezioni, per lo più accompagnate da scarsa sporulazione. Si invita comunque a mantenere protetta la vegetazione anticipando possibili piogge intervenendo con PRODOTTI RAMEICI

**OIDIO:** è terminata la fase di rischio di infezioni primarie, l'andamento stagionale è favorevole ad uno sviluppo epidemico della malattia. incremento delle infezioni e dei sintomi rilevati in campo. Nelle aziende colpite nell'anno precedente e sulle varietà sensibili valutare in base all'andamento meteo la necessità di un intervento preferibilmente con ZOLFO

**BOTRITE:** sono presenti i primi focolai, soprattutto laddove si sia intervenuti con abbondanti irrigazioni. Con l'avvicinarsi della fase di invaiatura, si consiglia, sui vitigni più sensibili, di intervenire con PYRIMETANIL (max 1) o FLUODIOXINIL +CYPRODINIL (max 1) CYPRODINIL (max 1, MAX 2 come somma dei tre prodotti)

o BOSCALID (max 1) o ISOFETAMID(max 1) Max 3 tra Boscalid, Isofetamid e Fluxapyroxad

o FENEXAMID (max 2) o FENPIRAZAMINE (max 1)

Max 2 interventi all'anno con prodotti di sintesi

oppure con AUREOBASIDIUM PULLULANS o BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS o BACILLUS SUBTILIS O BICARBONATO DI POTASSIO o EUGENIOLO + GERANIOLO + TIMOLO (max 4) o PYTHIUM OLIGANDRUM

**MAL DELL'ESCA:** incremento dei sintomi verificati in campo e dei colpi apoplettici

**COCCINIGLIE:** in aumento la presenza delle forme giovanili.

Si consiglia di monitorare attentamente la situazione aziendale per valutare la necessità di un intervento con ACETAMIPRID (max 2)

**E' stata concessa una deroga per il territorio regionale per l'eliminazione del vincolo del trattamento "localizzato sulle piante infestate" per la difesa della vite dalle cocciniglie**

In caso di consistenti infestazioni di cocciniglie farinose è possibile ricorrere alla lotta biologica attraverso lanci del parassitoide Anagrus pseudococci.

**TIGNOLETTA:** sfarfallamenti adulti II gen. 0-3%. Ovodeposizione 94-98%. Nascita larvale 83-90%. In settimana inizierà anche l'ovodeposizione degli adulti di II generazione.

Al superamento soglia (presenza uova o fori di penetrazione nei vigneti solitamente infestati, 5% di grappoli con uova negli altri casi) intervenire con CLORANTRANIPROLE (max 1) oppure dalla prossima settimana con EMAMECTINA (max 2) o INDOXACAF o TEBUFENOZIDE o SPINETORAM (max 1) o SPINOSAD (max 3 Spinosad+ Spinetoram) o BACILLUS THURINGENSIS .

Contro questo fitofago max 2 trattamenti con insetticidi di sintesi (esclusi BT e Spinosad)

**SCAFOIDEO:** si ricorda che è obbligatoria l'esecuzione di un secondo intervento, a distanza di 20-30 giorni dal primo e comunque non oltre il 10 agosto

Proseguono i ritrovamenti degli adulti in campo. In aumento la presenza di sintomi di FLAVESCENZA DORATA

Sono state pubblicate le date per gli interventi obbligatori per la lotta allo Scafoideo. In produzione integrata il primo intervento sarà da farsi tra il 25 giugno e il 5 luglio, ribattendolo a distanza di 20-30 giorni.

Per info (locandina):

<https://www.fitosanitario.mo.it/fito3/news/locandina-trattamenti-scapoideus-2021/>

Trattamenti insetticidi obbligatori

Nel 2021 nelle aree viticole delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dovranno essere effettuati interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo, come indicato nella Determinazione del Servizio fitosanitario regionale n. 8073 del 10/05/2019. Anche in conseguenza dell'aumento della pressione del vettore e della malattia riscontrato in certe aree attraverso il monitoraggio territoriale effettuato nel corso del 2020, si prevedono i seguenti obblighi:

Sono obbligatori 2 trattamenti:

- nelle aree vitate delle province di Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente alla zona focolaio del comune di Argenta) e Forlì-Cesena (limitatamente alla zona focolaio dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio)
- nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata al di fuori delle "zone focolaio"



e delle "zone di insediamento" e, in presenza di piante sintomatiche, nei comuni di Cervia e Ravenna

La lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus* dovrà essere attuata secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata Determinazione a partire dal 15 giugno 2021 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalcato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura; il primo trattamento o l'unico dovrà comunque essere realizzato entro e non oltre il 15 luglio 2021. Nei vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti, questi dovranno comunque essere effettuati nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 10 agosto 2021.

Nella tabella è riportato l'elenco degli insetticidi impiegabili sulla vite per la lotta allo *Scaphoideus titanus* nella quale sono evidenziati esclusivamente i prodotti ammessi in difesa integrata volontaria :

- sostanze attive ammesse in difesa integrata volontaria ai sensi degli specifici provvedimenti normativi (Reg. CE 1698/2005, CE 1308/2013, UE 1305/2013, UE 1234/07, L.R. 28/98 e L.R. 28/99);
- sostanze attive per l'agricoltura biologica (Reg. CE 834/2007, CE 889/2008, UE 354/2014, UE 673/2016, UE 1584/2018, UE 2164/2019).

Si precisa che le aziende viticole che non rientrano nel campo applicativo dei provvedimenti sopra evidenziati, possono utilizzare anche altri insetticidi autorizzati per la lotta alle cicaline/cicadellidi della vite.

Sostanze attive contro lo scafoideo ammesse in produzione integrata volontaria e raccomandate dal Servizio Fitosanitario per i vigneti a conduzione biologica (\*)

Difesa integrata

Limitazioni e note

Sali potassici degli acidi grassi

Olio essenziale di arancio dolce

Acetamiprid

Etofenprox Massimo 1 intervento all'anno

Acrinatrina Massimo 1 intervento contro scafoideo tra Acrinatrina e Tau-fluvalinate

Tau-fluvalinate

Flupyradifurone

Strategia di intervento

Sulla base dei rilievi effettuati sulle forme giovanili di *S. titanus*, fatto salvo quanto sopra riportato, i momenti per la realizzazione degli interventi insetticidi sono i seguenti:

Aziende in cui è obbligatorio eseguire 2 trattamenti

Eseguire il primo trattamento nel periodo che va dal 25 giugno al 5 luglio 2021. Non intervenire prima del termine del periodo della fioritura.

Eseguire il secondo trattamento dopo circa 20-30 giorni dal primo.

Aziende biologiche e aziende che impiegano prodotti a base di sostanze attive ammesse in agricoltura biologica

Eseguire il primo trattamento nel periodo che va dal 15 al 25 giugno 2021 e il secondo dopo 7-10 giorni. Si raccomanda di eseguire i trattamenti nelle ore serali. Questo accorgimento è fondamentale per una buona efficacia del trattamento. Nei vigneti ubicati nelle zone focolaio o nei quali è stata riscontrata una presenza significativa di scafoideo si consiglia l'esecuzione di un terzo trattamento. In questo caso eseguire i 3 trattamenti con un intervallo di 7-10 giorni l'uno dall'altro.

Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore serali quando l'attività dei pronubi è limitata o assente.

Si sottolinea che sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi o altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. Tali trattamenti sono inoltre vietati in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi (L.R. n. 2/2019).

## Colture Erbacee

### Note Colture Erbacee

#### Indicazioni agronomiche.

La copertura vegetale ha lo scopo di limitare i fenomeni erosivi ed il rischio di percolazione dei nutrienti. Nelle aree di pianura è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno primaverile (dal 30 settembre al 20 marzo) al fine di contenere la perdita di elementi nutritivi.

In annate in cui le precipitazioni verificatesi tra il 1° ottobre e il 31 gennaio successivo risultino inferiori ai 150 mm, le eventuali lavorazioni possono essere anticipate ad inizio febbraio. Nelle aree di collina e montagna in appezzamento con pendenze medie superiori al 10%, è obbligatorio

l'inerbimento permanente delle interfile, anche se presenti i solchi acquai, da attuarsi con semine artificiali o con inerbimento spontaneo. Tale vincolo non si applica su suoli a tessitura "tendenzialmente argilloso" in annate a scarsa piovosità primaverile con precipitazioni cumulate dal 1° aprile al 30 giugno inferiori a 150 mm), durante le quali è consentito effettuare un'erpatura, a una profondità inferiore ai 10 cm, o una scarificazione. Nelle colture arboree quando esiste il vincolo dell'inerbimento dell'inter-fila sono comunque ammessi gli interventi localizzati lungo la fila per l'interramento dei fertilizzanti.

#### Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio-31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di GLIFOSATE (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l/ha per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2\text{l/ha} \times \text{numero di ha}$  ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare i dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative. Si fa presente che le applicazioni di glifosate in pre-semina diventano alternative alle applicazioni in pre emergenza (nelle colture dove è autorizzato questo impiego, es. bietola, mais, cipolla).

Altri possibili vincoli per la scelta degli erbicidi nelle colture in successione sono quelli relativi alle seguenti molecole: S-metalaclor, aclonifen, bentazone, bifenox.

Queste molecole possono essere utilizzate sullo stesso appezzamento al massimo una volta ogni 2 anni indipendentemente che vengano utilizzati sulle colture:

S-METALACLOR: mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia

ACLONIFEN: mais, sorgo, pomodoro, girasole, patata

BENTAZONE: sorgo, soia, medica

BIFENOX: soia, cereali a paglia

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

### Fase fenologica: ingrossamento fittone

#### Difesa

**CERCOSPORA:** Rischio infettivo basso con le attuali previsioni

Si consiglia di intervenire tempestivamente a seguito di una pioggia o di una irrigazione con SALI di RAME o MANCOZEB (Max 3) o TETRACONAZOLO o PROCLORAZ o DIFECONAZOLO+FENPROPIDIN (tra tetraconazolo, procloraz e difeconazolo+fenpropidin Max 3 anno; difeconazolo+fenpropidin Max 1 anno). Contro questa avversità Max 3 interventi anno e 4 interventi per estirpi dopo il 10 settembre, con i suddetti prodotti escluso i sali di rame.

**MAMESTRA:** al superamento della soglia di 2-3 larve per pianta e 10% di distruzione dell'apparato fogliare è possibile intervenire con:

CYPERMETRINA o DELTAMETRINA o LAMBDAIALOTRINA o ETOFENPROX o INDOXACARB o BACILLUSTHURINGIENSIS  
Max 3 insetticidi all'anno con esclusione dei GEODISINFESTANTI e FORMULATI BIO  
DELTAMETRINA Max 1  
LAMBDAIALOTRINA ed ETOFENPROX Max 1  
INDOXACARB MAX 3

## MAIS

Fase fenologica: maturazione lattea

---

### Difesa

**PIRALIDE:** Intervenire solo con presenza accertata dell'insetto.

Nel 'intervento contro la piralide preferire l'utilizzo di tricogramma o bacillus thuringensis.

Nota: si ricorda, in particolare in riferimento al mais dolce per il quale vengono effettuati con più frequenza interventi mirati contro la piralide, che i trattamenti insetticidi in fioritura non sono ammessi con l'eccezione dell'impiego di Bacillus thuringensis, unico principio attivo ad azione insetticida ammesso anche in fioritura con delibera della giunta regionale (Delibera Num. 624 del 03/05/2021). Pertanto, in caso la necessità di un intervento contro la piralide coincida con la fase fenologica della fioritura è possibile utilizzare esclusivamente Bacillus thuringensis.

## Colture Orticole

## POMODORO DA INDUSTRIA

Fase fenologica: ingrossamento frutti - invaiatura

---

### Difesa

**PERONOSPORA** indice ipi ha superato la fase di allerta nella maggior parte della provincia. Rischio infettivo in diminuzione per questa settimana.

In previsione di pioggia intervenire con: PRODOTTI RAMEICI o FLUAZINAM (max 2 trattamenti)

o AZOXISTROBIN\* (max 2) o PYRACLOSTROBIN\* o FAMOXADONE\* (max 1 (\*tra Azoxistrobin,

Pyraclostrobin, Famoxadone max 3 trattamenti)

o METIRAM ( max 3 ) o ZOXAMIDE (max 4 ), eventualmente addizionati a FOSETIL

AL (Impiegabile fino alla allegazione del secondo palco).

In caso di interventi su vegetazione non protetta utilizzare fungicidi ad attività tiva: CIMOXANIL CIMOXANIL+ PROPAMOCARB (Cimoxan max ) o CYAZOFAMIDE o AMISULBRON (in totale max 3 trattamenti) o

BENALXIL\* o METALXIL M\* (\*in totale max 3 ) DIMETOMORF\*\* o MANDIPROPAMIDE \*\* (\*\*in totale max 4 )

AMETOCTRADINA o AMETOCTRADINA + DIMETOMORF o AMETOCTRADINA + METIRAM (Ametoctradina max 3)

OXATHIPIPROLIN (max 3 trattamenti).

Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di 2 sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento; in quest'ultimo caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate

**NOTTUA GIALLA** monitorare il volo dell'insetto; su trapianti con avanzato sviluppo delle bacche e superata la soglia di 2 piante con presenza di uova o larve su 30 piante controllate, intervenire con CLORANTRANIPROLE (max 2) o INDOXACARB (max4) o EMAMECTIN (max2) o SPINETORAM (max 2, 3 tra Spinosad e Spinetoram ).

**RAGNO ROSSO** in presenza di focolai precoci e di aree decolorate intervenire con ABAMECTINA (max 1) o BIFENAZATE o ACEQUINOCYL (max 1 Tra Bifenazate e Acequinocyl) o CLOFENTEZINE o EXITIAZOX o ETOXAZOLE (max 1 Tra Clofentezine, Exitiaz Etoxazole) o FENPIROXIMATE (max 1) o CYFLUMETOFEM.



## BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Le seguenti indicazioni tecniche fanno riferimento a quanto previsto dai Regolamenti della Comunità europea sull'agricoltura biologica: [834/2007](#) (obiettivi, principi e norme generali) e [889/2008](#) (norme tecniche di applicazione) e successive integrazioni e modifiche. Le disposizioni applicative si trovano nel DM [6793/2018](#) e successiva modifica [DM 3757/2020](#) che completano il quadro normativo.

### PARTE GENERALE

#### INDICAZIONI LEGISLATIVE

##### Abbruciamento residui vegetali .

Per un'opportuna diffusione si informa che da lunedì scatterà su tutto il territorio regionale la fase di grave pericolosità per gli incendi boschivi. La seguente comunicazione verrà pubblicata anche sui principali portali web di settore della Regione Emilia-Romagna.

**A partire dal 5 luglio 2021, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha disposto di attivare su tutto il territorio regionale la fase di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, che durerà fino al giorno 18 luglio 2021 fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteo climatiche.**

**Durante il periodo di grave pericolosità è ovunque vietato l'abbruciamento dei residui vegetali risultanti dai lavori agricoli e forestali.**

I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:

- 115 da chiamare in caso d'incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
- 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);
- 800841051 numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi.

Chi anche in maniera involontaria provoca un incendio boschivo o adotta comportamenti che possano innescarlo, rischia sanzioni amministrative e penali e può essere condannato al risarcimento dei danni.

##### Uso eccezionale prodotti fitosanitari:

Uso eccezionale prodotti fitosanitari:

L'elenco degli usi eccezionali - Prodotti fitosanitari autorizzati in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'anno 2021 è contenuto all'interno del documento predisposto dal Servizio Fitosanitario Regionale e consultabile al seguente link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/deroghe-ai-disciplinari/deroghe-territoriali-2021>

L'ultimo documento "Usi eccezionali 2021 che non richiedono richiesta di deroga" riporta in Tabella B: Prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica (Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 del 17 dicembre che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008). Il documento verrà progressivamente aggiornato con gli eventuali nuovi usi in uscita nell'arco dell'annata.

##### Estensione di etichetta:

- È stato firmato il Decreto di estensione d'impiego del prodotto **KARMA 85** (Bicarbonato di Potassio). Di seguito le estensioni ottenute:

CAROTA (oidio); FINOCCHIO, PASTINACA, SEDANO, PREZZEMOLO, ERBE FRESCHE (CORIANDOLO, ANETO, CUMINO, ANGELICA) (alternaria); CILIEGIO e SUSINO (monilia); POMACEE (maculatura). Per impiego su tutte le drupacee le applicazioni sono consentite dallo stadio di schiusura gemme

- È autorizzata l'estensione d'impiego su **uva da vino e da tavola** contro *Scaphoideus titanus* e su melo e pero contro afide lanigero del prodotto fitosanitario denominato **NATURALIS** contenente la sostanza attiva *Beauveria bassiana*.

- È autorizzata l'estensione d'impiego su **melo e pero** contro **Ticchiolatura** del prodotto fitosanitario denominato PREV-AM PLUS contenente la sostanza attiva Olio essenziale di arancio dolce.

- È autorizzata l'estensione d'impiego su **melo e pero** contro **Ticchiolatura** del prodotto fitosanitario denominato LIMOCIDE contenente la sostanza attiva Olio essenziale di arancio dolce.

**Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti.** Con determinazione dirigenziale [n. 2575 del 15/02/2021](#) il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato le "Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti" e in particolare

[La combustione dei residui vegetali dei lavori agricoli e forestali. Quando e come è consentita.](#)

[Arpae - Liberiamo l'aria](#)

#### **\*Impiego dei composti del rame in biologico:**

Si ricorda che con Reg. (UE) 2018/1981 le s.a. composti del rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025; sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano *un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.*

#### **TRATTAMENTI IN FIORITURA**

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale del 04 marzo 2019 n. 2, inerente "**Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna**" (abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), le prescrizioni per i trattamenti in fioritura sono come di seguito riportate:

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, **è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.**

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

Per consultare l'intera normativa [BURERT n 64 del 04 marzo 2018](#).

#### **NOTA IRRIGAZIONE 06 LUGLIO 2021**

Si invitano tecnici ed agricoltori a non sottostimare le esigenze irrigue.

E' possibile irrigare tutte le colture, anche in deroga ai disciplinari.

- Fragola Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 3,5 mm

- Melone Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 5 mm

- Cocomero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 5,5 mm

- Cipolla Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5 Sospendere le irrigazioni al collasso del colletto.

- Patata Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5 Sospendere le irrigazioni al raggiungimento del 25% di foglie gialle. E' ammessa l'irrigazione preraccolta per facilitare le operazioni colturali.

- Pomodoro da industria Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Bietola da zucchero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. Sospendere l'irrigazione nelle colture del primo modulo di estirpo ET: 5
- Mais Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 6
- Erba medica Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Prato stabile Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Fagiolino Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5

| COLTURA   | INTERFILARE INERBITO           | INTERFILARE LAVORATO           | NOTE |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|           | Consumo medio giornaliero mm/d | Consumo medio giornaliero mm/d |      |
| POMACEE   | 5                              | 4,5                            |      |
| ALBICOCCO | 5                              | 4,5                            |      |
| SUSINO    | 4.5                            | 4                              |      |
| CILIEGIO  | 5                              | 4,5                            |      |
| PESCO     | 4,5                            | 4                              |      |
| VITE      | 4                              | 3,5                            |      |
| ACTINIDIA | 5                              | 4,5                            |      |

E' consigliabile irrigare i vigneti anche qualora non abbiano raggiunto la fase fenologica di pre-chiusura grappolo.

Si ricorda che per allevare in modo opportuno le piante giovani è necessario irrigarle evitando assolutamente stress idrici.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 45 mm su un susino con interfilare inerbito che consuma 4,5 mm, determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (45/4,5).

Gli impianti arborei messi a dimora recentemente potrebbero soffrire per il perdurare della siccità, laddove la falda è situata ad una profondità superiore di 100 cm dal piano di campagna. E' possibile consultare la profondità di falda sul portale della Regione Emilia Romagna FALDANET <http://faldanet.consorziocer.it/Faldanet/retefalda/index>

Per verificare la profondità della falda ipodermica nella propria azienda è anche possibile installare un piezometro. E' disponibile un breve tutorial per costruire e installare con semplicità un piezometro nella propria azienda <https://www.youtube.com/watch?v=kBOspiWta5g>

La fertirrigazione degli impianti arborei a partire già dall'anno di impianto è necessaria per favorire l'ottimale sviluppo della pianta, in particolar modo dell'apparato radicale.

Si invitano tecnici e agricoltori a rilevare o stimare l'acqua disponibile nel terreno per evitare eccessi d'acqua nel terreno. Situazioni di asfissia e comunque di eccesso di acqua disponibile, soprattutto se protratti nel tempo, possono causare difetti nell'assorbimento di nutrienti e disfunzioni metaboliche che possono determinare cali di resa anche considerevoli o addirittura portare la pianta alla morte.

Per approfondire le modalità di calcolo dell'acqua disponibile, per toccare con mano sensori e centraline meteo, per vedere in azione gli impianti irrigui più innovativi o semplicemente per fare domande sulla propria situazione irrigua aziendale, l'Area dimostrativa delle tecnologie irrigue di Acqua Campus sarà aperta su prenotazione, contattando Gioele Chiari al 3497504961.

#### Fertirrinet

A partire dalla campagna 2019 è disponibile l'applicativo FERTIRRINET per la gestione della fertirrigazione per le colture di mais,

pomodoro, patata e pero.

Il nuovo servizio è presente in IRRINET e fornisce un consiglio di fertilizzazione a norma DPI e permette anche la registrazione anch'essa a norma delle operazioni eseguite. L'applicazione tiene conto del tipo di coltura, fase fenologica, tipo di suolo, condizioni meteo rilevate e previste, oltre che delle irrigazioni e fertilizzazioni eseguite (incluse le eventuali fertilizzazioni ordinarie), nonché coltura precedente.

Al servizio si accede, per i nuovi utenti, previa registrazione attraverso il link [https://www.irriframe.it/irriframe/home/Index\\_er](https://www.irriframe.it/irriframe/home/Index_er).

Per chi è già utente IrriNet è sufficiente inserire i seguenti input richiesti per ottenere il calcolo: "Dati chimici del suolo" e "Dati della coltura per la fertirrigazione"

| Data del rilevamento | Livello del fiume PO |
|----------------------|----------------------|
| 06 Luglio 2021       | 3,72 mslm            |

Si comunica che la Guida all'utilizzo di IrriNet per l'Impegno Aggiuntivo Facoltativo 25 (IAF 25) della TO 10.1.01 e M11 è stata aggiornata con l'edizione 2021 [https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi\\_2021/disciplinari-2021](https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi_2021/disciplinari-2021)

#### **Impegno aggiuntivo 25 (Impiego del sistema Irrinet):**

Nella edizione 2021 della Guida all'utilizzo di IrriNet si è dato maggior rilievo sull'importanza, ai fini della esecuzione del bilancio idrico, di:

- associare di tutti gli appezzamenti con IAF 25 all'azienda con il CUA.
- aggiornare le colture prima dell'inizio della stagione irrigua inserendo una data di start relativa alla stagione irrigua corrente.

La versione attualmente caricata sul sito è stata aggiornata anche con un indice contenente i link per andare direttamente ai capitoli a cui si è interessati.

#### **SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA**

\* E' stata pubblicata la circolare ministeriale applicativa N. [0269583](#) che riporta le seguenti indicazioni inerenti la gestione delle deroghe per le specie in lista rossa ERBA MEDIA e TRIFOGLIO ALESSANDRINO Con riferimento all'erba medica ed al trifoglio alessandrino, inserire in "Lista rossa" nell'ambito della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB il tempo utile entro il quale l'utente deve dimostrare di aver attivato contatti per ordinare la semente biologica da utilizzare successivamente alla data del 1° gennaio 2022 è stabilito alla data del 31 luglio 2021. Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di "pubblicata" alla data del 31 luglio 2021, possono ottenere la deroga all'utilizzo delle suddette sementi biologiche, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio "Ordine" presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 31 luglio 2021. Gli organismi di controllo- qualora accertino che l'operatore abbia utilizzato semente convenzionale in assenza della manifestazione di interesse di cui sopra, attivata tramite lo specifico servizio del SIB- dovranno adottare la corrispondente misura della "diffida".

In agricoltura biologica si possono utilizzare solamente sementi e materiale di moltiplicazione certificati provenienti da agricoltura biologica. Considerata l'insufficiente disponibilità da parte del mercato di tale materiale per talune varietà, qualora non sia possibile reperire semente o materiale di moltiplicazione biologico è consentito utilizzare materiale non biologico proveniente da agricoltura convenzionale richiedendo la deroga secondo apposita procedura.

Conformemente alla procedura è autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo rispettino i seguenti vincoli:

- a) non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- c) soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

(DM 6793 del 18 luglio 2018)

#### **Banca Dati Sementi Biologiche:**

La BDSB è raggiungibile al seguente link: <https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml>

L'utilizzo della nuova BDSB è subordinato alla registrazione come utente qualificato:



<https://mipaaf.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14>

Si ricorda che con Nota informativa [MIPAFF 2020-9284223](#) sono state definite le assegnazioni dell' "erba medica" e del "trifoglio alessandrino" alla "Lista rossa", prevista per il funzionamento della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all'Allegato. Pertanto, a seguito della interrogazione della BDSB, a far data dal 1° gennaio 2021, per le specie in questione è resa visibile la lista dei fornitori delle sementi ottenute con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione al quale l'operatore biologico deve rivolgersi per concludere la transazione commerciale di acquisto delle sementi medesime. Rimane salva per l'operatore la possibilità di non concludere la transazione commerciale nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 889/2008.

Qualora una determinata varietà non fosse presente in BDSB occorre chiederne l'inserimento (precisando specie, denominazione e status della varietà – per esempio se iscritta al catalogo comune comunitario) a CREA-DC per la necessaria istruttoria al seguente indirizzo email: [deroghe.bio@crea.gov.it](mailto:deroghe.bio@crea.gov.it).

## GESTIONE DEL SUOLO

**Rotazioni:** Il [DM n. 3757 del 9 aprile 2020](#), decreto di modifica del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.

Il Decreto apporta modifiche alle norme tecniche per la gestione delle rotazioni in agricoltura biologica, delle quali si riporta di seguito una versione integrata:

- 1) La fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.
- 2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno **due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.**
- 3) In deroga a quanto riportato al comma 2:
  - a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a **leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.**;
  - b. il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
  - c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi.
  - d. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
  - e. le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
- 4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, **la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.**
- 5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.
- 6) I presenti vincoli non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.

## FERTILIZZAZIONE

Fertilizzanti commerciali: verificare che sul prodotto ci sia l'indicazione "Consentito in agricoltura biologica" o controllare la presenza delle materie prime che compongono il prodotto all'interno dell'elenco dell'allegato I del Reg. 889/2008, indicato anche sul Decreto legislativo 55/2012. Si ricorda che è possibile anche la consultazione dei fertilizzanti ammessi all'uso in biologico all'interno del [Registro Fertilizzanti all'interno del SIAN](#).



## MODELLI PREVISIONALI

I modelli previsionali (messi a punto dal Servizio Fitosanitario Regionale dell'Emilia Romagna) danno indicazioni sull'andamento dello sviluppo dei fitofagi e dei patogeni, in funzione dei parametri climatici. I modelli non forniscono indicazioni sull'entità delle infestazioni e l'informazione che danno deve essere confrontata con la realtà aziendale, sulla base dell'esperienza professionale di tecnici ed agricoltori.

Le indicazioni sui modelli fitofagi riportati a bollettino per le singole avversità sono riferite al territorio della provincia di Bologna.

## Mitigazione della deriva

Si segnala che al seguente link sono reperibili alcuni approfondimenti tecnici riguardanti le macchine irroratrici, l'agricoltura biologica e la mitigazione della deriva:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/bollettini/archivio-bollettini/bollettini-2019/approfondimenti>

## Controllo funzionale per le macchine irroratrici

Il controllo e la regolazione delle irroratrici devono essere eseguiti presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016.

Le aziende agricole in produzione integrata e biologica che applicano la Misura 10 e 11 del PSR 2014-20 e la Misura 214 – Azione 2 del PSR 2007-13, devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria ("regolazione strumentale"), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016.

A partire dal 1° gennaio 2021 l'attestato di conformità avrà durata di 3 anni, pertanto:

- un'irroratrice controllata e regolata fino al 31 dicembre 2020 compreso dovrà essere ricontrollata dopo 5 anni;
- un'irroratrice controllata e regolata a partire dal 1° gennaio 2021 dovrà essere ricontrollata dopo 3 anni.

Si rammenta che per motivi di natura tecnica alcune tipologie di irroratrici non sono assoggettabili alla metodologia di regolazione strumentale adottata dalla Regione Emilia-Romagna. A tal fine si veda quanto anticipato nell'Approfondimento n. 1 del 30 Marzo 2018 pubblicato sul sito della Regione al seguente link: [Approfondimento n. 1 del 30.03.2018](#)

Nota: sulla base di disposizioni assunte a livello regionale, si segnala che il collaudo dell'irroratrice dopo scadenza dell'attestato di conformità può essere rimandato a condizione che le previste operazioni di controllo funzionale e regolazione strumentale risultino attuate prima di qualsiasi trattamento eseguito successivamente alla scadenza dell'attestato stesso.

Ne deriva che nessun trattamento fitosanitario può essere eseguito con attestato di conformità scaduto.

Il Disciplinare 2021 precisa inoltre che "La sostituzione autonoma degli ugelli durante il periodo di validità dell'attestato di conformità con tipologie diverse da quelle adottate in fase di controllo funzionale e regolazione strumentale non richiede un nuovo intervento da parte dei Centri autorizzati. Tuttavia, tale operazione può comportare una sostanziale variazione delle modalità di utilizzo definite in sede del collaudo originario (volume di distribuzione, pressione di esercizio). In tali casi si suggerisce di prendere contatto con il Centro autorizzato che ha eseguito la regolazione strumentale al fine di definire la variazione delle modalità di utilizzo conseguente al cambio di ugelli effettuato in modo da registrare autonomamente i nuovi parametri di regolazione per opportuna memoria aziendale".

## Nuove proroghe previste per le tre abilitazioni relative ai prodotti fitosanitari (acquisto ed utilizzo, consulenza e vendita) e per gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2021.

Con l'approvazione del "Decreto Milleproroghe" (DL 183/2020 convertito con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) è stato definito che la proroga di validità di 12 mesi si estende a tutte le abilitazioni e attestati che hanno la scadenza naturale nel 2021, e che sono:

abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari)

abilitazioni alla consulenza

abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari

attestati di funzionalità delle macchine irroratrici

Il link per scaricare il documento è il seguente:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avvisi/2021/prodotti-fitosanitari-nuove-proroghe-per-abilitazioni-e-attezzati-di-funzionalita-irroratrici>

#### NOTA IRRIGAZIONE 22 Giugno 2021

Vento, radiazione solare e temperature alte, continueranno a favorire l'aumento dell'evapotraspirazione.

Si invitano tecnici ed agricoltori a non sottostimare le esigenze irrigue.

E' possibile irrigare tutte le colture, anche in deroga ai disciplinari.

- Fragola Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 3,5 mm
- Melone Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 5 mm
- Cocomero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet 5,5 mm
- Aglio Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,5
- Cipolla Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,5
- Patata Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- Pomodoro da industria Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Bietola da zucchero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5
- Bietola da seme Sospendere le irrigazioni
- Mais Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 5
- Erba medica Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Prato stabile Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,5
- Fagiolino Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4

| COLTURA   | INTERFILARE INERBITO           | INTERFILARE LAVORATO           | NOTE |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|           | Consumo medio giornaliero mm/d | Consumo medio giornaliero mm/d |      |
| POMACEE   | 5                              | 4,5                            |      |
| ALBICOCCO | 5                              | 4,5                            |      |
| SUSINO    | 4,5                            | 4                              |      |
| CILIEGIO  | 5                              | 4,5                            |      |
| PESCO     | 4,5                            | 4                              |      |
| VITE      | 4                              | 3,5                            |      |
| ACTINIDIA | 5                              | 4,5                            |      |

E' consigliabile irrigare i vigneti anche qualora non abbiano raggiunto la fase fenologica di pre-chiusura grappolo.

Si ricorda che per allevare in modo opportuno le piante giovani è necessario irrigarle evitando assolutamente stress idrici.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo

giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 45 mm su un susino con interfilare inerbito che consuma 4,5 mm, determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (45/4,5).

Gli impianti arborei messi a dimora recentemente potrebbero soffrire per il perdurare della siccità, laddove la falda è situata ad una profondità superiore di 100 cm dal piano di campagna. E' possibile consultare la profondità di falda sul portale della Regione Emilia Romagna FALDANET <http://faldanet.consorziocer.it/Faldanet/retefalda/index>

Per verificare la profondità della falda ipodermica nella propria azienda è anche possibile installare un piezometro. E' disponibile un breve tutorial per costruire e installare con semplicità un piezometro nella propria azienda <https://www.youtube.com/watch?v=kBOspiWta5g>

La fertirrigazione degli impianti arborei a partire già dall'anno di impianto è necessaria per favorire l'ottimale sviluppo della pianta, in particolar modo dell'apparato radicale.

Si invitano tecnici e agricoltori a rilevare o stimare l'acqua disponibile nel terreno per evitare eccessi d'acqua nel terreno. Situazioni di asfissia e comunque di eccesso di acqua disponibile, soprattutto se protratti nel tempo, possono causare difetti nell'assorbimento di nutrienti e disfunzioni metaboliche che possono determinare cali di resa anche considerevoli o addirittura portare la pianta alla morte.

Per approfondire le modalità di calcolo dell'acqua disponibile, per toccare con mano sensori e centraline meteo, per vedere in azione gli impianti irrigui più innovativi o semplicemente per fare domande sulla propria situazione irrigua aziendale, l'Area dimostrativa delle tecnologie irrigue di Acqua Campus sarà aperta su prenotazione, contattando Gioele Chiari al 3497504961.

### Fertirrinet

A partire dalla campagna 2019 è disponibile l'applicativo FERTIRRINET per la gestione della fertirrigazione per le colture di mais, pomodoro, patata e pero.

Il nuovo servizio è presente in IRRINET e fornisce un consiglio di fertilizzazione a norma DPI e permette anche la registrazione anch'essa a norma delle operazioni eseguite. L'applicazione tiene conto del tipo di coltura, fase fenologica, tipo di suolo, condizioni meteo rilevate e previste, oltre che delle irrigazioni e fertilizzazioni eseguite (incluse le eventuali fertilizzazioni ordinarie), nonché coltura precedente.

Al servizio si accede, per i nuovi utenti, previa registrazione attraverso il link [https://www.irriframe.it/irriframe/home/Index\\_er](https://www.irriframe.it/irriframe/home/Index_er).

Per chi è già utente IrriNet è sufficiente inserire i seguenti input richiesti per ottenere il calcolo: "Dati chimici del suolo" e "Dati della coltura per la fertirrigazione"

| Data del rilevamento | Livello del fiume PO |
|----------------------|----------------------|
| 22 Giugno 2021       | 3.7 mslm             |

Si comunica che la Guida all'utilizzo di IrriNet per l'Impegno Aggiuntivo Facoltativo 25 (IAF 25) della TO 10.1.01 e M11 è stata aggiornata con l'edizione 2021 [https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi\\_2021/disciplinari-2021](https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale/Collezione-dpi/dpi_2021/disciplinari-2021)

### Impegno aggiuntivo 25 (Impiego del sistema Irrinet):

Nella edizione 2021 della Guida all'utilizzo di IrriNet si è dato maggior rilievo sull'importanza, ai fini della esecuzione del bilancio idrico, di:

- associare di tutti gli appezzamenti con IAF 25 all'azienda con il CUAA.
- aggiornare le colture prima dell'inizio della stagione irrigua inserendo una data di start relativa alla stagione irrigua corrente.

La versione attualmente caricata sul sito è stata aggiornata anche con un indice contenente i link per andare direttamente ai capitoli a cui si è interessati.

### ALTRE RACCOMANDAZIONI E VINCOLI

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

## PARTE SPECIFICA

## Colture Arboree

### MELO

#### Fase fenologica: accrescimento frutti

##### Difesa

**COLPO DI FUOCO** rischio infettivo per l'inizio di questa settimana BASSO. Soprattutto in caso di comparsa di secondi fiori si possono utilizzare prodotti a base di BACILLUS SUBTILIS o BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS o AUREOBASIDIUM PULLULANS o eseguire interventi preventivi con: ACIBENZOLAR-S-METILE (Bion, induttore di resistenza, max 6 trattamenti)

**TICCHIOLATURA** In presenza d'infezione in campo si consiglia di ripristinare la copertura con PRODOTTI RAMEICI, eventualmente in miscela con olio di arancio o zolfo, oppure bicarbonato di potassio. Si comunica che PREV-AM PLUS (n° reg. 16379), con decreto del 25 marzo 2021, ha ottenuto l'estensione d'impiego contro la Ticchiolatura per , Melo e Cotogno.

**OIDIO:** intervenire in caso di presenza con ZOLFO .

**CARPOCAPSA** sfarfallamenti adulti I generazione 94-98%, presenza adulti in calo. Ovodeposizione 67-81%. Nascita larvale 36-56%. Al superamento soglia, 2 catture per trappola in 1-2 settimane non vincolante per le aziende che applicano i metodi della Confusione o della Distrazione sessuale, intervenire con CARPOVIRUSINE o SPINOSAD (max 3)

**EULIA:** sfarfallamenti adulti II generazione iniziati sabato nelle aree più calde. Presenza residua di uova che stanno schiudendo, nel fine settimana riprenderà l'ovodeposizione. Presenti larve che stanno impupandosi.

**PANDEMIS:** sfarfallamenti adulti di I generazione 3-10%. Sta iniziando l'ovodeposizione. Presenti soprattutto larve negli ultimi stadi di sviluppo che stanno impupandosi.

**CIMICE ASIATICA:** i catturano adulti della nuova generazione. Presenze rilevate nei frutteti, anche a livelli elevati, con danni visibili su frutti. Si consiglia di monitorare i frutteti ed eseguire interventi specifici, eventualmente localizzati ai bordi del frutteto, con PIRETRO NATURALE

I dati delle catture delle trappole installate sul territorio della Regione Emilia Romagna si possono da oggi visualizzare su questo sito web <https://big.csr.unibo.it/projects/cimice/monitoring.php>

Settimana 12 luglio – 18 luglio 2021

I dati raccolti dalla rete di monitoraggio mostrano come la presenza di adulti e ninfe sia in aumento rispetto alla settimana precedente, è invece ancora in calo la presenza di neanidi. Dalle prossime settimane è atteso un progressivo incremento delle ovodeposizioni. Nelle prime due settimane di luglio le catture medie di esemplari di H. halys per trappola sono simili o leggermente superiori a quelle registrate nel 2020. Si ricorda di verificare l'effettiva presenza di infestazioni negli appezzamenti con produzione attraverso monitoraggi attivi (ispezioni visive e frappe), ponendo particolare attenzione alle zone perimetrali dei frutteti e alla parte alta delle piante.

Michele Preti & Giacomo Vaccari

### PERO

#### Fase fenologica: accrescimento frutti - raccolta Morettini

##### Difesa

**COLPO DI FUOCO** rischio infettivo per l'inizio di questa settimana BASSO. Soprattutto in caso di comparsa di secondi fiori si possono utilizzare prodotti a base di BACILLUS SUBTILIS o BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS o AUREOBASIDIUM PULLULANS o eseguire interventi preventivi con: ACIBENZO METILE (Bion, induttore di resistenza, max 6 trattamenti)

**TICCHIOLATURA** Si consiglia di ripristinare la copertura in presenza d'infezione in campo con: PRODOTTI RAMEICI, eventualmente in miscela

con olio di arancio o zolfo, oppure bicarbonato di potassio. Si comunica che PREV-AM PLUS (n° reg. 16379), con decreto del 25 marzo 2021, ha ottenuto l'estensione d'impiego contro la Ticchiolatura per Pero, Melo e Cotogno.

**CARPOCAPSA**: sfarfallamenti adulti I generazione 94-98%, presenza adulti in calo. Ovodeposizione 67-81%. Nascita larvale 36-56%. Al superamento soglia, 2 catture per trappola in 1-2 settimane non vincolante per le aziende che applicano i metodi della Confusione o della Distrazione sessuale, intervenire con CARPOVIRUSINE o SPINOSAD (max 3)

**EULIA**: sfarfallamenti adulti II generazione iniziati sabato nelle aree più calde. Presenza residua di uova che stanno schiudendo, nel fine settimana riprenderà l'ovodeposizione. Presenti larve che stanno impupandosi.

**PANDEMIS**: sfarfallamenti adulti di I generazione 3-10%. Sta iniziando l'ovodeposizione. Presenti soprattutto larve negli ultimi stadi di sviluppo che stanno impupandosi.

**PSILLA DEL PERO**: In presenza di consistente deposizione di uova intervenire con OLIO MINERALE o BICARBONATO DI POTASSIO.

**TINGIDE**: si segna la presenza. In assenza di ausiliari, intervenire con PIRETRINE NATURALI, eventualmente in miscela ad OLIO MINERALE

**CIMICE ASIATICA**: si catturano adulti della nuova generazione. Presenze rilevate nei frutteti, anche a livelli elevati, con danni visibili su frutti. Si consiglia di monitorare i frutteti ed eseguire interventi specifici, eventualmente localizzati ai bordi del frutteto, con PIRETRO NATURALE

I dati delle catture delle trappole installate sul territorio della Regione Emilia Romagna si possono da oggi visualizzare su questo sito web <https://big.csr.unibo.it/projects/cimice/monitoring.php>

Settimana 12 luglio – 18 luglio 2021

I dati raccolti dalla rete di monitoraggio mostrano come la presenza di adulti e ninfe sia in aumento rispetto alla settimana precedente, è invece ancora in calo la presenza di neanidi. Dalle prossime settimane è atteso un progressivo incremento delle ovodeposizioni. Nelle prime due settimane di luglio le catture medie di esemplari di *H. halys* per trappola sono simili o leggermente superiori a quelle registrate nel 2020. Si ricorda di verificare l'effettiva presenza di infestazioni negli appezzamenti con produzione attraverso monitoraggi attivi (ispezioni visive e frappe), ponendo particolare attenzione alle zone perimetrali dei frutteti e alla parte alta delle piante.

Michele Preti & Giacomo Vaccari

## PESCO

Fase fenologica: accrescimento frutti - raccolta

---

### Difesa

**OIDIO** intervenire dalla fase di scamicatura con ZOLFO o POLISOLFURO di CALCIO o OLIO ESSENZIALE di ARANCIO DOLCE

**CIDIA MOLESTA** Al superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana intervenire con: BACILLUS THURINGIENSIS o SPINOSAD (max 3, attivo anche per forficule)

**ANARSIA**: gli sfarfallamenti degli adulti di prima generazione stanno terminando, presenza adulti in calo. Ovodeposizione 68-85%. Nascita larvale 29-52%. Solo nel caso del superamento della soglia di 7 catture per trappola per settimana o 10 catture per trappola in 2 settimane, intervenire dopo circa una settimana dal superamento della soglia (ovvero alla nascita larvale) impiegando SPINOSAD (Max 3) oppure BACILLUS THURINGIENSIS

## SUSINO

Fase fenologica: Susino: accrescimento frutti - raccolta

---

### Difesa

**CIDIA FUNEBRANA** Farfallamenti adulti II gen. iniziata nelle aree più calde. Ovodeposizione terminata ma riprenderà a breve. Presenti larve di tutte le età, prevalentemente negli ultimi stadi di sviluppo.

Sostituire fondi e feromoni nella trappole da monitoraggio.

Al superamento della soglia di 10 catture per trappola intervenire con SPINOSAD (max 3)

## VITE

**Fase fenologica: chiusura grappolo - inizio invaiatura cv bianche precoci**

---

### Difesa

**PERONOSPORA:** il modello segnala che la germinazione delle oospore è tra 62 e il 94%. Non ci sono famiglie di oospore germinate pronte ad intercettare piogge nei prossimi 2-3giorni. Ci sono famiglie in maturazione che potrebbero intercettare eventuali piogge nel fine settimana.

La situazione di campo è sostanzialmente buona, con poche infezioni, per lo più accompagnate da scarsa sporulazione. Si invita comunque a mantenere protetta la vegetazione anticipando possibili piogge intervenendo con PRODOTTI RAMEICI

**OIDIO:** è terminata la fase di rischio di infezioni primarie, l'andamento stagionale è favorevole ad uno sviluppo epidemico della malattia. incremento delle infezioni e dei sintomi rilevati in campo. Nelle aziende colpite nell'anno precedente e sulle varietà sensibili valutare in base all'andamento meteo la necessità di un intervento preferibilmente con ZOLFO

**MAL DELL'ESCA:** incremento dei sintomi verificati in campo e dei colpi apoplettici

**BOTRITE:** sono presenti i primi focolai, soprattutto laddove si sia intervenuti con abbondanti irrigazioni. Con l'avvicinarsi della fase di invaiatura, si consiglia, sui vitigni più sensibili, di intervenire con AUREOBASIDIUM PULLULANS o BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS BACILLUS SUBTILIS O BICARBONATO DI POTASSIO o CEREVISANE o EUGENIOLO + GERANIOLO + TIMOLO (max 4) o PYTHOMYCEA OLIGANDRUM

**COCCINIGLIE:** in aumento la presenza delle forme giovanili.

Si consiglia di monitorare attentamente la situazione aziendale . In caso di consistenti infestazioni di cocciniglie farinose è possibile ricorrere alla lotta biologica attraverso lanci del parassitoide Anagrus pseudococci.

**TIGNOLETTA:** sfarfallamenti adulti II gen. 0-3%. Ovodeposizione 94-98%. Nascita larvale 83-90%. In settimana inizierà anche l'ovodeposizione degli adulti di II generazione.

Al superamento soglia (presenza uova o fori di penetrazione nei vigneti solitamente infestati, 5% di grappoli con uova negli altri casi) intervenire dalla prossima settimana con SPINOSAD (max 3 ) o BACILLUS THURINGENSIS .

**SCAFOIDEO:** Proseguono i ritrovamenti degli adulti in campo.

Sono state pubblicate le date per gli interventi obbligatori per la lotta allo Scafoideo. In agricoltura biologica il primo intervento sarà da farsi tra il 15 e il 25 giugno, ribattendolo a distanza di 7-10 giorni.

Per info (locandina):

<https://www.fitosanitario.mo.it/fito3/news/locandina-trattamenti-scafoideus-2021/>

In aumento la presenza di sintomi di FLAVESCENTZA DORATA

Trattamenti insetticidi obbligatori

Nel 2021 nelle aree viticole delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dovranno essere effettuati interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo, come indicato nella Determinazione del Servizio fitosanitario regionale n. 8073 del 10/05/2019. Anche in conseguenza dell'aumento della pressione del vettore e della malattia riscontrato in certe aree attraverso il monitoraggio territoriale effettuato nel corso del 2020, si prevedono i seguenti obblighi:

Sono obbligatori 2 trattamenti:

- nelle aree vitate delle province di Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente alla zona focolaio del comune di Argenta) e Forlì-Cesena (limitatamente alla zona focolaio dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio)

- nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata al di fuori delle "zone focolaio" e delle "zone di insediamento" e, in presenza di piante sintomatiche, nei comuni di Cervia e Ravenna

Nelle aziende viticole a conduzione biologica delle suddette aree è obbligatoria l'esecuzione di almeno 2 trattamenti insetticidi.

La lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus* dovrà essere attuata secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata Determinazione a partire dal 15 giugno 2021 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalcato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura; il primo trattamento o l'unico dovrà comunque essere realizzato entro e non oltre il 15 luglio 2021. Nei vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti, questi dovranno comunque essere effettuati nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 10 agosto 2021.

Nella tabella è riportato l'elenco degli insetticidi impiegabili sulla vite per la lotta allo *Scaphoideus titanus* nella quale sono evidenziati esclusivamente i prodotti raccomandati da questo Servizio per i vigneti a conduzione biologica:

- sostanze attive per l'agricoltura biologica (Reg. CE 834/2007, CE 889/2008, UE 354/2014, UE 673/2016, UE 1584/2018, UE 2164/2019).

Si precisa che le aziende viticole che non rientrano nel campo applicativo dei provvedimenti sopra evidenziati, possono utilizzare anche altri insetticidi autorizzati per la lotta alle cicaline/cicadellidi della vite.

Sostanze attive contro lo scafoideo raccomandate dal Servizio Fitosanitario per i vigneti a conduzione biologica (\*)

Pietrine pure

Olio essenziale di arancio dolce

Sali potassici degli acidi grassi

(\*) si precisa che le aziende a conduzione biologica possono utilizzare anche gli altri insetticidi autorizzati in agricoltura biologica per la lotta a scafoideo o alle cicaline/cicadellidi della vite.

Strategia di intervento

Sulla base dei rilievi effettuati sulle forme giovanili di *S. titanus*, fatto salvo quanto sopra riportato, i momenti per la realizzazione degli interventi insetticidi sono i seguenti:

Aziende biologiche e aziende che impiegano prodotti a base di sostanze attive ammesse in agricoltura biologica

Eseguire il primo trattamento nel periodo che va dal 15 al 25 giugno 2021 e il secondo dopo 7-10 giorni. Si raccomanda di eseguire i trattamenti nelle ore serali. Questo accorgimento è fondamentale per una buona efficacia del trattamento. Nei vigneti ubicati nelle zone focolaio o nei quali è stata riscontrata una presenza significativa di scafoideo si consiglia l'esecuzione di un terzo trattamento. In questo caso eseguire i 3 trattamenti con un intervallo di 7-10 giorni l'uno dall'altro.

Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore serali quando l'attività dei pronubi è limitata o assente.

Si sottolinea che sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi o altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. Tali trattamenti sono inoltre vietati in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi (L.R. n. 2/2019).

## Colture Erbacee

### BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Fase fenologica: pre emergenza

### **Controllo infestanti.**

Strigliatura: si ricorda che è estremamente importante gestire la presenza di malerbe in campo già dalle prime fasi di sviluppo della coltura, fasi nelle quali le infestanti si presentano poco sviluppate e con apparato radicale superficiale. Si consiglia quindi di effettuare una sarchiatura leggera dell'interfila o strigliatura. Il numero di interventi meccanici di gestione delle malerbe da programmare fino alla fase di chiusura può variare da 2 fino a 4-5 a seconda della presenza di infestanti.

Per ulteriori approfondimenti consultare i bollettini tecnici BIO per la coltivazione delle bietole di COPROB.

---

seguito delle recenti disposizioni degli organi Ministeriali, DPCM del 23.02.2020 e successivi fino al DPCM del 04.03.2020, e dell'ordinanza della regione Emilia Romagna contenente le misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, si comunica che le riunioni di produzione integrata e biologica in tutte le province dell'Emilia-Romagna sono sospese.

Si intendono sospesi anche gli approfondimenti biologici (Focus Bio) previsti fino a data da definirsi.

Secondo le modalità di smart working, promosse ed incentivate a livello pubblico e privato, gli incontri provinciali verranno organizzati fino a nuove disposizioni, tramite connessione da remoto

**ATTENZIONE PROSSIMO INCONTRO LUNEDÌ 26 LUGLIO ore 11.00 piattaforma Lifesize stanza 322655**

**aggiornamento bollettino tecnico**

**INVITIAMO TUTTI GLI UTENTI DEL BOLLETTINO A REGISTRARSI POICHE' E' SOSPESA LA SPEDIZIONE DEL BOLLETTINO MAILING LIST**

**LA REGISTRAZIONE VA FATTA** al seguente link <http://bollettini.crpv.it/>

Questo ulteriore sistema di divulgazione, sviluppato nell'ambito del progetto INTERBIO (CIG DERIVATO: 7225307FF1), permette di adeguare il bollettino alle esigenze del singolo, andando a selezionare i contenuti secondo criteri personalizzabili. Durante la registrazione potrete scegliere: la provincia, le colture e il sistema di coltivazione (biologico e/o integrato) per cui volete ricevere il Bollettino. Questo vi consentirà di ricevere regolarmente le sole parti del Bollettino da voi selezionate (versione personalizzata) o nel suo intero se la selezione verrà fatta per tutte le colture e sistemi di coltivazione della provincia. Il bollettino verrà inviato all'indirizzo di posta indicato e potrete altresì visionare l'archivio di tutti i vostri bollettini nella pagina di utente registrato.

Le versioni integrali dei Bollettini di produzione integrata e biologica della Regione Emilia-Romagna saranno comunque sempre disponibili nel sito dedicato della Regione Emilia Romagna <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/bollettini/bollettini-di-produzione-integrata-e-biologica-2021/bollettino-regionale-di-produzione-biologica>

Redazione a cura di: Redazione a cura di: Fornaciari Massimo e Vaccari Giacomo

Chi fosse interessato a ricevere il Bollettino può farne richiesta a

**[bollettino-mo@fitosanitario.mo.it](mailto:bollettino-mo@fitosanitario.mo.it)**