

















































SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bollettino N° 17 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 17 aprile 2023

Meteo

	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun
Bologna	 17° 9°	 20° 9°	 22° 8°	 21° 9°	 21° 10°	 23° 12°	 22° 12°	 21° 11°
Ravenna	 16° 9°	 18° 8°	 18° 9°	 18° 10°	 18° 10°	 19° 11°	 21° 11°	 18° 10°
Ferrara	 19° 8°	 21° 9°	 22° 10°	 20° 10°	 21° 9°	 23° 11°	 22° 12°	 20° 10°
Forlì-Cesena	 12° 7°	 14° 6°	 17° 8°	 17° 7°	 17° 7°	 20° 9°	 20° 9°	 16° 9°
Rimini	 15° 11°	 16° 9°	 17° 10°	 18° 9°	 17° 9°	 18° 11°	 20° 12°	 17° 11°
Modena	 18° 10°	 21° 9°	 22° 8°	 20° 11°	 20° 11°	 22° 12°	 22° 12°	 21° 12°

Periodo perturbato turbazione con piogge frequenti soprattutto nella Romagna che si protrarrà almeno fino a metà della prossima settimana. Temperatura minima di 8-12 in rialzo e Temperatura massima di 14-20°C.

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Ticchiolatura melo e pero

Peronospora cipolla

Nerume delle drupacee

Maculatura rossa albicocco

Cancri rameali del pesco

Septoria del grano

Maculatura rossa delle drupacee

Peronospora della vite

Oidio della Vite

Albicocco

Accrescimento frutti

Nerume

Le infezioni possono verificarsi in condizioni termiche da 10 a 30°C (optimum di 20-25°C), e bagnature superiori a 12 ore. Alto rischio sporulazione in caso di bagnature prolungate e nebbie persistenti

Rischio infettivo: MEDIO-ALTO

Maculatura rossa

Raggiunte le condizioni per il rilascio delle ascospore di *Apiognomonina erythrostoma* agente della maculatura rossa dell'albicocco. Eventuali piogge devono considerarsi infettanti.

A partire dalla fase di scamicatura rischio infettivo in caso di pioggia: MEDIO-BASSO

Pesco

Ingrossamento frutti

Nerume

Le infezioni possono verificarsi in condizioni termiche da 10 a 30°C (optimum di 20-25°C), e bagnature superiori a 12 ore. Alto rischio sporulazione in caso di bagnature prolungate e nebbie persistenti

Rischio infettivo: MEDIO-ALTO

Cancri rameali *Phomopsis amygdali*

Temperatura per questa settimana non limitante. La gravità della sporulazione di *P. amygdali* è in funzione della bagnatura fogliare. Tanto più prolungata quanto più abbondante è la sporulazione.

Rischio di sporulazione in caso di pioggia: ALTO

Melo

fine fioritura - allegagione

Ticchiolatura

Comparsi a Ravenna i primi sintomi dell'infezione del 20 marzo

Ascospore rilevate nella pioggia del 13-14 aprile

CF Mo: 42 ascospore

CAP Ravenna: 204 ascospore

Maturazione delle prime ascospore: **72-86%** delle ascospore mature per le province di Ravenna (prossima al mare) e Ferrara prossimo alla costa. **45-70%** delle ascospore mature mediamente per la provincia di Bologna e Modena.

Percentuale di ascospore disponibili al momento per essere rilasciate in caso di pioggia: **10%**

Rischio infettivo in presenza di pioggia: MEDIO

Elaborazione su dati reali dell'infezione del 13-14 aprile

Infezioni Fusignano

Infezione	Pioggia	bagnatura (h)	T. med (°C)	Gravità	fine incubazione
15 marzo	8,5	15	10,3	Leggera	31/3 – 4/4
20 marzo	10,7	33	10,9	Grave	4/4 - 9/4
26-27aprile	12,3	13	8,4	Nulla	-
2-3 aprile	16,7	21	8,8	Media	18/4 – 24/4
8 aprile	1,2	12	8	Nulla	-
13-14 aprile	2,2	11	8	Nulla	-

Infezioni S.Alberto

Infezione	Pioggia	bagnatura (h)	T. med (°C)	gravità	Incubazione
15 marzo	0,6	9	10,3	nulla	
19-20 marzo	9	35	10,8	Grave	4/4 - 9/4
26-27aprile	10,4	16	9	Leggera	12/4 – 17/4
2-3 aprile	-				

8 aprile	-				
13-14 aprile	6,9	10	8,5	Nulla	-

Infezioni San Bartolomeo

Infezione	Pioggia	bagnatura (h)	T. med (°C)	Gravità	Incubazione
15 marzo	6	17	8,8	leggera	31/3 – 4/4
20 marzo	13,4	32	11,2	Grave	4/4 - 9/4
26-27aprile	7	16	8,4	Leggera	12/4 – 17/4
2-3 aprile	2,3	19	8,8	Leggera	18/4 – 24/4
8 aprile	2,4	5	12	Nulla	-
13-14 aprile	10,8	20	8,8	Media	1 – 5 maggio

Infezioni Malborghetto

Infezione	Pioggia	bagnatura (h)	T. med (°C)	gravità	Incubazione
15 marzo	2,6	8	10,5	nulla	
20 marzo	5,1	17	11	leggera	4/4 - 9/4
26-27aprile	8,8	17	8,6	leggera	12/4 – 17/4
2-3 aprile	1,2	24	10,9	Media	18/4 – 24/4
8 aprile	0,2	4	12,5	Nulla	-
13-14 aprile	26,1	30	10,3	Grave	1 – 5 maggio

Infezioni Malalbergo

Infezione	Pioggia	bagnatura (h)	T. med (°C)	Gravità	Incubazione
15 marzo	2,2	6	11,3	nulla	
20 marzo	10,1	31	11,3	Grave	4/4 - 9/4
26-27aprile	7,2	16	8,6	Leggera	12/4 – 17/4
2-3 aprile	7,7	25	10.1	Media	18/4 – 24/4
8 aprile	0.9	6	12	Nulla	-
13-14 aprile	6,9	32	10,7	Grave	1 – 5 maggio

Pero

Allegazione

Ticchiolatura.

Ascospore rilasciate:

CF Modena: 18 ascospore

CAP Ravenna: 1200 ascospore

La maggior parte (circa il 60%) del potenziale di inoculo di *V. pyrina* viene rilasciato nel periodo della fioritura

RISCHIO INFETTIVO per le prossime piogge MEDIO-BASSO

Maculatura bruna

Prevedere durante la potatura di asportare i rami dell'anno precedente colpiti da infezioni.

Nelle situazioni di forte presenza della malattia nell'anno precedente va valutata la possibilità di eseguire la lavorazione del cotico erboso

Stemphylium vesicarium

Nessuna cattura

Si prevede qualche minima cattura, non significativa, dopo le piogge di questo fine settimana

Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)


Le infezioni fiorali di colpo di fuoco batterico avvengono per la contemporanea presenza di tre fattori:

- la presenza di fiori aperti (tanto più alta la quantità di fiori aperti, maggiore il rischio)
- Il potenziale di sviluppo del batterio (influenzato dalla temperatura)
- La pioggia per veicolare il batterio all'interno degli organi fiorali.

La temperatura media non è ancora ottimale (15,5°C) per lo sviluppo di *Erwinia amylovora* il cui sviluppo si sviluppa accumulando gradi giorno con temperatura superiore ai 15°C

Soglia di intervento pari a livello MEDIO in funzione della presenza di focolai pregressi di colpo di fuoco.

Presenza potenziale del patogeno	Livello di rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO	ESTREMO
Nessun focolaio nell'area l'anno passato	0 - 200	200 - 270	270 - 430	> 430
Presenza di focolai nel frutteto o in quelli vicini l'anno passato	0 - 110	110 - 200	200 - 270	> 270
Cancri al momento attivi nel frutteto o in quelli vicini	0 - 30	30 - 110	110 - 200	> 200



Rischio infettivo attuale in presenza di fiori aperti: BASSO

NOCE

Emissione degli amenti- Inizio emissione infiorescenza femminile

Batteriosi del noce: Rischio infettivo MEDIO-BASSO

ACTINIDIA


Germogliamento – Bottoni fiorali

PSA

Potenziale di raddoppiamento batterico in aumento.

Rischio infettivo in presenza di pioggia: Nullo <20; Basso (20-40); Medio (40 – 60); Elevato >60

Rischio infettivo al 15 aprile: MEDIO-BASSO




VITE

Germogliamento – grappolini visibili

Peronospora

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]


Sulle foglie (fraz.): data 18/04/2023



Aree dove le zoospore potrebbero intercettare la pioggia imminente per causare infezione.

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]


Germinate (fraz.): data 18/04/2023



Aree dove famiglie di oospore hanno terminato la fase di germinazione e stanno producendo zoospore in grado di intercettare probabilmente le piogge a partire da giovedì

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

In germinazione (90 – 100) (fraz.): data 18/04/2023



Aree nelle quali le oospore sono fra il 90 e 100% della fase di germinazione e potrebbero eventualmente intercettare le piogge eventuali da giovedì al fine settimana

Rischio infettivo MEDIO per le province di Rimini, Forlì, Ravenna Ferrara

Oidio

Il potenziale di inoculo ascosporico va dal 27 al 46 % di maturazione nella pedecollina.

Con le prossime piogge possono originarsi infezioni di oidio primarie. Il rilascio ascosporico e le conseguenti infezioni prendono avvio con piogge > 2,5 mm e temperatura >10°C.

Il potenziale ascosporico maturo e da rilasciare alle prossime piogge è pari al 6-8%

Rischio infettivo in caso di pioggia: BASSO

Cipolla

Autunnale: da 5°- 6° foglia a ingrossamento bulbo

Primaverile: : Da Emergenza a 1-2 fogliw

Botrite

Condizioni ottimali per le infezioni sono 7 ore di bagnatura a 15-20°C. Infezioni gravi avvengono con bagnature prolungate fino a 24 ore e T fra 9 e 26°C.

Rischio infettivo BASSO

Peronospora

Segnalata la comparsa dei primi sintomi di peronospora

Suscettibilità fenologica avviene allo stadio di 4-5° foglia

Le spore si producono di notte da 4 a 25°C (Temperatura ottimale 13°C) e alta UR. Le spore vengono rilasciate durante il giorno e rimangono vitali per almeno 4 giorni. Germinano da 7 a 16°C in presenza di acqua libera.

Rischio infettivo in presenza di pioggia: ALTO

Aglio

4-5 foglie vere

Ruggine

Le condizioni climatiche ottimali per la germinazione delle spore di ruggine (16°C) in un range da 12 a 21°C.

Rischio infettivo in presenza di pioggia: MEDIO-ALTO

Frumento

Da Levata a foglia bandiera

Ruggine gialla

Condizioni per l'infezione: prolungata bagnatura e Temperature ottimali di 12-20°C. Nulla sotto 8°C e sopra 23°. La pressione infettiva è in crescita nelle aree costiere delle provincie di Ravenna e Ferrara

Pressione infettiva attuale: MEDIA

Septoria

Malattia ancora ferma sulla quintultima – quartultima foglia.

Si ricorda che i trattamenti fungicidi con prodotti chimici di sintesi in fase di accostamento non sono posizionati correttamente per il contenimento della malattia. In assenza di modelli previsionali, il momento migliore per l'intervento è dopo la terza pioggia infettante a partire dall'accostamento e in previsione della quarta. In alternativa intervenire alla fine della levata. Mediamente dalla fase di accostamento vi sono stati tre eventi piovosi infettivi.

in previsione di pioggia il rischio infettivo sarebbe concreto.

Pressione infettiva MEDIA-ALTA

Oidio

Pressione infettiva BASSA