

**SERVIZIO FITOSANITARIO  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Bollettino N°59 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI**

Situazione fitosanitaria al 25 agosto 2023

Meteo

Bologna	ven  39° 23°	sab  38° 21°	dom  32° 19°	lun  22° 15°	mar  21° 14°	mer  24° 14°	gio  26° 15°	ven  28° 16°
Ravenna	ven  35° 23°	sab  37° 22°	dom  33° 21°	lun  26° 16°	mar  22° 16°	mer  23° 14°	gio  26° 16°	ven  27° 16°
Ferrara	ven  39° 21°	sab  38° 21°	dom  32° 19°	lun  24° 16°	mar  21° 14°	mer  24° 14°	gio  27° 14°	ven  28° 16°
Forlì-Cesena	ven  38° 24°	sab  38° 22°	dom  36° 20°	lun  26° 15°	mar  21° 14°	mer  24° 13°	gio  27° 14°	ven  28° 16°
Rimini	ven  33° 23°	sab  35° 22°	dom  34° 22°	lun  27° 16°	mar  21° 16°	mer  22° 16°	gio  25° 16°	ven  26° 17°
Modena	ven  39° 21°	sab  38° 21°	dom  31° 18°	lun  21° 15°	mar  21° 14°	mer  24° 13°	gio  26° 14°	ven  28° 16°

Periodo di bassa pressione in arrivo nella giornate fra domenica e lunedì della prossima settimana che perdurerà per 4 giorni circa con temporali e piogge intense sparse e abbassamento repentino della temperatura.

**Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:**

Maculatura bruna del pero

Peronospora e pomodoro

Brusone del riso

**Pero**

**Maculatura bruna**

Nelle situazioni di forte presenza della malattia nell'anno precedente va valutata la possibilità di eseguire la lavorazione o di applicare Trichoderma al cotico erboso

***Stemphylium vesicarium***

CFMORE:

14-ago	1
15-ago	3
16-ago	4
17-ago	16
18-ago	12
19-ago	5
20-ago	12

Bologna

07-ago	0
08-ago	21
09-ago	12
10-ago	8
11-ago	3
12-ago	1
13-ago	4
14-ago	0

Ferrara

07-ago	7
08-ago	10
09-ago	12
10-ago	2
11-ago	2
12-ago	0
13-ago	7
14-ago	0


I conidi vengono rilasciati dopo la pioggia allorquando cessa il periodo di bagnatura e con maggiore frequenza durante le ore mediana della giornata. L'infettività dei conidi rimane pressoché totale nei primi due giorni dalla pioggia, si riduce del 50% dal terzo Conidi di *Stemphylium vesicarium*: i conidi eventualmente prodottisi si liberano allorquando la bagnatura termina al 5 giorno e si annulla a partire dal sesto giorno.

**Rischio infettivo** Nullo <0,2; Basso (0,2-0,4); Medio (0,4 – 0,6); Elevato >0,6

**Rischio Infettivo: BASSO**

**PERO, Maculatura bruna [Maculatura Bruna – BSP Cast]**


Indice di rischio infettivo (n.): data 26/08/2023




**Rischio di sporulazione attuale: ALTO dopo le piogge del 27-28 agosto.**

**Rischio complessivo: BASSO fino al 26 agosto. Previsto ALTO dopo le piogge del 27 agosto**


### Copparo 2023




### San Bartolomeo 2023




### Finale Emilia 2023




### Alfonsine 2023



### Bomporto 2023



### Cento 2023




## Pomodoro

Peronospora Pomodoro

Soglia di pressione infettiva al di sopra della quale è raccomandata il ripristino della copertura fungicida:  
2,56

### POMODORO, Peronospora del pomodoro – potenziale infettivo [IPI]

Indice cumulato 7gg (n.): data 25/08/2023



**Pressione infettiva: BASSA**

## Riso

Da spigatura a maturazione

### Brusone

scarsi sintomi fogliari

**Sporulazione: BASSA**

07-ago	0
08-ago	0
09-ago	0
10-ago	0
11-ago	0
12-ago	0
13-ago	0
14-ago	0

**Rischio infettivo: MEDIO-BASSO fino al 27 agosto. ALTO il 28-29 agosto**