

**DEROGHE TERRITORIALI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA  
ANNO 2012**

Prot. N° 01286669

Bologna, 23 maggio 2012

**Oggetto:** Reg. CE n. 1698/05; n. 1234/2007, LLRR n. 28/98 e 28/99 – Integrazione alle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti. Autorizzazione all'impiego di nuovi prodotti fitosanitari e ulteriori modifiche

Nell'ambito dei programmi di difesa integrata previsti in applicazione del Reg. CE n. 1698/05; n. 1234/2007, LLRR n. 28/98 e 28/99, e a seguito del parere espresso dal Gruppo Nazionale Difesa Integrata in data 15 maggio 2012 e della nota del MiPAFF n. 10971 del 21/5/2012, si autorizza l'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato n. 1 alla presente nota.

Si precisa inoltre che, a causa di un errore nella compilazione dei disciplinari 2012, nella tabella del diserbo della vite è stata inserita erroneamente una nota 3 nell'ultima riga che deve essere rimossa. Nell'allegato n. 2 alla presente nota si riporta quindi la versione corretta delle note tecniche per il diserbo della vite.

INTEGRAZIONI ALLE NORME GENERALI - NORME COMUNI DI COLTURA

Punto N) Utilizzo Prodotti in fase di revoca del capitolo  
n. 15. (DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI)

La seconda tabella, relativa alle sostanze revocate, viene sostituita dalla frase e dalla tabella sotto riportata:  
"Sono stati emessi provvedimenti per la limitazione di alcuni campi di impiego delle sostanze attive riportate nella tabella seguente. Relativamente alle modalità per lo smaltimento delle scorte e per le date ufficiali per l'entrata in vigore dei diversi provvedimenti si raccomanda di seguire con attenzione i decreti del competente Ministero della Salute."

<b>Sostanza attiva</b>	<b>Limitazioni di impiego</b>
q <b>Azadiractina</b>	<b>solo come insetticida e non come nematocida</b>
q <b>Fluazifop-p-butyle</b>	<b>solo sulle colture frutticole</b>
q <b>Fenbutatin ossido</b>	<b>solo su colture ornamentali in coltura protetta</b>
q <b>Bitertanolo</b>	<b>solo per la concia delle sementi</b>
q <b>Cletodim</b>	<b>solo su bietola</b>
q <b>Fenazaquin</b>	<b>impiegabile solo sulle colture ornamentali</b>
q <b>Acrinatrina</b>	<b>riduzione della dose di s.a. impiegabile</b>
q <b>Procloraz</b>	<b>riduzione della dose di s.a. impiegabile</b>
q <b>Polisolfuro di Ca</b>	<b>utilizzabile solo come fungicida</b>

### INTEGRAZIONI ALLE NORME DI COLTURA

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Indivia riccia e scarola, radicchio, cicoria, cicorino, dolcetta, rucola, foglie e germogli di brassica			Ametoctradina + Dimetomorf	Impiegabile solo su lattuga e non sul gruppo delle lattughe come erroneamente indicato nella modifica dello scorso febbraio
Spinacio in coltura protetta			Metam Na e Metam K	
Melo, Pero, Pesco, Pomodoro (pc e cp), Melanzana (pc e cp)	Panonychus ulmi e Tetranychus urticae	Acequinocyl		Nei limiti e in alternativa agli altri acaricidi previsti nelle norme di coltura
Cavoli rapa	Diserbo	Piridate		
Cavoli a infiorescenza	Diserbo	Piridate		
Cavoli a testa	Diserbo	Piridate		
Cavoli a foglia	Diserbo		Piridate	
Fagiolino	Diserbo		Piridate	

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Melo, Pero	Cocciniglie e Cocciniglia di San Josè	Buprofezin		
Pesco, Albicocco	Cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) Cocciniglia di San Josè	Buprofezin		
Pesco	Cicaline	Buprofezin		
Ciliegio, Susino	Cocciniglia di San Josè	Buprofezin		Intervenire nella fase di bottoni rosa su larve di prima e di seconda età. Non impiegabile nel 2012
Vite	Cicaline (Empoasca vitis, Scaphoideus titanus)	Buprofezin		
Vite	Cocciniglie	Buprofezin		
Olivo	Cocciniglie (Saissetia oleae)	Buprofezin		Al massimo 1 intervento all'anno
Kiwi	Cocciniglie (Pseudolacaspis pentagona)	Buprofezin		Cocciniglie (Pseudolacaspis pentagona) intervenire preferibilmente alla migrazione della prima generazione dell'anno (maggio).
Colture protette: Pomodoro, Melanzana Lattuga, Cetriolo, Zucchini, Peperone	Aleurodidi	Buprofezin		

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Susino	Cydia funebrana	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Melone p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Zucca p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Zucchini p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Cetriolo p.c. e c.p.	Nottue fogliari	Emamectina		Al massimo 2 interventi all'anno
Ruola p.c. e c.p.	Peronospora e Alternaria	Metalaxyl-M		Al massimo 2 interventi per taglio
Foglie e germogli di brassica coltura protetta	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 1 intervento per taglio
Prezzemolo p.c. e c.p.	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 1 intervento per ciclo
Erbe fresche p.c. e c.p.	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 2 interventi per ciclo, indipendentemente dall'avversità
Basilico p.c. e c.p.	Peronospora	Metalaxyl-M		Al massimo 2 interventi per taglio

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Pomodoro coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum,)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
Peperone coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melanzana coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorumi)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Zucchini coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Fagiolino coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum,)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Fragola coltura protetta	Tetranychus urticae, Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum)	Spiromesifen		Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

Coltura	Avversità	Prodotto da inserire	Prodotto da escludere	Note
Cetriolo p.c. e c.p.	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i Qol (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb, Mandipropamide ecc.)
Zucchino p.c. e c.p.	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i Qol (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb, Mandipropamide ecc.)
Melone pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin + Dimetomorf		Al massimo 3 interventi all'anno e comunque nei limiti previsti per i Qol (es. Azoxystrobin) e per i CAA (es. Iprovalicarb, Mandipropamide ecc.)
Rucola p.c. e c.p.	Varie		Pyraclostrobin + Dimetomorf	
Zucchino pieno campo	Oidio	Quinoxifen + zolfo		Al massimo 3 interventi all'anno (verificare i tempi di carenza)
Girasole	Diserbo post emergenza	Tribenuron		Impiegabile solo su cvs resistenti

p.c. = pieno campo

c.p. = coltura protetta

Coltura	Prodotto da inserire o modificare	Epoca - Utilizzo	Concentrazione di s.a.	Dose ha kg.- l/ha	Limitazioni e Note
Vite, Melo, Pero, Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino	Pyraflufen-ethile	Spollonante o Sinergizzante	2,6 %	0,8 l/ha per trattamento, con il limite di 1,6 l/ha all'anno	Da usare in alternativa al Carfentrazone, nelle colture nelle quali è previsto l'impiego di tale prodotto
Patata	Pyraflufen-ethile	Dissecante in pre-raccolta	2,6 %	0,8 l/ha per trattamento, con il limite di 1,6 l/ha all'anno	