

## DEROGHE TERRITORIALI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA ANNO 2013

Prot. N° 0103958

Bologna, 26 aprile 2013

**Oggetto:** Reg. CE n. 1698/05; n. 1234/2007, LLRR n. 28/98 e 28/99 - Integrazione alle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti. Autorizzazione all'impiego di nuovi prodotti fitosanitari e ulteriori modifiche

Nell'ambito dei programmi di difesa integrata previsti in applicazione del Reg. CE n. 1698/05, del Reg. CE n. 1234/2007 e delle LL.RR. n. 28/98 e 28/99, e a seguito del parere espresso dal Gruppo Nazionale Difesa Integrata, in data 10/4/2013, e della nota del MiPAFF n. 7385 del 18/4/2013, si autorizza l'impiego dei prodotti fitosanitari e delle modifiche riportate negli allegati n. 1 e 2 alla presente nota.

Si coglie inoltre l'occasione per precisare quanto segue:

- Diserbo di pre-emergenza del mais dolce: al momento non sono disponibili prodotti fitosanitari registrati e impiegabili in questa fase;
- Nella scelta dei prodotti commerciali dei prodotti fitosanitari è vincolante utilizzare formulazioni classificate come Xi (irritanti) o Nc (non classificate), quando della stessa s.a. sono disponibili in alternativa formulati classificati T, T+ o Corrosivi; inoltre devono essere preferite in modo vincolante le formulazioni classificate Xi (irritanti) o Nc (non classificate), quando della stessa s.a. sono disponibili in alternativa formulati classificati come Xn con una delle seguenti frasi di rischio, R40, R60, R61, R62, R63 e R68; nei rari casi in cui siano disponibili formulati classificati come Xn, ma senza le frasi di rischio precedentemente richiamate, non sono previste limitazioni particolari; si ricorda infine che occorre dare preferenza in modo vincolante ai prodotti commerciali classificati come Xi, Nc o Xn quando della stessa s.a. sono disponibili in alternativa formulati classificati T, T+ o Corrosivi;
- E' stata recentemente modificata l'etichetta dell'oxyfluorfen; con nota successiva provvederemo a dare comunicazione sulle modalità di smaltimento, nel frattempo si comunica quanto segue:
  - in tutte le colture nelle quali il prodotto è autorizzato, può essere utilizzato solo nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. con applicazioni in bande lungo la fila;
  - o sono stati revocati gli usi su cavolo, cipolla e aglio.

Bologna 26 aprile 2013

Allegato n: 1: Integrazione alle norme di difesa integrata della Regione Emilia-Romagna

Coltura/Scheda	Avversità	Sostanza attiva inserire	S.a da escludere o da limitare	Note e Limitazioni
Melo	Afidi, cocciniglia	Spyrotetramat		Inserire limitazione: impiegabile solo in post fioritura
Pesco	Maculatura batterica			Modificare denominazione avversità (Cancro o maculatura batterica) e il nome scientifico (inserendo il sinonimo X. arboricola pv. Pruni, che è quello presente in etichetta e utilizzato da EPPO)
Vite da vino e da tavola	Peronospora	Propineb		Aggiunto: Non ammesso in fioritura
Vite da vino	Escoriosi	Pyraclostrobin + Metiram		Contro questa avversità il Pyraclostrobin non è registrato da solo, ma insieme a Metiram
Fragola - Post impianto	Fitoftora		Metalxyl-M	Non autorizzato in questa fase
Cavoli a foglia	Mamestra		Indoxacarb	Non ammessa contro questa avversità, ammesso solo su <i>Pieris brassicae</i>
Basilico	Marciumi molli			Sostituire <i>Botrytis squamosa</i> (specifico per genere <i>Allium</i> ) con <i>B. cinerea</i> , generalmente associata al Basilico; inoltre è questa botrite che è normalmente indicata nelle etichette

Basilico	Tripidi	Deltametrina		Inserire in alternativa e nei limiti già previsti per piretroidi e deltametrina stessa
Sedano	Mosche		Teflutrin	Non autorizzato contro questa avversità
Melone	Peronospora		Ametoctradin + Dimetomorf	Da limitare solo al pieno campo
Pomodoro cp	Cladosporiosi	Propineb		Con i limiti dei ditiocarbammati
Pomodoro cp	Marciumi da Pythium		Propamocarb + Fosetyl al	Precisare che può essere utilizzato solo con impianti a goccia o con distribuzione localizzata
Bietola da foglie cp	Rhizoctonia	Tricoderma asperellum		
Cavolo rapa	Marciumi basali	Tricoderma asperellum		Autorizzato solo contro Rhizoctonia

Coltura/Scheda	Avversità	s.a. Inserire	s.a Escludere	Note e Limitazioni
Patata	Tignola	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a infiorescenza pieno campo (pc)	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a testa pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a foglia pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Pisello pc	Mamestra, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Fagiolo pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Fagiolino pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cipolla pc	Nottue, tripidi, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi

Scalognò pc	Tripidi, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Afidi, altica, nottue fogliari, atomaria, cassida, mamestra, cleono	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Mais	Nottue, diabrotica, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Mais dolce	Nottue, Afidi, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Erba medica	Apion, fitonoma	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Pomodoro pc	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Colza	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Patata	Tignola	Thiacloprid		Al massimo 1 intervento all'anno
Patata	Tignola	Lambdacialotrina		Nei limiti complessivi previsti per i Piretroidi
Patata	Peronospora	Almisulbron		Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide

Melone cp	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno. Solo in coltura protetta
Cocomero cp	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno. Solo in coltura protetta
Pesco	Bolla, batteriosi, corineo, fusicocco, cancro rameali	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Albicocco	Corineo, nerune, apiognomia, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Susino	Ruggine, Corineo, nerune delle drupacee, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Ciliegio	Corineo, nebbia o seccume delle drupacee, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Melo	Carpocapsa, Cydia molesta, Zeuzera pyrina	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita

Pero	Carpocapsa, Cydia molesta, Zeuzera pyrina	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Pesco	Cydia molesta	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Susino	Cydia funebrana	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno
Sorgo	Diserbo di pre emergenza	Terbutilazina (25%) + Pendimetalin (5,9%)		Alla dose di 2,5 l./ha
Pomodoro pc	Myzus persicae e Aphis gossipii	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana pc	Myzus persicae e Aphis gossipii	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Cicoria pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Radicchio pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia riccia pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia scarola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno

Dolcetta pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Rucola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Foglie e germogli pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Lattughino pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Pomodoro pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Peperone pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Spinacio e Spinacino pc e cp	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Albicocco e Pesco	Anarsia	Metoxifenzide		Al massimo 2 all'anno
Melo, Pero	Varie		Metoxifenzide	Limitare a 3 all'anno
Lattuga pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Cicoria pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno



Dolcetta pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Rucola pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Lattughino pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Erbe fresche pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Prezzemolo pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Bietole da foglia e da costa pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Basilico pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Spinacio pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 2 interventi all'anno
Sedano pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Finocchio pc	Nottue (Heliiothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Ciliegio	Rhagoletis cerasi	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi e comunque non più di 2 interventi con questa s.a.

Albicocco	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Susino	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Pesco	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Patata	Peronospora	Dimetomorf + Metiram		Nei limiti previsti con CAA e Ditiocarbammati sulla coltura
Pomodoro pc	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Pomodoro cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 3 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Lattuga	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Cetriolo pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Zucchino pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.

Melone pc	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Cocomero pc	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Pesco	Tripidi	Formetanate		Al massimo 1 intervento all'anno in alternativa e nel numero complessivo previsto per gli esteri fosforici
Patata	Antracnosi	Azoxystrobin		Nei limiti previsti per i QoI
Tutte le colture in cui è inserito	Patogeni tellurici		Metam Na e Metam K	La limitazione all'impiego una volta ogni tre anni, va rinviata al 31 dicembre 2014
Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	IBE		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	QoI		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Vite	Scafoideo	Buprofezin		Inserire alle condizioni previste per la coccinglia

Lattuga cp	Varie		Pencicuron	Revocato
Cavolo rapa e cavolo a foglia	Varie	Lambdacialotrina		In alternative e nei limiti previsti per i piretroidi
Colza	Diserbo post emergenza	Imazamox + Metazaclor		Per specifiche varietà autorizzate. 2 litri/ha con formulati con concentrazione della s.a. rispettivamente dell'1,6 e del 33,5% . Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
Fagiolo	Oidio	Azoxystrobin + Difeconazolo		Con il limite di 2 interventi all'anno. Inserire anche l'avversità
Pomodoro c.p.	Muffa grigia allo stelo	Imazalil		Per formulati spray eliminare vincolo dei 2 trattamenti all'anno
Fragola pre e post impianto, ripresa vegetativa e pre raccolta pieno campo	Vaiolatura	Dodina		

- **Integrazione per la difesa integrata delle colture ed il controllo integrato delle infestanti delle Colture da seme**

Coltura/Scheda	Avversità	s.a. Inserire	s.a Escludere	Note e Limitazioni
Cavoli a infiorescenza pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a testa pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a foglia pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cipolla pc	Nottue, tripidi, afidi,	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cetriolo pc e cp	Nottue fogliari, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Barbabietola	Afidi, altica, nottue fogliari, atomaria, cassida, mamestra, cleono	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Erba medica	Apion, fitonoma	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Lattuga pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno

Cicoria pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Radicchio pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia riccia pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Indivia scarola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Cicoria pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Prezzemolo pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Finocchio pc	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenzide		Al massimo 1 intervento all'anno
Lattuga	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.
Cetriolo pc e cp	Peronospora	Ametoctradina + Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i Ditiocarbammati sulla coltura.

Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	IBE		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Cavolo a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	QoI		Per colture con cicli superiori ai 120 gg, con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Cavolo rapa e cavolo a foglia	Varie	Lambdacialotrina		In alternative e nei limiti previsti per i piretroidi