



INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA DI DIFESA INTEGRATA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI - DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2024 - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Aprile 2024

Le indicazioni di seguito riportate integrano le norme tecniche di coltura di difesa integrata e di controllo delle infestanti approvate con la determinazione n. 3522 del 21 febbraio 2024

Tutte gli aggiornamenti per le colture sono da considerarsi validi anche per le rispettive colture da seme			
Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Decisione
DIFESA COLTURE FRUTTICOLE OLIVO E VITE			
Actinidia	Cimice asiatica	Piretrine	Inserita
Albicocco	Monilia (<i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	Pyrimethanil	Inserita in alternativa a Cyprodinil
Albicocco	Cimice asiatica	Tebufenozide	Inserita massimo 2 interventi sulla coltura
Ciliegio	Afide nero	Azadiractina	Inserita
Ciliegio	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Inserita con nota" impiegabile in post-raccolta"
Cotogno	Afidi, Cimice asiatica	Piretrine	Inserita
Nocciolo	Cimici (<i>Halyomorpha halys</i> , <i>Gonocerus acuteangulatus</i>)	Piretrine	Inserita
Noce	Afidi e Cimice asiatica	Piretrine	Inserita
Noce	Armillaria	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Inserita
Olivo	Mosca delle olive, Tignola dell'olivo, Cecidomia delle foglie	Azadiractina	Inserita
Pesco	<i>Fusicoccum amygdali</i>	Difenoconazolo	Inserita nei limiti degli IBE candidati alla sostituzione e nel limite degli IBE sulla coltura

Pesco	Monilia (<i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	Pyrimethanil	Inserita in alternativa a Cyprodinil
Pesco	Cimice asiatica	Tebufenozide	Inserita massimo 2 interventi sulla coltura
Pesco	Tripidi	Azadiractina	Inserita
Susino	Afidi e Tripidi	Azadiractina	Inserita
Susino	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Inserita nel limite degli interventi acaricidi
Vite	Peronospora e Black Rot	Zolfo	Inserita con nota "autorizzati i formulati in miscela con rame"
Vite	Botrite	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Inserita
Vite	Ragnetto rosso	Acequinocyl	Inserita con nota "utilizzabile solo su Ragnetto rosso" nel limite degli interventi acaricidi
DIFESA COLTURE ORTICOLE			
Aglio pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Anguria	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Anguria	Patogeni tellurici	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	Inserita
Basilico pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine
Bietola da costa e a foglia pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Cavoli a infiorescenza pieno campo	Peronospora, <i>Alternaria</i>	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine
Cavoli cappucci in pieno campo	Peronospora, <i>Alternaria</i>	Pyraclostrobin	Inserita nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi

Cetriolo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Cetriolo	Afide delle cucurbitacee	Piretrine	Inserita
Cetriolo	Ragnetto rosso	Milbemectina	Inserita con massimo 2 interventi
Cicoria	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Cicoria pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Cicoria	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita massimo 2 interventi in pieno campo e 1 in serra
Cipolla pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Indivia riccia e scarola pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Indivia riccia e scarola	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Indivia riccia e scarola	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita massimo 2 interventi in pieno campo e 1 in serra
Fragola	Tripidi e Moscerino dei piccoli frutti	Piretrine	Inserita
Fragola serra	Marciume bruno (<i>Phytophthora cactorum</i>)	Fosfonato di K	Inserita
Fragola in coltura protetta	Muffa grigia	Isofetamid	Inserita
Lattuga pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Lattuga	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Lattuga	Peronospora	Oxathiapiprolin	Togliere limite "solo in pieno campo"
Melanzana	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi

Melanzana serra	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Melanzana	Ragnetto rosso, Eriofidi	Milbemectina	Inserita con massimo 2 interventi
Melone	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Patata	Peronospora, Alternaria	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Patata	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Peperone coltura protetta	Oidio	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Peperone coltura protetta	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Pomodoro da mensa coltura protetta	Peronospora, Alternaria, Oidio	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Pomodoro da mensa serra	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Pomodoro da mensa coltura protetta	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita
Pomodoro da mensa coltura protetta	Ragnetto rosso, Eriofidi	Milbemectina	Inserita con massimo 2 interventi
Pomodoro pieno campo	Alternaria, Oidio	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Pomodoro pieno campo	Ragnetto rosso, Eriofidi	Milbemectina	Inserita con massimo 2 interventi
Porro pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Prezzemolo	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Prezzemolo pieno campo	Peronospora, Alternaria	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 4 interventi
Radicchio	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita

Radichio	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita massimo 2 interventi in pieno campo e 1 in serra
Radichio pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Rucola pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Rucola	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Scalognolo pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Spinacio pieno campo	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 3 interventi
Zucchino	Peronospora	Pyraclostrobin	Inserita sostanza singola nel limite delle strobilurine massimo 2 interventi
Zucchino	Ragnetto rosso	Milbemectina	Inserita nel limite degli interventi ammessi sull'avversità massimo 2 applicazioni
Zucchino coltura protetta	Sclerotinia	Isofetamid	Inserita
CONTROLLO DELLE INFESTANTI COLTURE ORTICOLE			
Aglione	Diserbo di pre-emergenza o post-emergenza dicotiledoni	Bifenox	Inserita
Carota	Diserbo di post-emergenza	Bifenox	Inserita
Cipolla	Diserbo di pre-emergenza o post-emergenza dicotiledoni	Bifenox	Inserita con nota solo su colture trapiantate da bulbo
Indivia riccia e scarola	Diserbo di pre-trapianto dicotiledoni	Bifenox	Inserita
Lattuga	Diserbo di pre-trapianto dicotiledoni	Bifenox	Inserita
Pomodoro da mensa coltura protetta	Diserbo di pre-trapianto dicotiledoni	Bifenox	Inserita
Pomodoro pieno campo	Diserbo di pre-trapianto dicotiledoni	Bifenox	Inserita

Prezzemolo	Diserbo di pre-trapianto dicotiledoni	Bifenox	Inserita
Radicchio	Diserbo di pre-trapianto dicotiledoni	Bifenox	Inserita
Scalognò	Diserbo di pre-emergenza o post-emergenza dicotiledoni	Bifenox	Inserita con nota solo su colture trapiantate da bulbo
DIFESA COLTURE ORTICOLE BABY LEAF			
Cicorino e radicchio da taglio	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Cicorino e radicchio da taglio	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita massimo 2 interventi in pieno campo e 1 in serra
Dolcetta coltura protetta	Peronospora	Fosfonato di K	Inserita
Dolcetta coltura protetta	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita massimo 1 intervento in serra
Lattughino coltura protetta	Peronospora	Oxathiapiprolin	Inserita massimo 1 intervento in serra
DIFESA COLTURE ESTENSIVE			
Barbabietola da zucchero	Cercospora	Difenconazolo	Inserita sostanza singola massimo 1 intervento
Colza	Alternaria, Sclerotinia	Protioconazolo	Inserita massimo 2 interventi
CONTROLLO INFESTANTI COLTURE ESTENSIVE			
Colza	Diserbo di post-emergenza dicotiledoni	Halauxifen-metile+ Picloram+ Aminopyralid	Inserita
Frumento	Diserbo di post-emergenza precoce	Halauxifen-metile	Inserita
Orzo	Diserbo di post-emergenza precoce	Halauxifen-metile	Inserita
Riso	Diserbo di post-emergenza graminacee	Quizalofop-P-ethyl	varietà ed ibridi di riso tolleranti agli erbicidi inibitori dell'enzima ACCasi
Segale	Diserbo di post-emergenza precoce	Halauxifen-metile	Inserita
Triticale	Diserbo di post-emergenza precoce	Halauxifen-metile	Inserita

Triticale	Diserbo di post-emergenza graminacee	Pinoxaden	Inserita
DIFESA COLTURE DA SEME			
Cavoli da foglia da seme	Oidio, Alternaria	Protioconazolo	Inserita massimo 3 interventi tra protioconazolo e difenconazolo
Cavoli a testa da seme	Oidio, Alternaria	Protioconazolo	Inserita massimo 3 interventi tra protioconazolo e difenconazolo
Cavoli a infiorescenza da seme	Oidio, Alternaria	Protioconazolo	Inserita massimo 3 interventi tra protioconazolo e difenconazolo
Ravanello da seme	Oidio	Protioconazolo	Inserita massimo 2 interventi