

Sintomi, trasmissione, diffusione, presenza	Epoca di controllo, gravità	Soglia	
<p>SINTOMI: è il fitoplasma responsabile del “deperimento della lavanda” Sulle piante giovani si osservano inizialmente ingiallimenti e accartocciamenti delle foglie, riduzione e aborto delle infiorescenze Successivamente i rami disseccano e con il succedersi delle stagioni la pianta muore I sintomi possono interessare l'intera pianta o anche singole parti di essa Nelle aree di coltivazione della lavanda (Francia) rappresenta il principale problema fitosanitario I danni possono essere molto significativi, con progressiva moria delle piante e diminuzione della resa produttiva</p> <p>TRASMISSIONE/MEZZI DI DIFFUSIONE: è trasmesso dall'insetto cicadellide <i>Hyalestes obsoletus</i> In Francia è stato dimostrato come i fitoplasmi responsabili del deperimento della lavanda siano un particolare ceppo trasmesso da popolazioni che compiono l'intero ciclo sulla lavanda Data la specificità di questa malattia e la particolarità dell'insetto vettore, la diffusione a lunga distanza della malattia è molto difficile</p> <p>PRESENZA IN ITALIA: sì (ampiamente diffuso su molte specie quali vite e pomodoro, non segnalato su lavanda) PRESENZA IN EMILIA-ROMAGNA: sì (ampiamente diffuso su molte specie quali vite e pomodoro, non segnalato su lavanda)</p>	<p>Epoca di controllo: tutto l'anno c</p> <p>Gravità: alta (laddove la malattia fosse presente)</p>	<p>0%</p>	<p><i>foto:</i> https://www.researchgate.net/figure/6-Cycle-de-vie-de-Hyalestes-obsoletus-et-transmission-de-la-maladie-du-deperissement_fig5_345830068</p>