

Sintomi, trasmissione, diffusione, presenza	Epoca di controllo, gravità	Soglia	
<p>SINTOMI: la melanzana è colpita solo occasionalmente da questo virus La sintomatologia è abbastanza grave e consiste in deformazioni delle foglie, che tendono a necrotizzare e a manifestare la tipica bronzatura sulle foglie più basse Le piante sono, inoltre, nanizzate e producono frutti malformati Raramente si osservano sintomi di infezione nelle piante molto piccole, ma è comunque opportuno il controllo visivo anche in vivaio</p> <p>TRASMISSIONE/MEZZI DI DIFFUSIONE: il virus è trasmesso da alcune specie di tripidi tra cui <i>Frankliniella occidentalis</i> considerato il vettore più efficiente Sono insetti che hanno molte generazioni in un anno e sono favoriti da temperature mediamente elevate, pertanto si sviluppano bene nelle serre Il virus viene diffuso attraverso la propagazione di parti di piante infette, mentre non è certa la trasmissione per seme o per mezzo di strumenti da lavoro</p> <p>PRESENZA IN ITALIA: sì PRESENZA IN EMILIA-ROMAGNA: sì</p>	<p>Epoca di controllo: durante tutto il ciclo vegetativo</p> <p>Gravità: alta ma non frequente su questa coltura</p>	0%	<p><i>foto:</i> https://www.cabi.org/isc/datasheet/54086</p>