

AVVERSITÀ	PREVENZIONE	LOTTA CHIMICA (in presenza di sintomi)
ALTERNARIOSI <i>Alternaria solani</i>	<p>Impiegare seme sano o conciato</p> <p>Eliminare le infestanti</p> <p>Evitare condizioni di stress</p>	<p>Azoxystrobin (1)</p> <p>Bentiavalicarb+folpet</p> <p>Clorotalonil+cimoxanil (6)</p> <p>Clorotalonil+metalaxil-M</p> <p>Difenconazolo</p> <p>Dimetomorf+folpet</p> <p>Dimetomorf+pyraclostrobin</p> <p>Famoxadone+cimoxanil</p> <p>Folpet</p> <p>Iprodione</p> <p>Mancozeb</p> <p>Pyraclostrobin+dimetomorf</p> <p>Pyraclostrobin+metiram</p> <p>Metiram</p> <p>Probineb</p> <p>Rame</p> <p>Thiram</p> <p>Toclofos-metil</p> <p>Zoxamide</p>
ANTRACNOSI <i>Colletotrichum coccodes</i>	<p>Evitare ristagni idrici</p> <p>Evitare irrigazione per aspersione</p> <p>Eliminare le infestanti</p>	<p>Bentiavalicarb+folpet</p> <p>Clorotalonil+metalaxil-M</p> <p>Clorotalonil+propamocarb</p> <p>Mancozeb</p> <p>Rame</p> <p>Thiram</p>
BOTRITE <i>Botrytis cinerea</i>	<p>Arieggiare la serra</p> <p>Riscaldare di notte la serra per ridurre l'umidità relativa nei mesi primaverili</p> <p>Evitare ristagni idrici</p>	<p><i>Bacillus subtilis</i></p> <p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i></p> <p>Clorotalonil+metalaxil-M</p> <p>Cyprodinil+fludioxonil</p> <p>Fenaxamid</p> <p>Fenpyrazamine (2)</p> <p>Folpet</p> <p>Imazil</p> <p>Iprodione</p> <p>Penthiopyrad</p> <p>Pyraclostrobin+boscalid</p> <p>Pyrimethanil</p> <p>Thiram</p> <p>Toclofos-metil (3)</p>
CLADOSPORIOSI <i>Cladosporium fulvum</i>	<p>Arieggiare la serra</p> <p>Riscaldare di notte la serra per ridurre l'umidità relativa nei mesi primaverili</p> <p>Utilizzare seme sano o conciato</p>	<p>Azoxystrobin (1)</p> <p>Ciproconazolo</p> <p>Difenconazolo</p> <p>Folpet</p> <p>Mancozeb</p> <p>Metiram</p> <p>Propineb</p> <p>Pyraclostrobin+boscalid</p> <p>Pyraclostrobin+metiram</p> <p>Thiram</p>

prodotto consigliato dal Servizio fitosanitario

(1) Attivo anche verso *Dydimella*

(2) Solo in serra

(3) Applicazioni al terreno o in presenza della coltura

(4) Applicazioni al terreno

(5) Concia del seme

(6) Solo in pieno campo

AVVERSITÀ	PREVENZIONE	LOTTA CHIMICA (in presenza di sintomi)
MARCIUME BASALE <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis-lycopersici</i>	Effettuare rotazioni Eliminare le piante colpite	<i>Streptomyces griseoviridis</i> k61(3)
MARCIUME DEI SEMENZAI <i>Pythium aphanidermatum</i> <i>Pythium debaryanum</i> <i>Pythium ultimum</i>	Impiegare seme sano Evitare ristagni idrici Evitare elevate concimazioni azotate	Captano (5) Mancozeb (5) Propamocarb Propamocarb+fosetil-AI (4) Thiram (5) Trichoderma spp. (4)
MARCIUME PEDALE DEL FUSTO <i>Didymella lycopersici</i>	Impiegare seme sano o conciato Effettuare ampie rotazioni Eliminare le infestanti Eliminare le piante colpite	
MARCIUME ZONATO <i>Phytophthora nicotianae</i>	Evitare ristagni idrici Evitare irrigazione per aspersione Eliminare le piante colpite	Captano (5) Propamocarb
OIDIO <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe</i> sp.	Arieggiare la serra Eliminare le infestanti	Azoxystrobin (1) Bicarbonato di potassio Bupirimate Ciflufenamid Ciproconazolo Difenconazolo Miclobutanil Pyraclostrobin+boscalid Pyraclostrobin+metiram Penconazolo (6) Tebuconazolo Tetraconazolo Trifloxystrobin+tebuconbazolo Zolfo

prodotto consigliato dal Servizio fitosanitario

(1) Attivo anche verso *Dydymella*

(2) Solo in serra

(3) Applicazioni al terreno o in presenza della coltura

(4) Applicazioni al terreno

(5) Concia del seme

(6) Solo in pieno campo

AVVERSITÀ	PREVENZIONE	LOTTA CHIMICA (in presenza di sintomi)
PERONOSPORA <i>Phytophthora infestans</i>	Evitare ristagni idrici Evitare irrigazione per aspersione Eliminare le piante colpite	Ametotracdina+dimetomorf Ametotracdina+metiram Azoxystrobin (1) Benalaxil +rame Benalaxil+mancozeb Benalaxil-M+mancozeb (6) Bentiavalicarb+rame Bentiavalicarb+mancozeb Cimoxanil Clorotalonil+cimoxanil (6) Clorotalonil+metalaxil-M Cyazofamid Dimetomorf +mancozeb Dimetomorf +metiram Dimetomorf+pyraclostrobin Dimetomorf+rame Dimetomorf+folpet Ditianon Famoxadone+cimoxanil Fenamidone+rame Folpet Fosetil Al Iprovalicarb+rame Mancozeb Mandipropamide Mandipropamide+mancozeb Mandipropamide+rame Metalaxil+mancozeb Metalaxil+rame Metalaxil-M+mancozeb Metalaxil-M+rame Metiram Pyraclostrobin+metiram Probineb Propamocarb Propamocarb+cimoxanil Rame Zoxamide Zoxamide+rame
RADICE SUBEROSA <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Eliminare le infestanti Effettuare ampie rotazioni Eliminare le piante colpite	Streptomyces griseoviridis k61 (3)
RIZOTTONIOSI <i>Rhizoctonia solani</i>	Evitare ristagni idrici Impiegare seme sano o conciato Effettuare ampie rotazioni Eliminare le piante colpite	Mancozeb (5) Thiram Toclofos -metil (3)(5)

prodotto consigliato dal Servizio fitosanitario

(1) Attivo anche verso *Dydimella*

(2) Solo in serra

(3) Applicazioni al terreno o in presenza della coltura

(4) Applicazioni al terreno

(5) Concia del seme

(6) Solo in pieno campo

AVVERSITÀ	PREVENZIONE	LOTTA CHIMICA (in presenza di sintomi)
SCLEROTINIA <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>	Evitare ristagni idrici Impiegare seme sano o conciato Effettuare ampie rotazioni	Penthiopyrad Toclofos-metil (3)(5) Trichoderma spp.
SEPTORIOSI <i>Septoria lycopersici</i>	Evitare irrigazione per aspersione Curare l'arieggiamento degli ambienti Impiegare seme conciato Eliminare le infestanti	Difenconazolo Folpet Mancozeb Pyraclostrobin+metiram Metiram Probineb Rame
TRACHEOFUSARIOSI <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Impiegare seme sano o conciato Effettuare ampie rotazioni Eliminare le piante colpite	<i>Streptomyces griseoviridis</i> k61 (3)
TRACHEOVERTICILLOSI <i>Verticillium dahliae</i> <i>Verticillium albo-atrum</i>	Eliminare le infestanti Effettuare ampie rotazioni Eliminare le piante colpite	<i>Streptomyces griseoviridis</i> k61 (3)

prodotto consigliato dal Servizio fitosanitario

(1) Attivo anche verso *Dydymella*

(2) Solo in serra

(3) Applicazioni al terreno o in presenza della coltura

(4) Applicazioni al terreno

(5) Concia del seme

(6) Solo in pieno campo