



L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI  
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

**SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO**

**RAZZA APPENNINICA RER A 025 (Revisionato)**

| <b>PECORA</b>   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| <b>Famiglia:</b> <i>Bovidae</i>   | <b>Genere:</b> <i>Ovis</i> | <b>Specie:</b> <i>aries</i>                       |
| <b>Nome comune:</b> Appenninica   |                            | <b>Codice iscrizione Registronazionale:</b> OA/26 |
| <b>Sinonimi accertati:</b>  |                            |   |
| <b>Sinonimie errate:</b>  |                            |   |
| <b>Rischio di erosione genetica o di estinzione</b>   |                            |   |
| Stato sconosciuto    Minacciata conservata...X....Minacciata    Critica<br>conservata.....Critica |                            |   |
| <b>Denominazioni dialettali locali</b>  |                            |   |
| Data inserimento nel repertorio: 30-11-2017 Determina n. 19353                                    |                            |   |
| <b>Luoghi di conservazione ex situ:</b>   |                            |   |
| <b>Modalità di conservazione ex situ</b>  |                            |   |
| Conservativo (in vivo) X  |                            |   |
| Allevamento produttivo (in vivo) X  |                            |   |
| Conservazione dinamica (seme, oociti, cellule somatiche, embrioni, DNA in vitro)                  |                            |   |
| Conservazione statica (seme, oociti, cellule somatiche, embrioni, DNA in vitro)                   |                            |   |
| <b>Modalità di conservazione in situ/ on farm-Descrizione</b>                                     |                            |   |
| Allevamento conservativo amatoriale   |                            |   |
| Allevamento produttivo X  |                            |   |
| 1. Monterastelli Erio e C. s.s. - Bertinoro (FC)  |                            |   |
| 2. Soc. Agr. LA VALLE sr l - Bertinoro (FC)   |                            |   |
| 3. Soc. Agr. Petrini s.s. – Civitella di Romagna (FC)   |                            |   |
| 4. OVINBIO di Fratti Roberto – Torriana (RN)  |                            |   |
| 5. Piscaglia Luigi – Sogliano al Rubicone (FC)  |                            |   |
| 6. Merli Gabr iele – Sogliano al Rubicone (FC)  |                            |   |
| 7. Canali Pier fausto – Sogliano al Rubicone (FC)   |                            |   |
| 8. CLOROFILLA S.c.a.r. l – Mercato Saraceno (FC)  |                            |   |
| 9. Crescente Angelo – Mercato Saraceno (FC)   |                            |   |
| 10. Averardi Massimo e C. s.s. – Sarsina (FC)   |                            |   |
| 11. Marini Emiliano – Sarsina (FC)  |                            |   |

|   |
|---|
| 12. Soc.Agr. LA CASELLA – Sarsina (FC)                        |
| 13. Alessandrini Renato – Sarsina (FC)                        |
| 14. Pisani Alan – Sarsina (FC)                                |
| 15. Nuti Vittorio e Corrado – Bagno di Romagna (FC)           |
| 16. Soc. Agr. F.lli Roverelli – Bagno di Romagna (FC)         |
| 17. Bartolini Giordano e Figlio – Bagno di Romagna (FC)       |
| 18. Bigiarini F.lli – Bagno di Romagna (FC)                   |
| 19. Boattini Carlo – Bagno di Romagna (FC)                    |
| 20. CLOROFILLA S.c.a.r.l – Mercato Saraceno (FC)              |
| 21. Spignoli Maurizio – Bagno di Romagna (FC)                 |
| 22. I GRIFONI di Sampaoli e Tizzanini – Bagno di Romagna (FC) |
| 24. Nuti Aldo – Verghereto (FC)                               |
| 25. Biserni Carlo – Verghereto (FC)                           |
| 26. Biserni Franco – Verghereto (FC)                          |
| 27. Canestrini Edoardo – Verghereto (FC)                      |
| 28. Rossi Bonfiglio – Verghereto (FC)                         |
| 29. Soc. Agr. La Bigotta – Casteldelci (RN)                   |
| 30. Gabrielli Emole – Casteldelci (RN)                        |
| 31. Zani Monica – Maiolo (RN)                                 |
| 32. Cesarini Chiara – Pennabilli (RN)                         |
| 33. Az. Agr. Angelina di Sabbatani Daniele – Alfonsine (RA)   |
| 34. Sartoni Sergio – Brisighella (RA)                         |
| 35. Perin Emma – Faenza (RA)                                  |



*Fattrice con agnelli*



## CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE

Deriva dalle popolazioni eteromorfe presenti nella dorsale dell'Appennino attraverso un'opera di selezione iniziata nella metà degli anni '70 del secolo scorso. E' diventata razza nell'anno 1980 con decreto dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Oggi rappresenta una entità ben armonizzata con l'ambiente e quindi di rilevante importanza per la suarusticità intesa come capacità di sfruttare risorse foraggere anche in zone disagiate e come adattabilità ad essere allevata in ambienti diversi.

L'Appenninica attuale si differenzia notevolmente dalla popolazione Appenninica originaria, che veniva denominata con nomi locali diversi: Vissana, Casentinese, Senese delle Crete, Barisciana, Pagliarola, Pomarancina, Perugia del Piano.

L'Appenninica attuale è il prodotto del miglioramento avvenuto dopo gli anni ottanta con l'uso di arieti di notevole taglia che hanno aumentato la mole e quindi migliorato da un punto di vista quantitativo la produzione di carne.

Il Libro Genealogico è da sempre tenuto da AssoNaPa, che organizza ed esegue i controlli funzionali, veicolando con apposite aste gli arieti più idonei al miglioramento.

## ZONA TIPICA DI PRODUZIONE

Gli allevamenti oltre che nell'Umbria e nella Toscana sono diffusi in altre regioni circostanti: Lazio Marche, Romagna, Abruzzo coinvolgendo pertanto seppur in maniera numericamente, diverse province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Firenze, Grosseto, Pisa, Siena, Perugia, Terni Pesaro-Urbino, Rieti, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Teramo.

Nel 1983 secondo il CNR i capi censiti erano 160.000 circa, saliti nel 2002 a 250.000, mentre nel 2006 erano 9.000, nel 2021 7.600. Oggi risultano iscritti al Libro Genealogico circa 8.465 capi, ripartiti in 190 allevamenti. Con ogni probabilità il calo numerico è da imputare ad una generale diminuzione degli allevamenti di ovini da carne. Il ricambio generazionale non vede sufficienti incentivazioni nell'intraprendere questa attività, divenuta burocraticamente onerosa e non remunerativa per la concorrenza di carni a basso costo, provenienti da altri paesi.

## BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Bigi D., Zanon A. (2020) Atlante delle razze autoctone: ovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia, Seconda Edizione, Edagricole.
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (2007) Elenco delle razze minacciate.
- Morbidini L., Panella F., Sarti D.M., Sarti F.M. (1995) Caratteristiche delle carcasse di agnelli Appenninici dei due sessi macellati a 40, 60 e 100 giorni di età. Atti dell'XI Congr. Naz. ASPA. Grado, 19-22 giugno, 317-318.
- Morbidini L., Sarti D.M., Sarti F.M. (1995) Qualità delle carcasse e caratteristiche fisiche delle carni di agnelli pesanti Appenninici. Atti dell'XI Congr. Naz. ASPA. Grado, 19-22 giugno, 319- 320.
- Panella F., Sarti F.M. (1999) Schemi di selezione per le razze ovine. L'Allevatore di Ovini e Caprini, 16, 11, 4.
- Regione Umbria, E.S.A.U., Associazione Agriumbria, C.C.I.A.A. Perugia (1989) Raccolta di ricette per degustare l'agnello pesante Appenninico.
- Sarti D.M., Panella F., Pauselli M., Sarti F.M., Lasagna E. (2000) L'allevamento degli ovini. Moderne tecniche per produzioni di qualità. Il Divulgatore, n.4/5, Edagricole.
- Sarti D.M. (2002) L'Appenninica: passato, presente, futuro. L'Allevatore di Ovini e Caprini, 18, 3, 2.
- Sarti, D.M. (1997) L'Appenninica: situazione attuale e prospettive. L'Allevatore di Ovini e Caprini, 14, 12, 1-2.

**DESCRIZIONE MORFOLOGICA STANDARD****Aspetto generale e caratteristiche della razza**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Taglia:</b>                | Medio - grande  |
| <b>Tronco:</b>                | Il tronco è relativamente lungo con altezza al garrese quasi pari a quella della groppa il petto è largo e la groppa ha un buon sviluppo sia in larghezza che in lunghezza.     |
| <b>Testa:</b>                 | La testa è acorne, non eccessivamente pesante, con profilo rettilineo o leggermente arcato, le orecchie di media lunghezza portate orizzontali o leggermente pendenti e cadenti |
| <b>Collo:</b>                 | Il collo è di media lunghezza, ben attaccato alle spalle.   |
| <b>Arti:</b>                  | Gli arti sono solidi e relativamente lunghi   |
| <b>Vello:</b>                 | Bianco, aperto o semiaperto, con testa, parte ventrale del collo, basso ventre a arti nudi  |
| <b>Pelle e Pigmentazione:</b> | Pelle e mucosa rosee  |

**2 – PESI**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Maschio:</b>       | 78 kg |
| <b>Femmina</b>        | 56 kg |
| <b>Difetti gravi:</b> |       |

| <b>Dati biometrici</b>      | <b>Maschi</b> | <b>Femmine</b> |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Altezza al garrese (cm)     | 77            | 69             |
| Altezza alla groppa (cm)    | 77            | 70             |
| Altezza toracica (cm)       | 35            | 32             |
| Larghezza media groppa (cm) | 25            | 24             |
| Lunghezza tronco (cm)       | 79            | 73             |
| Circonferenza toracica (cm) | 95            | 87             |

**Caratteri produttivi**

E' una razza a triplice attitudine, oggi a preminente attitudine alla produzione di carne. Alcuni allevamenti di medie dimensioni la utilizzano anche per la produzione di latte per la trasformazione in formaggi tipici, pecorino e ricotta in particolare. La produzione di latte indicativa è di litri 100- 120 con 6-7% di grasso e la massima parte viene poppata dagli agnelli.

La produzione annuale di lana è di circa 2,5 kg negli arieti e 1,5 kg nelle femmine, del tipo grossolana da materasso.

**Caratteri riproduttivi**

L'età media al primo parto è di 16 mesi. Presenta cicli estrali durante tutto l'anno e si ottengono solitamente due parti ogni tre anni, con un buon tasso di gemellarità.

Fertilità (rapporto tra le pecore partorite e le pecore avviate alla monta): 90% Prolificità (rapporto tra gli agnelli nati e le pecore partorite): 129%

Fecondità annua (rapporto tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine):

A) per le pecore che partoriscono una volta all'anno: 116%

B) per le pecore che partoriscono 3 volte ogni 2 anni: 170%

**Indirizzo di miglioramento**

Pur non trascurando i caratteri di resistenza, di rusticità e le attività produttive del latte e della lana, l'indirizzo di miglioramento è quello di esaltare la produzione di carne, cercando fra l'altro di aumentare la prolificità.

**Scelta dei riproduttori**

Difetti tollerabili: parziale presenza di ciuffo in fronte, di lana nella parte ventrale del collo, nel basso ventre e nelle parti prossime agli arti; pro file leggermente montoninosia nei maschi che nelle femmine;

Difetti da eliminare: macchie al vello di qualsiasi colore. Pigmentazione della faccia delle aperture naturali, dell'addome e degli arti; arti eccessivamente lunghi e corti. Profilo decisamente montonino, orecchie troppo lunghe e pendenti. Corna ancorchè accennate sia nei maschi che nelle femmine.

**Tecnica di allevamento gestione e riproduzione**

Brado

Mungitura manuale

Mungitura meccanica

Pascolo e stalla X

Riproduzione assistita

Riproduzione naturale X

Semibrado confinato X

Stabulazione fissa

Stabulazione libera

Stallino X

| <b>DESCRIZIONE MORFOLOGICA OVINO</b> |   |                                  |   |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <b>CORNA maschio</b>                 |   | <b>ORECCHIE</b>                  |   |
| assenti                              | X | assenti                          |   |
| spiralate                            |   | piccole                          |   |
| falcetta                             |   | erette                           |   |
| elicoidali aperte                    |   | semi erette                      |   |
| punte convergenti                    |   | semi pendenti                    | X |
| punte divergenti                     |   | pendenti                         |   |
|                                      |   | grandi                           |   |
|                                      |   | medie                            | X |
| <b>CORNA femmina</b>                 |   | piccole                          |   |
| assenti                              | X | con apice ripiegato              |   |
| falcetta                             |   | apice arrotondato                |   |
| elicoidali                           |   | apice appuntito                  |   |
| punte convergenti                    |   | <b>MANTELLLO</b>                 |   |
| punte divergenti                     |   | monocolore                       | X |
| <b>LANA</b>                          |   | bicolore                         |   |
| aperta                               | X | pezzato regolare                 |   |
| semiaperta                           | X | pezzato irregolare               |   |
| semichiusa                           |   | <b>LANA</b>                      |   |
| chiusa                               |   | con ciuffo frontale              |   |
| <b>PROFILO FRONTE</b>                |   | coprente il ventre               |   |
| convesso                             | X |                                  | X |
| liperconvesso(montonino              | X | ventre                           |   |
|                                      |   | lana sulle parti distaliarti     |   |
| )                                    |   | collo slanato                    |   |
| <b>TAGLIA</b>                        |   | <b>CODA</b>                      |   |
| piccola                              |   | lunga                            | X |
| media                                | X | corta                            |   |
| grande                               |   | con lipoma                       |   |
| <b>GIOGAIA</b>                       |   | <b>CARATTERI sex secondari</b>   |   |
| presente                             |   | Maschio con pieghefrononasali    | X |
| assente                              | X | Maschio senza pieghe frononasali | X |
| <b>COLORE TESTA</b>                  |   | <b>COLORE MUCOSE</b>             |   |
|                                      |   | <b>bocca musello</b>             |   |
| uniforme bianco                      | X | roseo                            | X |
| uniforme rosso                       |   | macchiettato                     |   |
| uniforme giallo                      |   | pigmentato                       |   |
| picchiettato                         |   |                                  |   |
| maculato                             |   |                                  |   |
| pezzato                              |   |                                  |   |
| presenza di occhiaie                 |   |                                  |   |
| lista sulla fronte                   |   |                                  |   |

