







































L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO (revisionata)

ALBICOCCO

Famiglia: <i>Rosaceae</i>			Genere: <i>Prunus</i>			Specie: <i>Prunus armeniaca</i> L.		
Nome comune:								
Sinonimi accertati:								
Sinonimie errate:								
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>):								
Rischio di erosione:								
Data inserimento nel repertorio:					Ultimo aggiornamento scheda:			
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda						N. piante presenti		Anno d'impianto
1) Azienda xx via								
2) Azienda yy via								
3)								
Luoghi di conservazione ex situ:								
<i>Foto pianta intera</i>					<i>Foto fiore</i>			
<i>Pianta</i>					<i>Fiore</i>			
<i>Foto foglie</i>					<i>Foto del frutto intero e in sezione longitudinale</i>			
<i>Foglia</i>					<i>Frutto</i>			
CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE								
ZONA TIPICA DI PRODUZIONE								
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO								

DESCRIZIONE MORFOLOGICA I descrittori prioritari secondo il Gruppo di lavoro GIBA e i descrittori essenziali indicati da UPOV e IBPGR sono segnalati con un asterisco (*) e rappresentano gli elementi necessari per l'iscrizione di una risorsa genetica ad un repertorio della biodiversità					
PIANTA. Osservazioni possibilmente su più piante.					
UPOV 1 IBPGR 6.1.2	VIGORIA DELL'ALBERO *	UPOV 2 IBPGR6.1.1	PORTAMENTO DELL'ALBERO *	UPOV 12 IBPGR -	LAMINA FOGLIARE: FORMA DELLA BASE
1	Molto debole (Cerasiello I)		1 – Colonnare (Japan's Early)		1 – Acuta (San Francesco)
3	Debole (Ninfa)		2 – Assurgente/eretto (Reale d'Imola)		
5	Media (Canino)		3 – Semieretto/globoso (Tyrinthos)		2 – Ottusa (Portici)
7	Elevata (Portici)		4 – Espanso (Canino)		3 – Troncata (Canino, Perla)
9	Molto elevata (Monaco bello)		5 – Pendulo/ricadente (Palsteyn)		4 – Cordata (Moniqui)
			6 – Piangente		
UPOV 13 IBPGR -	LAMINA FOGLIARE: APICE	UPOV 15 IBPGR -	DENTATURA DEL MARGINE FOGLIARE *	UPOV 18 IBPGR 4.1.5	LUNGHEZZA DEL PICCIOLO *
	1 – Acuto (San Castrese)		1 – Crenato (San Castrese)	3	Corto (Ninfa, Moniqui)
	2 – Angolo retto (Canino)		2 – Bicrenato (Ninfa)		
	3 – Moderatamente ottuso (Portici)		3 – Serrato (Vitillo)	5	Medio (Cafona, Canino)
	4 – Molto ottuso (Hargrand)		4 – Biserrato (San Francesco)	7	Lungo (Reale d'Imola)
UPOV 22 IBPGR 4.1.6	NUMERO DI NETTARI SUL PICCIOLO *	UPOV - IBPGR6.2.2	AUTOFERTILITÀ *	UPOV 56 IBPGR4.2.1	EPOCA INIZIO FIORITURA *
1	Nessuno o uno (Sant'Ambrogio)	0	Assente (Stark Early Orange)	1	Molto precoce (Ninfa)
				3	Precoce (Canino)
2	Due o tre (Cafona)	1	Presente (San Castrese)	5	Intermedia (Portici)
3	Più di tre (Canino, Moniqui)			7	Tardiva (Boccuccia liscia)
		9	Molto tardiva (Harglow)		
FIORE					
UPOV 24 IBPGR -	FIORE: DIAMETRO *	UPOV 26 IBPGR -	FIORE: FORMA DEI PETALI	UPOV 27 IBPGR -	FIORE: COLORE PETALO SULLA PAGINA INFERIORE
3	Piccolo (Portici)		1 – Ellittico allungato (Sant'Ambrogio)	1	Bianco (Cafona)
5	Medio (Reale d'Imola)		2 – Rotondo (Harcot, Luizet)	2	Rosa chiaro (San Castrese)
7	Grande (San Castrese)		3 – Oblato (Canino, Vitillo)	3	Rosa intenso (Harcot)

FRUTTO. Osservazioni a maturazione. Media di 10 frutti ben conformati					
UPOV 57 IBPGR 4.4.2	EPOCA DI INIZIO MATURAZIONE *	UPOV 28 IBPGR 6.2.5	DIMENSIONE DEL FRUTTO *	UPOV 39 IBPGR 6.2.10	FORMA DELL'APICE DEL FRUTTO *
1	Molto precoce (Ninfa)	1	Molto piccolo (Cerasiello I)		1 – Acuto (Reale d'Imola)
3	Precoce (Monaco Bello)	2	Piccolo (Colomer)		2 – Arrotondato (Portici, Luizet)
5	Intermedia (Pisana)	3	Medio (Cafona)		3 – Tronco (Bella d'Imola)
7	Tardiva (Paviot)	4	Grande (Portici)		4 – Infossato (San Castrese)
9	Molto tardiva (Farbaly)	5	Molto grande (Pisana)		
UPOV 29 IBPGR 6.2.6	FORMA DEL FRUTTO (in visione ventrale) *			UPOV 44 IBPGR 6.2.13	COLORE DI FONDO DELLA BUCCIA *
	1 – Triangolare (Luizet)		5 – Rotonda (Ninfa)	1	Bianco
	2 – Ovata (Pisana)		6 – Oblata (Nugget)	2	Bianco-giallastro (Cibo del paradiso)
	3 – Oblunga (Portici)		7 – Obovata (Harcot)	3	Giallo chiaro/giallastro (Vitillo)
	4 – Ellittica (Precoce d'Imola)		8 – Obliquo romboidale (Canino)	4	Giallo-verde (Alberge de Tours)
				5	Aranciato chiaro (Portici)
				6	Aranciato (Pisana)
				7	Aranciato intenso (Harcot)
UPOV 45 IBPGR 6.2.14	ESTENSIONE DEL SOVRACCOLORE DELLA BUCCIA *	UPOV 47 IBPGR -	INTENSITÀ DEL COLORE DELLA BUCCIA	UPOV 49 IBPGR 4.2.3	COLORE DELLA POLPA DEL FRUTTO *
1	Assente (Moniqui)	3	Leggera (Valleggia)	1	Bianco (Cibo del paradiso)
3	Piccola (Cafona)			2	Crema/giallo chiaro (Moniqui)
5	Media (Portici)	5	Media (Harcot)	3	Aranciato chiaro (San Castrese)
7	Ampia (Pisana)	7	Forte (Kioto)	4	Aranciato (Pisana)
9	Molto ampia (Kioto)			5	Aranciato intenso (Harcot)
UPOV 51 IBPGR 6.2.17	CONSISTENZA DELLA POLPA DEL FRUTTO *	UPOV 53 IBPGR 4.3.2	ADERENZA DELLA POLPA AL NOCCIOLO *	UPOV 54 IBPGR -	NOCCIOLO: FORMA IN VISIONE LATERALE *
1	Molto tenera (Sant'Ambrogio)	1	Assente o molto leggera (Ninfa)		1 – Ovale (Portici)
3	Tenera (Goldcot)	3	Leggera (Canino)		2 – Oblunga (Bella d'Imola)
5	Media (San Castrese)	5	Media (Tardif de Bordaneil)		3 – Ellittica (Vitillo)
7	Soda (Bella d'Imola)	7	Forte (Precoce di Toscana)		4 – Rotonda (Monaco bello)
9	Molto soda (Pellechiella)				5 – Obovale (Harcot)

UPOV - IBPGR -	DOLCEZZA DELLA POLPA	UPOV - IBPGR -	ACIDITÀ DELLA POLPA	UPOV - IBPGR 6.3.1	DIMENSIONE DEL NOCCIOLO
1	Molto bassa (Castelbrite)	1	Molto bassa (Cibo del Paradiso)	1	Molto piccolo (Zederli)
2	Bassa (Ninfa)	2	Bassa (Pisana)	2	Piccolo (Henderson)
3	Media	3	Media (Pellecchiella)	3	Medio (Hatif Colomer)
4	Alta (Antonio Errani)	4	Alta (Aurora)	4	Grande (Reale d'Imola)
5	Molto alta	5	Molto alta (Tyrinthos)	5	Molto grande (Large Early)
UPOV 55 IBPGR 4.3.1	MANDORLA: GRADO DI AMARO				
1	Dolce (Reale d'Imola)				
2	Leggermente amaro (Moniqui)				
3	Fortemente amaro (Canino)				
SENSIBILITÀ ALLE PATOLOGIE					
UPOV - IBPGR -	SENSIBILITÀ A MONILIA DEI RAMI (<i>Monilinia laxa</i>)	UPOV - IBPGR -	SENSIBILITÀ A RUGGINE (<i>Xanthomonas pruni</i>)	UPOV - IBPGR -	SENSIBILITÀ ALLA SHARKA (PPV)
0	Nulla	0	Nulla	0	Nulla (Pella)
1	Molto scarsa (Boccuccia, Cafona)	1	Molto scarsa (Polonais, Tyrinthos)	1	Molto scarsa (Bora, Aurora)
3	Scarsa (Canino, Polonais)	3	Scarsa (Sungiant, Canino)	3	Scarsa (Stark Early Orange)
5	Media (Bulida, Rouge de Roussilon)	5	Media (Stark E. Orange)	5	Media (Bella d'Imola)
7	Elevata (Paviot, Tonda di Costigliole)	7	Elevata (Boccuccia, San Castrese)	7	Elevata
9	Molto elevata (Prete)	9	Molto elevata (Tonda di Costigliole, Cafona)	9	Molto elevata (Tyrinthos, Portici)
OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
Peso medio su un campione di 10 frutti:					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					