

L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO (revisionata)

RAZZA APPENNINICA RER A 025

PECORA		
Famiglia: <i>Bovidae</i>	Genere: <i>Ovis</i>	Specie: <i>Aries</i>
Nome comune: Appenninica		Codice iscrizione Registro nazionale: OA/26
Sinonimi accertati: Vissana, Casentinese, Senese delle Crete, Barisciana, Pagliarola, Pomarancina, Perugina del Piano.		
Sinonimie errate:		
Denominazioni dialettali locali		
Data inserimento nel repertorio:		
Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:		
1. Monterastelli Erio e C. s.s. - Bertinoro (FC)		
2. Soc. Agr. LA VALLE sr l - Bertinoro (FC)		
3. Soc. Agr. Petrini s.s. – Civitella di Romagna (FC)		
4. OVINBIO di Fratti Roberto – Torriana (RN)		
5. Piscaglia Luigi – Sogliano al Rubicone (FC)		
6. Merli Gabr iele – Sogliano al Rubicone (FC)		
7. Canali Pier fausto – Sogliano al Rubicone (FC)		
8. CLOROFILLA S.c.a.r. l – Mercato Saraceno (FC)		
9. Crescente Angelo – Mercato Saraceno (FC)		
10. Averardi Massimo e C. s.s. – Sarsina (FC)		
11. Marini Emiliano – Sarsina (FC)		
12. Soc. Agr. LA CASELLA – Sarsina (FC)		
13. Alessandrini Renato – Sarsina (FC)		
14. Pisani Alan – Sarsina (FC)		
15. Nuti Vittorio e Corrado – Bagno di Romagna (FC)		
16. Soc. Agr. F. Ili Roverelli – Bagno di Romagna (FC)		
17. Bartolini Giordano e Figlio – Bagno di Romagna (FC)		
18. Bigiar ini F. Ili – Bagno di Romagna (FC)		
19. Boattini Carlo – Bagno di Romagna (FC)		
20. CLOROFILLA S.c.a.r. l – Mercato Saraceno (FC)		
21. Spigno li Maurizio – Bagno di Romagna (FC)		
22. I GRIFONI di Sampaoli e Tizzanini – Bagno di Romagna (FC)		

24. Nuti Aldo – Verghereto (FC)
25. Biserni Carlo – Verghereto (FC)
26. Biserni Franco – Verghereto (FC)
27. Canestrini Edoardo – Verghereto (FC)
28. Rossi Bonfiglio – Verghereto (FC)
29. Soc. Agr. La Bigotta – Casteldelci (RN)
30. Gabrielli Emole – Casteldelci (RN)
31. Zani Monica – Maio lo (RN)
32. Cesarini Chiara – Pennabilli (RN)
33. Az. Agr. Angelina di Sabbatani Daniele – Alfonsine (RA)
34. Sartoni Sergio – Brisighella (RA)
35. Perin Emma – Faenza (RA)



CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE

Deriva dalle popolazioni eteromorfe presenti nella dorsale dell'Appennino attraverso un'opera di selezione iniziata nella metà degli anni '70 del secolo scorso. E' diventata razza nell'anno 1980 con decreto dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Oggi rappresenta una entità ben adattata con l'ambiente e quindi di rilevante importanza per la sua rusticità intesa come capacità di sfruttare risorse foraggere anche in zone disagiate e come adattabilità ad essere allevata in ambienti diversi.

L'Appenninica attuale si differenzia notevolmente dalla popolazione Appenninica originaria, che veniva denominata con nomi locali diversi: Vissana, Casentinese, Senese delle Crete, Barisciana, Pagliarola, Pomarancina, Perugia del Piano.

L'Appenninica attuale è il prodotto del miglioramento avvenuto dopo gli anni ottanta con l'uso di arieti di notevole taglia che hanno aumentato la mole e quindi migliorato da un punto di vista quantitativo la produzione di carne.

ZONA TIPICA DI PRODUZIONE

Gli allevamenti oltre che nell'Umbria e nella Toscana sono diffusi in altre regioni circostanti: Lazio Marche, Romagna, Abruzzo coinvolgendo pertanto seppur in maniera numericamente, diverse province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Firenze, Grosseto, Pisa, Siena, Perugia, Terni Pesaro-Urbino, Rieti, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Teramo.

Consistenza: al momento risultano iscritti al Libro Genealogico circa 8.465 capi ripartiti in 190 allevamenti.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (2007) Elenco delle razze minacciate.

MORBIDINI, L., PANELLA, F., SARTI, D.M., SARTI, F.M. (1995) - Caratteristiche delle carcasse di agnelli Appenninici dei due sessi macellati a 40,60 e 100 giorni di età. Atti dell'XI Congr. Naz. ASPA. Grado, 19-22 giugno, 317-318.

MORBIDINI, L., SARTI, D.M., SARTI, F.M. (1995) - Qualità delle carcasse e caratteristiche fisiche delle carni di agnelli pesanti Appenninici. Atti dell'XI Congr. Naz. ASPA. -Grado, 19-22 giugno, 319-320.

PANELLA, F., SARTI, F.M. (1999) - Schemi di selezione per le razze ovine. L'Allevatore di Ovini e Caprini. - 16, 11, 4.

REGIONE DELL'UMBRIA, E.S.A.U., ASSOCIAZIONE AGRUMBRIA, C.C.I.A.A. PERUGIA (1989) Raccolta di ricette per degustare l'agnello pesante appenninico.

SARTI D.M., PANELLA, F., PAUSELLI M., SARTI, F.M., LAS AGNA E. (2000) - L'allevamento degli ovini. Moderne tecniche per produzioni di qualità. - Il Divulgatore. n.4/5, Edagricole.

SARTI, D. M. (2002) - L'Appenninica : passato, presente, futuro. L'Allevatore di Ovini e Caprini - 18, 3, 2.

SARTI, D.M. (1997) - L'Appenninica : situazione attuale e prospettive. L'Allevatore di Ovini e Caprini. -- 14, 12, 1-2.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA STANDARD

Aspetto generale e caratteristiche della razza

Taglia:	Medio - grande
Tronco:	Il tronco è relativamente lungo con altezza al garrese quasi pari a quella della groppa il petto è largo e la groppa ha un buon sviluppo sia in larghezza che in lunghezza.
Testa:	La testa è acorne, non eccessivamente pesante, con profilo rettilineo o leggermente arcato, le orecchie di media lunghezza portate orizzontali o leggermente pendenti e cadenti
Collo:	Il collo è di media lunghezza, ben attaccato alle spalle.
Arti:	Gli arti sono solidi e relativamente lunghi
Vello:	Bianco, aperto o semiaperto, con testa, parte ventrale del collo, basso ventre e arti nudi
Pelle e Pigmentazione:	Pelle e mucosa rosee

2 - PESI

Maschio:	78 kg
Femmina	56 kg

Difetti gravi

Dati biometrici	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	77	69
Altezza alla groppa (cm)	77	70
Altezza toracica (cm)	35	32
Larghezza media groppa (cm)	25	24
Lunghezza tronco (cm)	79	73
Circonferenza toracica (cm)	95	87

Caratteri produttivi

E' una razza a triplice attitudine, oggi a preminente attitudine alla produzione di carne. Alcuni allevamenti di medie dimensioni la utilizzano anche per la produzione di latte per la trasformazione in formaggi tipici, pecorino e ricotta in particolare. La produzione di latte indicativa è di litri 100- 120 con 6-7% di grasso e la massima parte viene poppato dagli agnelli.

La produzione annuale di lana è di circa 2,5 kg negli arieti e 1,5 kg nelle femmine, del tipo grossolana da materasso.

Caratteri riproduttivi

L'età media al primo parto è di 16 mesi. Presenta cicli estrali durante tutto l'anno e si ottengono solitamente due parti ogni tre anni, con un buon tasso di gemellarità.

Fertilità (rapporto tra le pecore partorite e le pecore avviate alla monta): 90%

Prolificità (rapporto tra gli agnelli nati e le pecore partorite): 129%

Fecondità annua (rapporto tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine):

A) per le pecore che partoriscono una volta all'anno: 116%

B) per le pecore che partoriscono 3 volte ogni 2 anni: 170%

Indirizzo di miglioramento

Pur non trascurando i caratteri di resistenza, di rusticità e le attività produttive del latte e della lana, l'indirizzo di miglioramento è quello di esaltare la produzione di carne, cercando fra l'altro di aumentare la prolificità.

Scelta dei riproduttori

Defetti tollerabili: parziale presenza di ciuffo in fronte, di lana nella parte ventrale del collo, nel basso ventre e nelle parti prossime degli arti; profilo leggermente montonino sia nei maschi che nelle femmine;

Defetti da eliminare: macchie al vello di qualsiasi colore. Pigmentazione della faccia, delle aperture naturali, dell'addome e degli arti; arti eccessivamente lunghi e corti. Profilo decisamente montonino, orecchie troppo lunghe e pendenti. Corna ancorché accennate sia nei maschi che nelle femmine.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA OVINO			
CORNA maschio		ORECCHIE	
assenti	X	assenti	
spiralate		piccole	
falcetta		erette	
elicoidali aperte		semi erette	
punte convergenti		semi pendenti	X
punte divergenti		pendenti	
		grandi	
		medie	X
CORNA femmina		piccole	
assenti	X	con apice ripiegato	
falcetta		apice arrotondato	
elicoidali		apice appuntito	
punte convergenti		MANTELLLO	
punte divergenti		monocolore	X

LANA		bicolore	
aperta	X	pezzato regolare	
semiaperta	X	pezzato irregolare	
semichiusa		LANA	
chiusa		con ciuffo frontale	
PROFILO FRONTE		coprente il ventre	
	X		X

		ventre	
convesso	X	lana sulle parti distali arti	
Iperconvesso (montonino)		collo slonato	
TAGLIA		CODA	
piccola		lunga	X
media	X	corta	
grande		con lipoma	
GIOGAIA		CARATTERI sex secondari	
presente		Maschio con pieghe frontonasali	
assente	X	Maschio senza pieghe frontonasali	X
COLORE TESTA		COLORE MUCOSE bocca musello	
uniforme bianco	X	roseo	X
uniforme rosso		macchiettato	
uniforme giallo		pigmentato	
picchiettato			
maculato			
pezzato			
presenza di occhiaie			
lista sulla fronte			