



L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI  
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

**SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO (revisionata)**

**OVINO CORNIGLIESE RER A007**

<b>Famiglia:</b> <i>Bovidae</i>		<b>Genere:</b> <i>Ovis</i>		<b>Specie:</b>	
<b>Nome comune:</b> Cornigliese			<b>Codice iscrizione Registro nazionale:</b>		
<b>Sinonimi accertati:</b> del Corniglio					
<b>Sinonimie errate:</b>					
<b>Denominazioni dialettali locali</b>					
Data inserimento nel repertorio:					
<b>Accessioni valutate</b>				<b>N. riproduttori</b>	
<b>Anno d'insediamento</b>					
Az. Agr					
<b>Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:</b>					
<b>Allevamenti incaricati della moltiplicazione:</b>					
					



### **CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE**

Popolazione originaria dell'alto Appennino parmense, prende il suo nome dal paese d'origine, Corniglio, situato a circa 1200 metri di altezza. Fu ottenuta alla metà del Settecento dai Borboni di Parma mediante l'incrocio fra una popolazione ovina locale e la razza spagnola Merinos, introdotta per migliorare la qualità della lana, a quei tempi il prodotto più apprezzato della pecora. Agli inizi del Novecento ne fu aumentata la mole per ottenere una maggiore produzione di carne mediante l'immissione di arieti di razza Bergamasca. L'allevamento tradizionale era quello transumante e i greggi passavano l'inverno nella pianura emiliana e lombarda, per ritornare poi con la stagione favorevole nei pascoli di montagna. Attualmente solo pochi pastori praticano ancora la transumanza verso la pianura e preferiscono stabulare gli animali durante il periodo più freddo. (Bigi D., Zanon A.;2008)

E' denominata anche "Mucca di Corniglio", perchè surrogava la vacca nelle zone più difficili, grazie alla buona attitudine per la produzione di latte. Originariamente era a triplice attitudine, mentre oggi viene allevata prevalentemente per la produzione della carne nel parmense e nel reggiano, mentre nel modenese e bolognese, oltre che per la produzione dell'agnello, viene impiegata anche per la produzione di latte destinato alla caseificazione di formaggi tipici.

E' una razza rustica e robusta presenta buona versatilità in ogni condizione climatica ed ambientale, abituata com'è alle zone collinari calanchive dell'Emilia Romagna, caratterizzate da forte siccità estiva ed inverni rigidi. E' in corso un programma di studio e caratterizzazione della razza attuato dall'Università di Bologna in collaborazione con l'associazione RARE e la Provincia di Modena. (Bigi D., Zanon A.;2008)

### **ZONA TIPICA DI PRODUZIONE**

La Cornigliese è allevata nella parte montagnosa delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna e Ravenna. Alcuni greggi transumanti trascorrono l'inverno nella pianura ferrarese.

### **BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO**

- BALDELLI LA ZOOTECNIA BIOECOLOGICA EDAGRICOLE 1999  
MANETTI C. GEOGRAFIA ZOOTECNICA ITALIANA BATTIATO EDITORE 1925  
GUARDASONI M. LEZIONI DI ZOOTECNIA SPECIALE CASANOVA 1954

## DESCRIZIONE MORFOLOGICA

### STANDARD - Aspetto generale e caratteristiche della razza

#### 1 - FORMA

<b>Tronco:</b>	Il tronco è lungo; il petto e la groppa sono larghi, con masse muscolari compatte. La mammella è ben sviluppata, sostenuta, spugnosa, con capezzoli lunghi e divaricati.
<b>Testa:</b>	La testa è acorne, con profilo montonino, più o meno picchiettata e macchiata di nero; le orecchie sono lunghe, larghe e cadenti lateralmente.
<b>Collo:</b>	Il collo è di media lunghezza, forte, ben attaccato alle spalle.
<b>Arti:</b>	Gli arti sono robusti e ben piantati, più o meno picchiettati e macchiati di nero.

#### 2 - PESI

<b>Maschio:</b>	100 kg
<b>Femmina</b>	75 kg
<b>Difetti gravi</b>	

#### IV – VELLO E CUTE

Il vello è bianco, con eventuali macchie , ricoprente anche il ventre, la parte superiore degli arti e parzialmente la testa, a lana semifine compatta. La pelle abbondante nella regione della gola.

Pecora di taglia grande

<b>Dati biometrici</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Altezza al garrese (cm)	85	75

### **Caratteri produttivi**

E' una razza a triplice attitudine, oggi maggiormente allevata per la produzione di carne grazie alla mole grande e alle masse muscolari compatte e alla contenuta adiposità. La razza si presta ottimamente per la produzione di agnelloni e castrati.

Alcuni allevamenti di medie dimensioni la utilizzano anche per la produzione di latte per la trasformazione in formaggi tipici, pecorino e ricotta in particolare. La lattazione dura circa 180 gg., con produzione complessiva per capo di circa 160 litri con il 8% di grasso e il 6,5% di proteine.

La produzione annuale di lana è di circa 6 kg negli arieti e 4 kg nelle femmine, del tipo compatto semifine.

### **Caratteri riproduttivi**

L'età media al primo parto è di 15 mesi. Presenta cicli estrali durante tutto l'anno e si ottengono solitamente due parti ogni tre anni, con un buon tasso di gemellarità.

### **DESCRIZIONE MORFOLOGICA OVINO**

<b>CORNA maschio</b>		<b>ORECCHIE</b>	
assenti	X	assenti	

spiralate		piccole	
falcetta		erette	
elicoidali aperte		semi erette	
punte convergenti		semi pendenti	
punte divergenti		pendenti	X
		grandi	X
		medie	
<b>CORNA femmina</b>		piccole	
assenti	X	con apice ripiegato	
falcetta		apice arrotondato	X
elicoidali		apice appuntito	X
punte convergenti		<b>MANTELLO</b>	
punte divergenti		monocolore	X
<b>LANA</b>		bicolore	
aperta		pezzato regolare	
semiaperta		pezzato irregolare	
semichiusa	X	<b>LANA</b>	
chiusa		con ciuffo frontale	X
<b>PROFILO FRONTE</b>		coprente il ventre	X
rettilineo		non coprente il ventre	
convesso	X	lana sulle parti distali arti	
Iperconvesso (montonino)		collo slonato	
<b>TAGLIA</b>		<b>CODA</b>	
piccola		lunga	X
media		corta	
grande	X	con lipoma	
<b>GIOGAIA</b>		<b>CARATTERI sex secondari</b>	
presente	X	Maschio con pieghe frontonasali	X
assente		Maschio senza pieghe frontonasali	
<b>COLORE TESTA</b>		<b>COLORE MUCOSE bocca musello</b>	
uniforme nero		roseo	X
uniforme rosso		macchiettato	X
uniforme giallo		pigmentato	