



L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEMA TECNICO PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO

GIAMBELLA RER V0158

CILIEGIO DOLCE		
Famiglia: <i>Rosaceae</i>	Genere: <i>Prunus</i>	Specie: <i>Prunus avium</i> L.
Nome comune: Giambella		
Sinonimi accertati: Ciambella, Ciambellana, Ciliegia a cuore, Zambella		
Sinonimie errate:		
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>): Giambèla (PR)		
Rischio di erosione: medio-elevato		
Data inserimento nel repertorio:		Ultimo aggiornamento scheda: 24/05/2014
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda	N. piante presenti	Anno d'impianto
1) Vivaio Scodogna Collecchio (PR)	1	2005
Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>: Vivaio Scodogna Collecchio (PR)		
		
<i>Pianta</i>	<i>Fiore</i>	



Foglia



Frutto

CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE

Origine incerta. Da indicazioni orali di alcuni storici, la varietà era già presente nell'elenco delle piante coltivate nell'orto botanico della Scuola di Agraria presieduta dal conte Filippo Re a Bologna nel 1809. Successivamente altre testimonianze risalgono al 1871 quando viene citata dal Bertolon, sempre relativamente al bolognese, sul Bollettino dei locali Comizi Agrari. Nuovamente si trova indicata a Reggio Emilia dal Casali nel 1915. Indi ancora a Modena nel 1932 ed in questa occasione questa varietà locale era messa in ombra dalle varietà di ciliegie vignolesi. Nel parmense le prime testimonianze bibliografiche risalgono al 2002. Alberi vecchi sono stati trovati nel territorio emiliano e agricoltori ricordano la coltivazione di questa varietà da molto tempo soprattutto nel territorio di Lagrimone, Tizzano, Langhiano e Neviano degli Arduini.

ZONA TIPICA DI PRODUZIONE

Ciliegia diffusa un po' in tutte le provincie emiliane, soprattutto da Bologna a Parma. Nel territorio ducale trova diffusione principalmente nella zona montana. Gli esemplari si sono trovati principalmente nei comuni di Tizzano, Lagrimone, Neviano degli Arduini e Langhirano.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO







- AA. VV., 2006, "Frutta e Buoi...Quaderno della Biodiversità Agricola Parmense", edizioni Gruppo Cabiria
- Melegari E., 2002 "Raccolta delle antiche varietà di frutti locali, rustici di albicocco, di susino, di pesco, di ciliegio, di vite e di frutti minori", Dispensa ITAS "Bocchialini", Parma.
- Attolini M., 2003 "I vecchi Frutteti di Reno", Comunità Montana Appennino Parma Est.
- Dichiarazione di Autoctonia redatta dalla Provincia di Parma il 28/4/2011.







NOTE


Nella maggior parte dei frutti l'estremità mucronata. Non si conoscono in passato coltivazioni specializzate di questa ciliegia. Era probabilmente coltivata a livello familiare per il consumo domestico, anche se per la sua conservabilità, pezzatura e sapore, alcuni autori la ritengono adatta alla coltivazione a fini commerciali. Le ridotte testimonianze bibliografiche locali sono da imputare alla scarsa vocazionalità frutticola del territorio di Parma che aveva i frutteti sparsi nella campagna spesso come alberi maritati alle viti oppure attorno a casa e quindi rendevano questo comparto non importante a livello commerciale e quindi poco citato in passato.




DESCRIZIONE MORFOLOGICA. I descrittori prioritari secondo il Gruppo di lavoro GIBA e i descrittori essenziali indicati da UPOV e IBPGR sono segnalati con un asterisco (*) e rappresentano gli elementi necessari per l'iscrizione di una risorsa genetica ad un repertorio della biodiversità.

PIANTA. Osservazioni possibilmente su più piante; le foglie si osservano in estate, quando ben sviluppate, sul terzo mediano

UPOV1 IBPRG6.1.2	VIGORE DELL'ALBERO*	UPOV2 IBPRG -	PORTAMENTO*	UPOV6 IBPRG -	RAMO DI 1 ANNO: LUNGHEZZA INTERNODI *	
1	Molto debole (Compact stella, Compact Van)		1 – Eretto (Lapins)		1 – Normale (Burlat) <input checked="" type="checkbox"/>	
3	Debole (Sumpaca)		2 – Semi-eretto (Burlat, Napoléon) <input checked="" type="checkbox"/>			
5	Media (Kordia, Stella, Sumtare)		3 – Espanso (Sumtare, Vega, Vera)		2 – Corto (Compact Lambert, Compact Stella)	
7	Elevata (Hedelfinger) <input checked="" type="checkbox"/>		4 – Ricadente/pendulo (Annabella, Jaboulay)			
9	Molto elevata (Regina)					
UPOV7 IBPRG -	RAMO DI 1 ANNO: NUMERO DI LENTICELLE	UPOV40 IBPRG -	EPOCA DI INIZIO FIORITURA*	UPOV11 IBPRG -	FOGLIA: RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA *	
3	Poche (Kordia, Sam)	1	Molto precoce (Kronio)	3	Piccolo (Hudson)	
		3	Precoce (Lapins, Sumtare, Marmotte)			
5	Medie (Hedelfinger, Van) <input checked="" type="checkbox"/>	5	Media (Merton Glory, Napoléon, Sumere) <input checked="" type="checkbox"/>	5	Medio (Bing, Merton Crane)	
7	Molte (Krupnoplodnaya)	7	Tardiva (Germerdorfi45, Reverchon)	7	Grande (Hedelfinger, Sylvia, Vanda) <input checked="" type="checkbox"/>	
		9	Molto tardiva (Regina)			
UPOV13 IBPRG -	FOGLIA: LUNGHEZZA DEL PICCIOLO*	UPOV15 IBPRG -	FOGLIA: PRESENZA DI NETTARI*	UPOV - IBPRG6.2.2	FIORE: AUTOCOMPATIBILITÀ*	
3	Corto (Sylvia, Van)	1	Presenti	0	Autoincompatibile (Big Burlat)	
5	Medio (Sam, Stella) <input checked="" type="checkbox"/>		9	Assenti <input checked="" type="checkbox"/>	1	Autocompatibile (Lapins) <input checked="" type="checkbox"/>
7	Lungo (Merton Crane)					

FIORE					
UPOV17 IBPRG -	FIORE: DIAMETRO	UPOV18 IBPRG -	FIORE: FORMA PETALI*	UPOV19 IBPRG -	FIORE: DISPOSIZIONE PETALI
3	Piccolo (Anita)		1 – Circolare (Kordia) <input checked="" type="checkbox"/>		1 – Liberi (Burlat, Sunburst)
5	Medio (Sylvia, Van) <input checked="" type="checkbox"/>		2 – Mediamente obovata (Burlat, Sun burst)		2 – Intermedi (Germerdorfi45, Van) <input checked="" type="checkbox"/>
7	Largo (Aida, Burlat)		3 – Obovata larga (Van, Hedelfinger)		3 – Sovrapposti (Hudson)

FRUTTO. Osservazioni a maturazione. Media di 30 frutti ben conformati					
UPOV41 IBPRG -	FRUTTO: EPOCA DI INIZIO MATURAZIONE *	UPOV20 IBPRG 6.3.2	FRUTTO: DIMENSIONE*	UPOV21 IBPRG6.2.4	FRUTTO: FORMA*
1	Molto precoce (Cristoballina, Kronio)	1	Molto piccolo (Guigne Bechat)		1 – Cordata (Kordia, Summit) <input checked="" type="checkbox"/>
3	Precoce (Burlat, Early Rivers)	3	Piccolo (Zuccherina di Bitonto)		2 – Reniforme (Van, Vera)
5	Media (Guillaume, Sunburst) <input checked="" type="checkbox"/>	5	Medio (Early Rivers, Schmidt) <input checked="" type="checkbox"/>		3 – Oblata (Alex, Burlat)
7	Tardiva (Hedelfinger, Katalin)	7	Grande (Burlat, Rainier)		4 – Rotonda (Germersdorfi45, Reverchon)
9	Molto tardiva (Hudson, Regina, Vittoria)	9	Molto grande (Duron 3, Sunburst)		5 – Ellittica (Hedelfinger)
UPOV22 IBPRG -	FRUTTO: ESTREMITÀ PISTILLARE	UPOV23 IBPRG -	FRUTTO: SUTURA*	UPOV24 IBPRG6.2.12	FRUTTO: LUNGHEZZA DEL PICCIOLO*
	1 – A punta (Guillaume, Kavics) <input checked="" type="checkbox"/>	1	Assente o molto poco evidente (Hedelfinger)	1	Molto corto (Van)
	2 – Piatto (Hedelfinger, Van)	2	Poco evidente (Germersdorfi 45) <input checked="" type="checkbox"/>	3	Corto (Burlat)
	3 – Depresso (Reverchon, Sunburst)	3	Molto evidente (Burlat, Rita)	5	Medio (Hedelfinger, Sunburst) <input checked="" type="checkbox"/>
				7	Lungo (Kordia, Noire de Meched)
				9	Molto lungo (Delflash)
UPOV26 IBPRG -	FRUTTO: STRATO DI ABSCISSIONE TRA PEDUNCOLO E FRUTTO*	UPOV27 IBPRG 6.4.4	FRUTTO: COLORE DELLA BUCCIA*		
1	Assente <input checked="" type="checkbox"/>	1	Giallo (Bigarreau d'Or, Blanc de Bordeaux)	5	Rosso (Alex, Sunburst)
		2	Giallo con sfumature rosse (Napoléon, Vega)	6	Rosso-bruno (Burlat, Kordia, Lapins)
9	Presente	3	Arancio-rosso (Tardiva di Vignola)	7	Rosso scuro (Hedelfinger, Stella)
		4	Rosso chiaro (Signora, Krupnoplodnaya) <input checked="" type="checkbox"/>	8	Nerastro (Precocissima di Montecatini, Roana tardiva, Bassanese)
UPOV29 IBPRG -	FRUTTO: NUMERO DI LENTICELLE SULLA BUCCIA	UPOV31 IBPRG6.2.6	FRUTTO: COLORE DELLA POLPA*	UPOV32 IBPRG6.2.5	FRUTTO: COLORE DEL SUCCO
3	Poche (Burlat, Rita) <input checked="" type="checkbox"/>	1	Crema (Napoléon)	1	Incolore (Bianca, Bianca di Verona) <input checked="" type="checkbox"/>
		2	Giallo (Dönnissens Gelbe) <input checked="" type="checkbox"/>	2	Giallo chiaro (Napoléon)
		3	Rosa (Reverchon, Sunburst)	3	Rosa (Reverchon, Sunburst)
5	Medie (Sunburst)	4	Rosso medio (Germers- dorfi 45, Hedelfinger)	4	Rosso (Sam, Van)

7	Molte (Marmotte, Vera)	5	Rosso scuro (Rubin, Szomolyai fekete)	5	Purpureo (Hedelfinger)
UPOV33 IBPRG.6.2.9	FRUTTO: CONSISTENZA DELLA POLPA*	UPOV34 IBPRG -	FRUTTO: ACIDITÀ	UPOV35 IBPRG -	FRUTTO: DOLCEZZA
3	Soffice (Early Rivers)	3	Bassa (Müncheberger Frühernte, Burlat)	3	Bassa (Burlat, Early Lory)
5	Media (Kordia, Sunburst) <input checked="" type="checkbox"/>	5	Media (Napoléon, Van) <input checked="" type="checkbox"/>	5	Media (Sunburst) <input checked="" type="checkbox"/>
7	Soda (Reverchon, Van)	7	Alta (Sunburst)	7	Alta (Kordia, Bianca)
9	Molto soda (Kavics, Sumtare)				
UPOV37 IBPRG -	NOCCIOLO: DIMENSIONE*	UPOV38 IBPRG -	NOCCIOLO: FORMA IN SEZIONE VENTRALE*	UPOV39 IBPRG -	RAPPORTO PESO FRUTTO/PESO NOCCIOLO*
3	Piccolo (Hedelfinger, Van)		1 – Mediamente ellittico (Kordia, Napoléon)	3	Piccolo (Müncheberger Frühernte)
5	Medio (Burlat, Germersdorfi 45) <input checked="" type="checkbox"/>		2 – Ellittico largo (Knauffs, Rita) <input checked="" type="checkbox"/>	5	Medio (Hedelfinger, Reverchon) <input checked="" type="checkbox"/>
7	Grande (Guillaume, Merton Glory)				
9	Molto grande (Valerij Chkalov, Carmen)		3 – Rotondeggiante (Germersdorfi 45, Van)	7	Grande (Sunburst, Vera)
OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
Peso medio, minimo e massimo su un campione di 10 frutti: ...50-75 g..... Indicazioni su epoca di fioritura e maturazione: maturazione media, indicativamente 15-20 giugno a 600 m o prima decade di giugno in pianura. Fioritura nella media.					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
Si segnala una certa resistenza allo spacco (A), invece sembra essere sensibile alla mosca delle ciliegie (L).					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
Consumo fresco prevalentemente, anche se in qualche caso era utilizzata per la conservazione sotto spirito o per la produzione di marmellate (A).					