

L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO

VACAZZA ZABEO RER V0113

SUSINO EUROPEO [E DAMASCHINE (*Prunus insititia*)]

Famiglia: <i>Rosaceae</i>	Genere: <i>Prunus</i>	Specie: <i>Prunus domestica</i> L.	
Nome comune: Vacazza Zabeo			
Sinonimi accertati: Vacaza Zabeo, Vaca Zabeo; Favorita del Sultano, Giant, Borsa del Bricco			
Sinonimie errate: Zucchella, Prugna di Lentigione			
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>):			
Rischio di erosione: elevato			
Data inserimento nel repertorio:		Ultimo aggiornamento scheda:	
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda		N. piante presenti	Anno d'impianto
1) accessioni in località Ceparano, Faenza (Ra)		2	2005
Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:			
			
<i>Pianta</i>		<i>Fiore</i>	



Foglia



Frutto

CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE

Di questa varietà è stata riscontrata una pletera di denominazioni: *Vacazebeo*, *Vacaza Zebeo*, *Vacazza Zabeo*, *Vacazaebeo*, *Vacca Zebeo*, *Vacazza Zabbeo*.

Il nome “*Vacazza Zabeo*” appare per la prima volta nel 1920 in un catalogo di vivaisti padovani, gli Sgaravatti di Saonara (PD), accompagnato da poche informazioni: la disponibilità di piante ad alto fusto, la maturazione agostana, e la nota che la varietà in questione era conosciuta da tempo.

La definizione in Romagna di una prugna come “*Vacca*” sembra essere limitata alle prugne europee del tipo Regina Claudia (tale uso semantico non sembra essere diffuso in altre zone d’Italia); “*Zabeo*”, al contrario, è un cognome quasi esclusivo delle province di Venezia e Padova, e oggi quasi assente in Romagna. La degeminazione consonantica, ovvero l’indebolimento della doppia “*c*” gutturale in una singola, pur essendo presente in dialetto romagnolo, è tipica anche di tutto il nord Italia, dove il latino *vacca* ha dato *vaca*.

Lo slittamento della “*c*” palatale a “*z*”, tipico della Romagna ma non esclusiva di questo territorio, non è diffuso nel Padovano. Tuttavia, anche qui ci aspetteremmo in dialetto puro un’altra degeminazione della doppia, per cui avremmo una “*Vacaza*”, mentre “*Vacazza*” sembra più una “traduzione” della forma dialettale in quella italiana, ovvero un modo per trasportare la pronuncia romagnola, ma anche qualsiasi altra pronuncia dialettale, in qualcosa che lo scrivano credeva, o sperava, essere italiano.

Agli inizi degli anni ’30, ritroviamo la varietà in Puglia tra le “*Pappacone*” o “*Pappacode*” baresi ancora sotto il nome di “*Cazza*” o “*Vacazza Zabbeo di Monopoli*” (Pantanelli, 1936). Anche le “*Pappacone*” sono prugne europee leggermente allungate, per lo più di maturazione tra agosto e settembre, quindi identificabili con le “*Damaschine*” diffuse nel meridione continentale. Oltre al raddoppiamento della “*b*”, che indica un inserimento nel territorio locale da un certo lasso di tempo, è da notare la grafia alternativa “*Cazza*” che conferma ancora una volta la particolarità dello slittamento da “*c*” palatale a “*z*”. Dobbiamo tenere presente che il trasferimento di maestranze romagnole in Puglia è un fatto verbalmente più volte segnalato, anche se in assenza di conferme bibliografiche, con scambi anche di materiale genetico, soprattutto di ciliegio. Alla fine degli anni ’60, la varietà compare nei listini delle prime cooperative ortofrutticole romagnole.

Volendo sintetizzare, tutte queste informazioni sembrano indicare una prugna europea allungata, tardiva, a buccia relativamente sottile, con un nome romagnolo per semantica e grammatica; una prugna “*Vacca*” o “*Vaccaccia*”, che, arrivando in Veneto a fine Ottocento, si qualifica come particolarmente legata ad un tale “*Zabeo*” divenendo quindi la “*Vaccaccia di Zabeo*”, e di qui, in qualche modo, viene diffusa in una zona della Puglia barese, da cui passa in Romagna negli anni ’60.

POSSIBILI SINONIMIE

La varietà è stata inserita a suo tempo negli elenchi regionali delle vecchie varietà per la sua affinità al gruppo delle susine “*Zucchelle*”, di antico insediamento sul territorio e ampiamente diffuso da Piacenza a Ferrara. Di recente, però, tale appartenenza è stata messa in dubbio dalle analisi genetiche condotte dall’Università di Bologna (Grandi et al., 2009), che indagando sulle prugne del gruppo delle “*Zucchelle*” provenienti da diverse parti della Regione, attribuisce le varietà tipiche delle province orientali - non viene citata espressamente *Vacazza Zabeo*, ma i suoi sinonimi *Favorita*, *Favorita del Sultano*, *Borsa del Bricco* - a un altro gruppo non “autoctono” e geneticamente affine alla californiana *Giant*, come peraltro già si sospettava da tempo. Le analisi

genetiche condotte da CRA-FRF, Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Forlì, non hanno evidenziato differenze nei profili molecolari di *Vacazza Zabeo* e *Giant*.

ZONA TIPICA DI PRODUZIONE

La sua presenza nel territorio romagnolo risale agli anni '60, ed è pertanto relativamente recente. *Vacazza Zabeo* è sconosciuta, sotto questo nome, nelle altre regioni italiane. Piuttosto diffusa fino alla fine degli anni '80, si è molto ridimensionata causa dei numerosi abbattimenti di vecchi impianti da parte dei frutticoltori locali.

Nel 2012 sono state censite 5 aziende (per un totale di 10 piante) che nella provincia di Forlì-Cesena coltivano la varietà *Vacazza Zabeo*. Nelle aziende frutticole delle provincie di Rimini e Forlì-Cesena, è tuttavia molto diffusa la presenza, anche se in pochi esemplari ad uso familiare, di piante che per caratteristiche agro-pomologiche ed epoca di maturazione sono del tutto simili a *Vacazza Zabeo*.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Basso M., Faccioli F. (1978). Le principali prugne coltivate in Italia. Bologna
- Bevilacqua G. (1963). Dati e notizie su alcuni settori frutticoli e vitivinicoli della regione emiliana: anno 1962. Relazione presentata all'Accademia nazionale di agricoltura nella pubblica adunanza del 16 febbraio. Compositori-Bologna, 1963
- Consolani E., Manaresi A. (1947) - Aspetti e problemi della frutticoltura in ordine alla ricostituzione. Atti del I convegno emiliano-romagnolo "Ricostruzione agricola e forestale" Bologna, 13-15 dicembre.
- F.lli Sgaravatti (1920) - Catalogo. Saonara, Padova
- Grandi M., Grandi M., Lugli S., Venturi S., Sansavini S. (2009) - La "Prugna di Lentigione": una proposta di ridenominazione reggiana della varietà Zucchella. "Frutticoltura", 5:28 – 33.
- Pantanelli E. (1936). La frutticoltura in terra di Bari. Gius. Laterza e figli, Bari

NOTE

Scheda e foto a cura di S. Tellarini, Giovannini D., Missere D., Buscaroli C.









DESCRIZIONE MORFOLOGICA. I descrittori prioritari secondo il Gruppo di lavoro GIBA e i descrittori essenziali indicati da UPOV sono segnalati con un asterisco (*) e rappresentano gli elementi necessari per l'iscrizione di una risorsa genetica ad un repertorio della biodiversità.





PIANTA. Osservazioni possibilmente su più piante; le foglie si osservano in estate, quando ben sviluppate, sul terzo mediano

UPOV 1	VIGORIA DELL'ALBERO*	UPOV -	PORTAMENTO DELL'ALBERO*	UPOV 5	RAMO DI 1 ANNO: LUNGHEZZA INTERMEDIO
3	Debole (Ruth Gerstetter)	1	Colonnare	3	Corto (California blue)
		2	Assurgente/eretto (Jefferson) ✓		
5	Media (Felsina, Victoria) ✓	3	Semiretto/globoso (Casalinga)	5	Medio (Anna Späth, Regina ✓ Claudia verde)
		4	Espanso (Jori's Plum, Imperial Plum)		
7	Elevata (Valor)	5	Pendolo/ricadente (Laxton Delight)	7	Lungo (Regina Claudia di Bavay)
UPOV 6	RAMO DI 1 ANNO: TOMENTOSITÀ ultimo terzo*	UPOV 9	RAMO DI 1 ANNO: FORMA DELLE GEMME A LEGNO*	UPOV 17	FOGLIA: RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA*
3	Debole (d'Ente, Felsina) ✓		1 – Acuta (Anna Späth) ✓	3	Piccolo (Valor)
5	Media (Regina Claudia verde)		2 – Ottusa (Reine Claude d'Oullins)	5	Medio (D'Ente) ✓
7	Elevata (The Czar)		3 – Arrotondata (Herman)	7	Grande (Anna Späth, Hauszwetsche)
UPOV 18	FOGLIA: FORMA*	UPOV 19	FOGLIA: ANGOLO DELL'APICE	UPOV 20	FOGLIA: FORMA DELLA BASE*
	1 – Ovata (Favorita del Sultano)		1 – Acuto (Anna Späth, Damson Prune)		1 – Acuta (Katinka, Top, Verity) ✓
	2 – Ellittica (d'Ente)		2 – Retto (d'Ente)		2 - Ottusa (Anna Späth, Hanita)
	3 – Obovata (Hanita) ✓		3 – Ottuso (Graf Brühl, Pershore) ✓		3 – Tronca (Marjorie's Seedling)
UPOV 23	FOGLIA: TOMENTO PAGINA INFERIORE	UPOV 24	FOGLIA: DENTATURA DEL MARGINE*	UPOV 25	FOGLIA: LUNGHEZZA PICCIOLO
1	Assente (Regina Claudia verde) ✓		1 – Crenato (Hanita, Reine Claude d'Oullins) ✓	3	Corto (Althanova)
				5	Medio (d'Ente, Felsina) ✓
9	Presente (Anna Späth)		2 – Serrato (Anna Späth)	7	Lungo (Victoria) ✓

UPOV 28	FOGLIA: PRESENZA DI NETTARI	UPOV 61	EPOCA DI INIZIO FIORITURA*		
1	Assente (Anna Späth)	1	Molto precoce (Jori's Plum, Gilbert)		
		3	Precoce (Ruth Gerstetter)		
		5	Media (D'Ente, Regina Claudia verde) ✓		
9	Presente (Vittoria) ✓	7	Tardiva (Anna Späth, Prugna d'Italia) ✓		
		9	Molto tardiva		

FIORE








UPOV 31	FIORE: DIAMETRO *	UPOV 35	FIORE: FORMA DEI SEPALI*	UPOV 36	FIORE: DISPOSIZIONE PETALI*
3	Piccolo (Early Laxton)		Ellittica allungata (Prugna d'Italia)		1 – Liberi (Anna Späth, Prugna d'Italia) ✓
5	Medio (Ruth Gerstetter, ✓Victoria)		Ellittica (Regina Claudia d'Oullins) ✓		
			Ovata (Washington)		2 – Intermedi (Coe's Golden Drop, Empress)
			Ovata arrotondata (Czar)		
7	Grande (Regina Claudia d'Oullins)		Triangolare (Kirke's)		3 – Sovrapposti (Ontario, Ruth Gerstetter)

UPOV38	FIORE: FORMA DEI PETALI*	UPOV42	FIORE: PUBESCENZA DELL'OVARIO*	UPOV62	EPOCA DI INIZIO MATURAZIONE*
	1 – Ellittica (Anna Späth, Opal) ✓	1	Assente (Washington) ✓	1	Molto precoce (Ruth Gerstetter)
	2 – Ellittica larga (Graf Brühl)			3	Precoce (Bonne de Bry)
	3 – Circolare (Czar)	9	Presente (Anna Späth)	5	Media (Regina Claudia verde)
	4 – Obovata (Herman)			7	Tardiva (D'Ente) ✓
				9	Molto tardiva (President)

FRUTTO. Osservazioni a maturazione. Media di 30 frutti ben conformati

UPOV43	FRUTTO: DIMENSIONE*	UPOV44	FRUTTO: FORMA*	UPOV50	FRUTTO: COLORE DI FONDO DELLA BUCCIA*
1	Molto piccolo (Mirabelle de Nancy)		1 – Oblunga (Grand Prize)	1	Bianco-verde (Regina Claudia diafana)
3	Piccolo (Bonne de Bry, Hauszwetsche)		2 – Ellittica (Empress, Victoria)	2	Verde (Regina Claudia verde)
				3	Giallo-verde (Regina Claudia d'Oullins)
5	Medio (Hanita, Stanley)		3 – Sferica (Fortune, Mirabelle de Nancy)	4	Giallo (Coscia di Monaca)
				5	Arancio-giallo (Emma Leppermann)

7	Grande (Regina Claudia ✓ d'Oullins)		4 – Oblata (Althanova)	6	Rosso (Victoria)
				7	Viola chiaro (Opal)
9	Molto grande (Giant)		5 – Ovata (Hanita, Stanley) ✓	8	Porpora-viola (d'Ente) ✓
				9	Viola scuro (Anna Späth)
			6 – Obovata (Elena, President)	10	Viola-blu (Valor)
				11	Blu scuro (Bluefre)
UPOV51	FRUTTO: COLORE DELLA POLPA*	UPOV52	FRUTTO: CONSISTENZA DELLA POLPA*	UPOV53	FRUTTO: DOLCEZZA DELLA POLPA*
1	Bianco	3	Tenera (Ontario)	3	Bassa (Hauszwetsche, Ruth Gerstetter)
2	Verde (Regina Claudia verde)				
3	Giallo-verde (Anna Späth, Ruth Gerstetter)	5	Media (Zucchella)	5	Media (Anna Späth) ✓
4	Giallo (Monsieur Jaune, Giant) ✓				
5	Arancio (Early Transparent)	7	Soda (Opal, President) ✓	7	Alta (Imperial Prune, D'Ente 707)
6	Rosso (Bountiful)				

UPOV54	FRUTTO: ADERENZA DELLA POLPA AL NOCCIOLO*	UPOV55	NOCCIOLO: FORMA IN VISIONE LATERALE*	UPOV56	NOCCIOLO: FORMA IN VISIONE VENTRALE*
1	Non aderente (Ruth Gerstetter)		1 – Ellittico stretto (Drap d'Or d'Espéren) ✓		1 – Ellittico stretto (Hauszwetsche) ✓
2	Semi-aderente (Gilbert, Giant) ✓		2 – Ellittico (Washington)		2 – Ellittico (Washington)
3	Aderente (Jori's Plum)		3 – Circolare (Early Transparent, Mirabelle de Nancy)		3 – Ellittico largo (Regina Claudia verde)
					4 – Cuneiforme (President)

SENSIBILITÀ ALLE PATOLOGIE

	SENSIBILITÀ ALLA MONILIA DEI RAMI (<i>Monilinia laxa</i>)		SENSIBILITÀ ALLA RUGGINE (<i>Transchelia pruni-spinosae</i>)		SENSIBILITÀ A <i>XANTHOMONAS PRUNI</i>
1	Molto scarsa (Bluefre, Opal)	1	Molto scarsa	1	Molto scarsa
3	Scarsa (Zucchella, President)	3	Scarsa (Valor)	3	Scarsa (Regina Claudia verde) ✓
5	Media (Popesti, Timpuri de Albach) ✓	5	Media (Anna Späth)	5	Media (President)
7	Elevata (Early Laxton)	7	Elevata (President, Bluefre)	7	Elevata (Giant)
9	Molto elevata	9	Molto elevata (D'Ente, Zucchella)	9	Molto elevata
	SENSIBILITÀ ALLA SHARKA (PPV)				
1	Molto scarsa				
3	Scarsa (Liablù)				
5	Media (Stanley) ✓				
7	Elevata (President)				
9	Molto elevata (D'Ente)				

OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di

agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

Peso medio su un campione di 30 frutti: 70 g. Taglia contenuta, si raccoglie interamente da terra. Discreta produttività, buona pezzatura dei frutti che sono di forma regolare, e tenuta di maturazione sulla pianta. Le caratteristiche qualitative sono buone soprattutto nelle aree collinare, e anche la serbevolezza è elevata.

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

Varietà idonea per il mercato fresco, per vendita diretta, mercati rionali, agriturismi.