

L.R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO




CAVOLFIORE	
Famiglia: <i>Brassicaceae</i>	Genere: <i>Brassica</i>
Specie: <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	
Nome comune:	
Sinonimi accertati:	
Sinonimie errate:	
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>):	
Rischio di erosione:	
Data inserimento nel repertorio:	Ultimo aggiornamento scheda:
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda	
1) Azienda	
2) Azienda	
3)	
Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:	
Vivaista incaricato della moltiplicazione:	
<i>Foto</i>	<i>Foto</i>
Plantula	Foglia
<i>Foto</i>	

	<i>Foto</i>
<i>Pianta a maturità</i>	<i>Testa, anche in sezione longitudinale</i>
CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE	
ZONA TIPICA DI PRODUZIONE	
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO	
NOTE	

DESCRIZIONE MORFOLOGICA (* descrittori minimi obbligatori)			
PIANTA. Le osservazioni sulla foglia vanno effettuate nel momento di completo sviluppo, prima della formazione della testa e sulla foglia più larga.			
PLANTULA: PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DELL'IPOCOTILE (UPOV 1)*		FOGLIA: PORTAMENTO (UPOV 4)*	
1	Assente (Brio)		1 – Eretto (Igloo, Paradiso)
9	Presente (Ciren, Dominant)		3 – Semieretto (Erfurter Zwerg, Fastman)
			5 – Orizzontale (Isabel, Opaal)
FOGLIA: LUNGHEZZA (UPOV 5)*		FOGLIA: LARGHEZZA (UPOV 6)*	
1	Molto corta	1	Molto stretta (Alverda, Géant de Naples tardif)
3	Corta (Nagano, Opaal)	3	Stretta (Andes, Capvert)
5	Media (Aviso, Fanch)	5	Media (Broden, Lindon)
7	Lunga (Géant de Naples tardif, Snow March, Memphis)	7	Larga (Memphis, Vogue)
9	Molto lunga (Magnifico, Paradiso)	9	Molto larga (Torens)
FOGLIA: RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA (UPOV 7)*		FOGLIA: LOBATURA (UPOV 8)	
3	Compressa (Akita, Geant de Naples tardif)		1 – Assente (Idol)
5	Media (Astell, Buren)		
7	Allungata (Arbon, Lazio)		
FOGLIA: COLORE (UPOV 9) Inclusa la cerosità, se presente		FOGLIA: INTENSITÀ DEL COLORE (UPOV 10)* Inclusa la cerosità, se presente	
1	Verde (Baltimore, Belot, Lecerf)	3	Chiaro (Baltimore, Ciren)
2	Verde grigiastro (Calisa, Delira, Géant de Naples tardif)	5	Medio (Barrier Reef, Belot, Calisa)
3	Verde bluastro (Arbon, Barrier Reef, Ciren)	7	Scuro (Arbon, Lecerf)
TESTA. Le osservazioni vanno effettuate nel momento di completo sviluppo (a maturazione commerciale).			
TESTA: COPERTURA DELLE FOGLIE INTERNE (UPOV 16)		TESTA: ALTEZZA (UPOV 17)*	

1	Non coperta (Capvert, Opaal)		3 – Bassa (Lecerf, Mechelse 2)
2	Parzialmente coperta (Celesta, Eskimo)		5 – Media (Kernis, Tetris)
3	Coperta (Amistad, Charif)		7 – Alta (Amistad, Gitano)

TESTA: DIAMETRO (UPOV 18)*		TESTA: FORMA IN SEZIONE LONGITUDINALE (UPOV 19)*	
3	Piccolo (Alverda, Lumina)		1 – Tondeggiante (Gipsy Moth, Linero)
			2 – Ellittica trasversale larga (Aviron, Melody)
5	Medio (Barrier Reef, Malaga)		3 – Ellittica trasversale (Akita, Celesta)
			4 – Ellittica trasversale stretta (Erfurter, Lecerf)
7	Grande (Fremont, Novia, Plessi)		5 – Triangolare (Minaret, Romanesco ottobrino)
TESTA: CURVATURA DELLA CIMA (UPOV 20)*		TESTA: COLORE (UPOV 21)*	
	3 – Lieve (Burgh, Lecerf)	1	Biancastro (Astell, Iceberg)
		2	Giallo (Di Jesi)
	5 – Media (Akita, Géant de Naples tardif)	3	Arancio (Cheddar, Sunset)
		4	Verde (Alverda, Amfora, Minaret)
	7 – Forte (Belot, White Rock)	5	Violetto (Graffiti)

TESTA: PROTUBERANZE (UPOV 22)		TESTA: TESSITURA (UPOV 23)	
	1 – Molto fini	3	Fine (Boris, Erfurter)
	3 – Fini (Nautilus, Opaal)	5	Media (Beluga, Galiote)
		7	Grossa (Géant de Naples tardif, Niagara)
		La tessitura è considerata "fine" quando la superficie della testa è liscia, e "grossa" quando è granulosa.	
	5 – Medi (Corvilla, Nedeleg)	TESTA: PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DOPO LA MATURAZIONE COMMERCIALE (UPOV 24)	
		1	Assente (Evita, Mantis)
		9	Presente (Flanca, Planita)
	7 – Grossi (Niagara)	FIORE: COLORE (UPOV 25)*	
		1	Bianco (Bruce, Ecrin)
		2	Giallo (Flora Blanca, Lecerf)
	9 – Molto grossi (Minaret, Navona)		

PRECOCITÀ La precocità del cavolfiore è fortemente influenzata dalla temperatura e dall'epoca di semina; essa è una caratteristica fondamentale per stabilire la distinguibilità delle varietà coltivate nello stesso luogo e nella stessa stagione; per questo motivo non sono riportati esempi di varietà per il carattere 26 e 27, e pertanto la descrizione della varietà dovrà sempre indicare il luogo e la stagione di semina.

PRECOCITÀ DELLE VARIETÀ A SEMINA PRIMAVERILE (UPOV 26)*

1	Molto precoce	6	Da media a tardiva
2	Da molto precoce a precoce	7	Tardiva
3	Precoce	8	Da tardiva a molto tardiva
4	Da precoce a media	9	Molto tardiva
5	Media		

PRECOCITÀ DELLE VARIETÀ A SEMINA ESTIVA (UPOV 27)*

1	Tipo autunnale molto precoce	10	Tipo invernale molto precoce
2	Tipo autunnale da molto precoce a precoce	11	Tipo invernale da molto precoce a precoce
3	Tipo autunnale precoce	12	Tipo invernale precoce
4	Tipo autunnale da precoce a medio	13	Tipo invernale da precoce a medio
5	Tipo autunnale medio	14	Tipo invernale medio
6	Tipo autunnale da medio a tardivo	15	Tipo invernale da medio a tardivo

7	Tipo autunnale tardivo	16	Tipo invernale tardivo
8	Tipo autunnale da tardivo a molto tardivo	17	Tipo invernale da tardivo a molto tardivo
9	Tipo autunnale molto tardivo	18	Tipo invernale molto tardivo

STERILITÀ MASCHILE (UPOV 28)*

1	Assente: $\geq 70\%$ piante fertili (Alpha 2, Flora blanca)
2	Parziale: dal 30 al 70% di piante fertili (Dunvez, Odegwen)
3	Presente: $\leq 30\%$ piante fertili (Aviron, Bodilis)

OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

--

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

--

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

--