

Difesa integrata AVENA, SEGALE, ORZO, TRITICALE

| AVVERSITA'   | CRITERI DI INTERVENTO   | S.a. e AUSILIARI  | (1) | (2) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|--|---|---|-----|-----|--------------------------|
| <b>CRITTOGAME</b>  |   |   |     |     |                          |
| <b>Carbone</b><br>( <i>Ustilago</i> spp.)  | <b>Interventi chimici</b><br>ammessa la concia della semente  |   |     |     |                          |
| <b>Oidio</b><br>( <i>Erysiphe graminis</i> )   | <b>Interventi agronomici</b><br>- evitare le semine fitte<br>- concimazioni azotate equilibrate<br><b>Ruggini</b><br>( <i>Puccinia</i> spp.)<br>- varietà resistenti e tolleranti |   |     |     |                          |
| <b>Elmintosporiosi</b><br>( <i>Helminthosporium drechslera</i> =<br><i>Drechslera teres</i> )            | <b>Interventi agronomici</b><br>si consiglia di evitare il ristoppio  | Azoxystrobin<br>Pyraclostrobin<br>Procloraz<br>Protiococonazolo |     | 1*  | (*) Ammesso solo su orzo |
|  | <b>Interventi chimici</b><br>ammessa la concia del seme   | Bixafen<br>Fluxapyroxad   |     |     |                          |
|  | <b>Interventi chimici</b><br>- ammessi solo su orzo<br>- presenza<br>- stadio fenologico di foglia bandiera - inizio botticella   |   |     |     |                          |
|  |   |   |     |     |                          |
| <b>FITOFAGI</b>  |   |   |     |     |                          |
| <b>Afidi</b><br>( <i>Rhopalosiphum padi</i><br><i>Metopolophium dirhodum</i><br><i>Sitobion avenae</i> ) | <b>Interventi agronomici</b><br>- evitare le semine fitte<br>- concimazioni azotate equilibrate   |   |     |     |                          |

Regione Emilia-Romagna 2020

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità