

APPENDICE Tabella Organismi utili, microrganismi e sostanze minerali applicabili in IAF 16 – EDIZIONE 2021

| INSETTI e ACARI UTILI MICROORGANISMI SOSTANZE MINERALI | anguria | carota | cavolo | cetriolo | cicoria | fagiolino | finocchio | Endivia riccia e scarola | lattuga | melanzana | melone | patata | peperone | pomodoro da mensa in coltura protetta | pomodoro da industria | prezzemolo | radicchio | rucola | spinacio | zucca | zucchino |
|--|---------|--------|--------|----------|---------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------|----------|-------|----------|
| <i>Amblyseius andersoni</i> | x | | | x | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | x |
| <i>Amblyseius cucumeris</i> | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Amblyseius swirskii</i> | | | | x | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | |
| <i>Aphidius colemani</i> | x | | | x | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x |
| <i>Aphydoletes aphidimiza</i> | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Chrysoperla carnea</i> | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | | | | x |
| <i>Diglyphus isaea</i> | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Encarsia formosa</i> | | | | x | | | | | | x | | | | x | | | | | | | x |
| <i>Eretmocerus eremicus</i> | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Eretmocerus mundus</i> | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Macrolophus caliginosus</i> | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| <i>Orius laevigatus</i> | | | | x | | | | | | x | | | x | | | | | | | | x |
| <i>Phytoseiulus persimilis</i> | x | | | x | | | | | | x | x | | x | x | | | | x | | x | x |
| <i>Ampelomyces quisqualis</i> | x | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | | | | x |
| <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | |
| <i>Bacillus pumilus</i> | x | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | x | x |
| <i>Bacillus subtilis</i> | | | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| <i>Bacillus thuringiensis (min 4)</i> | | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| <i>Beauveria bassiana</i> | x | | x(1) | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x |
| <i>Coniothyrium minitans</i> | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | | x | | x |
| <i>Lecanicillium muscarium</i> | | | | x | | x | | | x | x | | | x | x | | | | | | | x |
| <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x |
| <i>Paecilomyces lilacinus</i> | x | x | | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x |
| <i>Pythium oligandrum</i> | x | | | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | | x |
| <i>Pseudomonas DSMZ</i> | | | x | | | | | | x | | | x | | | x | x | x | x | | | |
| <i>Streptomyces K61</i> | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| <i>Trichoderma spp.</i> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| <i>Virus Hear NPV nottua gialla</i> | x | | | x | | x | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | x | x |
| <i>Virus Spli NPV nottua med.</i> | | | | | | | | | x | x | | | x | x | | | | | x | | |
| Bicarbonato di potassio | x | | | x | | | | | | x | x | | x | x | | | | | | x | x |

Legenda: (1) autorizzato su cavolo a infiorescenza