

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE SOTTO IMPEGNI SRA19 AZIONE 3 - ANNUALITA' 2023**

<p><b>TUTTI GLI IMPEGNI</b></p>	<p>I sotto impegni di SRA19 - Azione 3 si applicano per l'intera superficie delle colture ammesse a premio e individuate tra quelle presenti nelle domande di sostegno, e per tutte le cinque annualità. Per il solo sotto impegno 8 la individuazione delle colture è variabile nelle 5 annualità.</p> <p>La superficie oggetto di aiuto può interessare superfici diverse nel corso del quinquennio di impegno e può ridursi anche oltre il 20% nelle singole annualità di impegno in funzione della variabilità del piano colturale. La verifica della tolleranza del 20% viene comunque eseguita tenendo conto della adesione annuale alle azioni delle colture individuate nella domanda di sostegno rispetto alla presenza delle stesse colture nel piano colturale annuale (ad eccezione del sotto impegno 8 come indicato precedentemente).</p> <p>Per le sole colture annuali è ammesso anche il caso di assenza di superfici di colture in una o più annualità: in tal caso l'aiuto non viene corrisposto, ma l'impegno viene mantenuto nelle annualità successive in caso di presenza delle colture nel piano colturale.</p> <p>In domanda di pagamento di ciascuna annualità è possibile escludere superfici di colture, o gruppi di colture, impegnati quando queste determinano variazioni in aumento delle superfici sotto impegno rispetto alla SOI della domanda di sostegno; la superficie ammissibile a premio verrà ricondotta in ogni caso entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.</p> <p><i>E' ammessa la possibilità di disimpegno annuale qualora le superfici impegnate con SRA 19-3 siano interessate da eventi climatici avversi ovvero in assenza di avversità fitopatologiche da trattare; in questo caso non verranno erogati gli aiuti previsti per la Azione 3 per l'annualità di riferimento, ma verrà consentita ai beneficiari la possibilità di mantenere l'impegno ed accedere agli aiuti nelle annualità successive.(modifica in applicazione di DGR 1291/2023).Tale disimpegno deve essere comunicato al responsabile del procedimento del SACP al momento della presentazione della domanda di pagamento o sua successiva rettifica.</i></p> <p>Nel caso di possibilità di adottare più opzioni all'interno di un singolo sotto impegno e per ciascuna coltura è richiesto che in ciascuna annualità venga adottata integralmente almeno una delle opzioni; le opzioni adottate devono essere riportate nella domanda di pagamento annuale.</p>	
<p><b>IMPEGNO</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE</b></p>	<p><b>DISPOSIZIONI APPLICATIVE</b></p>
<p><b>01 - Pomacee, Drupacee e Noce - Confusione e disorientamento sessuale</b></p>	<p><i>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</i></p> <p><i>Oppure</i> <i>Confusione (disorientamento) sessuale con dispenser biodegradabili</i></p> <p><i>Oppure</i> <i>Confusione sessuale in forma liquida</i></p>	<p>Applicazione secondo vincoli da etichetta (dosi/periodo/ecc.);</p> <p>Pomacee: per la confusione sessuale in forma liquida è richiesto un Nr. minimo di 8 interventi.</p> <p>Drupacee: per la confusione sessuale in forma liquida è richiesto un Nr. minimo di 5 interventi.</p> <p>Noce: per la confusione sessuale in forma liquida è richiesto un Nr. minimo di 8 interventi.</p> <p>Esclusione facoltativa, per tutte le specie, degli impianti in allevamento (=primi due anni)</p>
<p><b>02 - Frutticole - Difesa avanzata</b></p>	<p><b>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate</b></p> <p><i>Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens su Actinidia, Pero, Melo, Pesco, Albicocco Susino, Ciliegio (applicazione metodo, per difesa dalle batteriosi)</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio dolce su Melo e Pero (applicazione metodo per la difesa da ticchiolatura)</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Azadiractina su Melo (applicazione metodo per la difesa da afide grigio)</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio su Drupacee (applicazione metodo per la difesa da monilia)</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Bacillus thuringiensis su Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo (applicazione metodo per difesa da ricamatori e/o anarsia e/o tignola dell'olivo)</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Virus della granulosa su Melo, Pero e Noce (applicazione metodo per difesa da Cydia pomonella)</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Antocoride su Pero (applicazione metodo per difesa da Psylla piri )</i></p> <p><i>Oppure</i></p>	<p>Applicazione secondo vincoli da etichetta (dosi/periodo/ ecc.)</p> <p>Il numero di trattamenti è il numero minimo da applicare annualmente per ciascuna opzione.</p> <p>Esclusione facoltativa degli impianti in allevamento (=primi due anni)</p> <p>Nr. 2 interventi</p> <p>- Bicarbonato Nr. 3 interventi - Laminarina Nr. 4 interventi - Olio essenziale di arancio dolce Nr. 2 interventi</p> <p>Nr. 2 trattamenti</p> <p>Nr. 2 interventi</p> <p>Nr. 3 interventi</p> <p>Nr. 4 interventi</p> <p>Nr. 1 lancio</p>

	<p><i>Spinosad</i> su Olivo utilizzo con le formulazioni <i>Spintor fly</i> e <i>Tracer fly</i> (contro mosca)</p> <p>Oppure</p> <p><i>Aureobasidium pullulans</i>, su melo (contro <i>Gloesporium</i> o <i>Erwinia amylovora</i>) e su pero (contro <i>Erwinia amylovora</i>)</p>	<p>Nr. 3 applicazioni</p> <p>Nr. 2 interventi</p>
<b>03 - Vite - Confusione e antagonisti</b>	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per <i>Lobesia botrana</i> e/o <i>Planococcus ficus</i></p> <p>Oppure</p> <p><i>Anagyrus vladimiri</i> (pseudococci) (Cocciniglie farinose)</p>	<p>E' ammessa anche la confusione sessuale in forma liquida per la difesa da <i>Lobesia botrana</i> con un numero minimo di 6 interventi.</p> <p>Applicazione secondo vincoli da etichetta (dosi/periodo/ecc);</p> <p>Esclusione facoltativa degli impianti in allevamento (=primi due anni)</p> <p>Nr. 2 lanci Distribuire l'insetto con un dosaggio complessivo a stagione di min 1500 individui /ettaro in almeno 2 lanci differiti.</p>
<b>04 - Vite - Difesa avanzata</b>	<p><b>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</b></p> <p>Sostanze attive utilizzabili per la difesa da botrite: <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Aureobasidium pullulans</i>, <i>Pythium oligandrum</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, <i>Eugenolo-timolo-geraniolo</i>, <i>Trichoderma atroviride</i>, <i>Bicarbonato di potassio</i></p> <p>Oppure</p> <p><i>Cerevisane</i> (contro oidio, peronospora, botrite)</p> <p>Oppure</p> <p>Sostanze attive utilizzabili per la difesa da oidio: <i>Bicarbonato di potassio</i>, <i>Ampelomyces quisqualis</i>, <i>Bacillus pumilus</i>, <i>Cos-Oga</i></p> <p>Oppure</p> <p>Sostanze attive per la difesa da oidio e peronospora: <i>Olio essenziale di arancio dolce</i>, <i>Laminarina</i></p> <p>Oppure</p> <p><i>Trichoderma</i> (contro mal dell'esca)</p> <p>Oppure</p> <p><i>Bacillus thuringiensis</i> (contro tignoletta)</p>	<p>Applicazione secondo vincoli da etichetta (dosi/periodo/ ecc.)</p> <p>Il numero di trattamenti è il numero minimo da applicare annualmente per ciascuna opzione.</p> <p>Esclusione facoltativa degli impianti in allevamento (=primi due anni)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bacillus subtilis</i> Nr. 2 interventi</li> <li>- <i>Aureobasidium pullulans</i> Nr. 2 interventi</li> <li>- <i>Pythium oligandrum</i> Nr. 3 interventi</li> <li>- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Nr. 3 interventi</li> <li>- <i>Eugenolo-timolo-geraniolo</i> Nr. 3 interventi</li> <li>- <i>Trichoderma atroviride</i> Nr. 2 interventi</li> <li>- <i>Bicarbonato di potassio</i> Nr. 3 interventi</li> </ul> <p>Nr. 5 interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bicarbonato di potassio</i> Nr. 3 interventi</li> <li>- <i>Ampelomyces quisqualis</i> Nr. 2 interventi</li> <li>- <i>Bacillus pumilus</i> Nr. 4 trattamenti</li> <li>- <i>Cos-Oga</i> Nr. 3 interventi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> Nr. 2 interventi</li> <li>- <i>Laminarina</i> Nr. 4 interventi</li> </ul> <p>Nr. 1 intervento</p> <p>Nr. 2 interventi</p>
<b>05 - Orticole - Difesa avanzata</b>	<p><b>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</b></p> <p>Confusione sessuale (<i>Tuta absoluta</i> su pomodoro)</p> <p>Oppure</p> <p>Microorganismi e/o insetti utili in "Tabella Organismi utili e microorganismi applicabili in SRA19 Azione 3.05 Orticole - Difesa avanzata", riportata nella pagina WEB dei DPI RER (con indicazione delle colture interessate)</p> <p>Oppure</p> <p>mezzi non chimici su Patata per disseccamento in pre-raccolta.</p>	<p>Applicazione secondo vincoli da etichetta (dosi/periodo/ ecc.).</p>
<b>06- Orticole - Azioni agronomiche e diserbo avanzate</b>	<p>Pacciamatura biodegradabile (a norma UNI 11495) su Cetriolo, Cocomero, Fragola, Melanzana, Melone, Pomodoro, Zucchine, Lattughe, Insalate</p>	

<p><b>07 - Erbacee – Difesa avanzata</b></p>	<p><b>Su Mais:</b>  <i>Trichogramma e/o Bacillus thuringiensis per difesa da Piralide su mais con esclusione di trattamenti insetticidi specifici per piralide</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Oppure</i></p> <p><i>Aspergillus flavus (MUCL5491) come antagonista dei ceppi che producono aflatossine su mais per alimentazione animale</i></p>	<p>Applicazione secondo vincoli da etichetta o indicazioni d'uso per <i>Trichogramma</i> (dosi/periodo/ ecc.)</p> <p>Applicazione secondo vincoli da etichetta</p> <p>(Nota: Il prodotto è stato reso disponibile fino al 2022 compreso sul mercato con autorizzazione temporanea di impiego esclusivamente per il mais destinato ad uso zootecnico, in attesa della conclusione dell'iter di registrazione definitiva come fitofarmaco; è quindi necessario verificare lo stato della autorizzazione al momento dell'impiego)</p>
<p><b>08 - Erbacee e orticole - Trappole elateridi</b></p>	<p><i>Impiego trappole elateridi su superfici di seminativi e orticole in rotazione (applicato su superfici di colture variabili)</i></p> <p><i>Obbligo di comunicazione delle catture alla rete di monitoraggio regionale <a href="mailto:monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it">monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it</a> oppure con altro sistema di registrazione comunicato dalla Regione Emilia-Romagna</i></p>	<p>Elateridi</p> <p><u>Tipo di trappola:</u> le trappole a feromoni YATLORf per la cattura delle 3 specie di elateridi più diffuse in Emilia-Romagna: <i>Agriotes brevis</i>, <i>A. sordidus</i> e <i>A. litigiosus</i> con rilievi a cadenza mensile</p> <p><u>Numero di trappole:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 10 ettari: 3 trappole</li> <li>• oltre 10 ettari: 3 trappole per i primi 10 ettari+ 3 trappole ogni 10 ettari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogni 10 ettari dovranno essere installate 3 trappole posizionate liberamente sulla superficie da monitorare privilegiando le porzioni aziendali con maggiore rischio di presenza di elateridi</li> </ul> </li> </ul> <p>- <u>Monitoraggio:</u></p> <p><u>Inizio del monitoraggio:</u> a partire da metà marzo; sono previsti 5 rilievi con la presente tempistica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>fine maggio</u> <i>Agriotes brevis</i></li> <li>- <u>fine maggio</u> <i>Agriotes sordidus</i></li> <li>- <u>fine giugno:</u> <i>Agriotes sordidus</i> e <i>Agriotes litigiosus</i></li> <li>- <u>fine luglio:</u> <i>Agriotes litigiosus</i></li> <li>- <u>Fine agosto:</u> <i>Agriotes litigiosus</i></li> </ul> <p>- <u>Trasmissione dati:</u> annuale entro il 20 settembre all'indirizzo e-mail <a href="mailto:monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it">monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it</a> utilizzando l'apposita tabella oppure con altro sistema di registrazione comunicato dalla Regione Emilia-Romagna</p> <p>Ulteriori indicazioni per il monitoraggio sono riportate nella "Comunicazione Sotto impegno 8 azione 3 – SRA19"</p> <p>In relazione alla successione colturale è prevista la possibilità di riduzione della superficie fino al 20% rispetto a quelle indicate nella domanda di sostegno iniziale.</p>
<p><b>09 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque</b></p>	<p><i>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</i></p> <p><i>Su Mais divieto di utilizzo di Terbutilazina e S- Metolacor</i></p> <p><i>Su Pomodoro: divieto di S-Metolacor</i></p> <p><i>Su Barbabietola: divieto di utilizzo di Lenacil</i></p>	
<p><b>10 - Erbacee – Divieto impiego glifosate</b></p>	<p><i>Divieto di utilizzo di Glifosate sulle colture oggetto dell'impegno da scegliere con la domanda di pagamento fra le colture a semina o trapianto nel periodo gennaio fino a giugno per le quali è ammesso l'impiego di glifosate</i></p>	<p>Elenco colture:  Barbabietola da zucchero, Erba Medica (anno di semina), Girasole, Mais, Orzo, Pisello proteico, Riso, Soia, Sorgo</p>
<p><b>11 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro</b></p>	<p><i>Divieto di precessione del frumento duro con mais o sorgo</i></p>	<p>Per la sola annualità 2023 le superfici di frumento duro seminate su superfici che nel 2022 erano state coltivate a mais o sorgo possono essere escluse dall'aiuto; il vincolo della adozione del sottoimpegno 11 sull'intera superficie di frumento duro presente in azienda viene adottato a partire dalle semine 2023-24.</p> <p>Si precisa che per il frumento duro non è ammesso il ristoppio e quindi non può seguire un cereale autunno-vernino. Per ridurre il rischio di sviluppo della fusariosi, quando un frumento duro segue un cereale a ciclo primaverile</p>

		estivo i residui della precessione devono essere interrati con una lavorazione che effettui il rivoltamento del terreno
--	--	---