

Controllo integrato delle infestanti di PATATA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	Note
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
		Acido pelargonico	
		Napropamide	
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	(Metribuzin (*) + Flufenacet*) (2)(3)	(2) Sulla stessa particella impiegabile 1 volta ogni 3 anni
		(Diflufenican (*)+Metribuzin (*) (3)	(3) Prodotti il cui impiego è alternativo
		Metribuzin (*)	Non impiegare per le patate primaticce se dopo si coltiva lo spinacio
		(Metribuzin (*) + Clomazone)	
		Pendimentalin (*)	
		Metobromuron	
		Clomazone	
		Pyraflufen-ethyl (4)	(4) Non applicare in presenza del 5% di piante emerse
Prosulfocarb			
Aclonifen (*) (5)	(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata		
Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti anche a basse dosi con eventuali applicazioni ripetute
		Acido pelargonico (6)	(6) Applicazione nell'interfila. Si consiglia l'utilizzo di schermatura
	Dicotiledoni	Metribuzin (*)	
	Graminacee	Propaquizafop	Usando Rimsulfuron impiego non strettamente necessario
		Ciclossidim	
		Clethodim	
Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile isomero D			
Pre-raccolta	Disseccamento parte aerea		Si consiglia di applicare nei 10 giorni che precedono la raccolta e nel rispetto del tempo di carenza
		Pyraflufen-ethyl	
		Carfentrazone (6)	(5) Al massimo 2 litri all'anno
		Acido Pelargonico	

(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro

di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha ammissibili}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate

nel rispetto dell'etichetta del formulato

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile ed impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione indicate in grassetto: 4

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)