

DISERBO FRUMENTO

EPOCA	INFESTANTI		SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate	Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha
Pre emergenza	Graminacee e		Triallate + Diflufenican	
Post emergenza precoce	Dicotiledoni		Diflufenican Bifenox	
Post emergenza	Dicotiledoni		Fluroxipir (Clopiralid + MCPA + fluroxipir)	
	Dicotiledoni	ALS	Tifensulfuron-metile Metsulfuron metile Tribenuron-metile Triasulfuron Florasulam Prosulfocarb (Florasulam + bifenox) (Tribenuron-metile + MCPP-P) Tritosulfuron	
	Dicotiledoni con graminacee	ALS + ACCasi	(Iodosulfuron+fenoxaprop-p-etile+antidoto) (Clodinafop+pyroxsulam + antidoto) (Clodinafop+pinoxaden+florasulam+antidoto)	
	Dicotiledoni e Graminacee	ALS (A)	(Propoxicarbazone+iodosulfuron+amidosulfuron+antidoto) (5)  (Propoxycarbazone+iodosulfuron+antidoto)  (Iodosulfuron+mesosulfuron-metile+antidoto)  (Iodosulfuron+mesosulfuron-metile+antidoto)  (Pyroxulam + florasulam + antidoto)	(A) (B) Nei diversi anni si raccomanda di alternare sullo stesso appezzamento l'impiego dei prodotti con i due meccanismi d'azione ALS e ACCasi.  (A) (B) Si consiglia di evitare miscele estemporanee di ACCasi e ALS con attività graminicida
	Graminacee	ACCasi (B)	Tralkoxidim Diclofop-metile (Pinoxaden + antidoto) (Fenoxaprop-p-etile + antidoto ) (Clodinafop+antidoto)	
Pre o post emergenza	Graminacee		Chlorotoluron (3)	(3) Vincolante: sullo stesso appezzamento impiegabile al massimo una volta ogni 5 anni
Post emergenz	Dicotiledoni		Bromoxynil (4)	4) Impiegabile al massimo una volta ogni 5 anni