

DIFESA INTEGRATA CASTAGNO

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Cancro della corteccia (<i>Cryphonectria parasitica</i>)	Interventi agronomici eliminazione delle branche disseccate Interventi chimici interventi localizzati sulle parti colpite	Prodotti rameici	6 Kg*		(*) In 1 anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Mal dell'inchiostro (<i>Phytophthora cambivora</i>)	Interventi agronomici - evitare i ristagni idrici - eliminare i primi centri di infezione - isolare l'area infetta dalle zone limitrofe Interventi chimici interventi localizzati sulle piante colpite nelle prime fasi di sviluppo dell'avversità	Prodotti rameici	6 Kg*		(*) In 1 anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Fersa o seccume (<i>Mycosphaerella maculiformis</i>)	Interventi agronomici eliminare e distruggere le parti disseccate				
FITOFAGI					
Tortrice precoce (<i>Pammene fasciana</i>)	Interventi chimici non ammessi				
Tortrice intermedia (<i>Cydia fagiglandana</i>)	Interventi agronomici - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	Nematodi entomopatogeni			
Tortrice tardiva (<i>Cydia splendana</i>)	Interventi agronomici - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	Nematodi entomopatogeni			
Balanino (<i>Curculio elephas</i>)	Interventi agronomici - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	<i>Beauveria bassiana</i>			
Cinipide del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	Interventi agronomici evitare il taglio autunnale delle galle per non danneggiare gli eventuali parassitoidi indigeni Interventi chimici non ammessi				