

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI - ACTINIDIA

INFESTANTI	CRITERI	SOSTANZA ATTIVA	g/l	% s.a.	Dose l/ha all'anno
Graminacee e Dicotiledoni	<p>Interventi agronomici operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno</p> <p>Interventi chimici non ammessi interventi chimici nelle interfile</p> <p>Interventi localizzati sulle file operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo Ripetere le applicazioni in base alle necessità Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale</p> <p>L'uso di diserbanti può essere opportuno quando vi siano: - rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - impianti di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici</p>	Glifosate	360	30,40	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi: 9 l/ha
		Pyraflufen-ethile (1) Carfentrazone	26,50 60	2,60 6,45	1,6 l/ha 2 l/ha
Graminacee e Dicotiledoni	Solo nei primi 3 anni di allevamento	Oxadiazon	380	34,10	4

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila
L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie
(1) Impiegabile come spollonante oppure come diserbante fogliare