

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI - CILIEGIO

INFESTANTI	CRITERI	SOSTANZA ATTIVA	g/l	% s.a.	Dose l/ha all'anno
Graminacee e Dicotiledoni	Interventi agronomici Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno				Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi:
	Interventi chimici Non ammessi interventi chimici nelle interfile	Glifosate	360	30,40	9 l/ha
	Interventi localizzati sulle file operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo Ripetere le applicazioni in base alle necessità Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale				
	L'uso di diserbanti può essere opportuno quando vi siano: - sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a 1,5 /2 m - rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici	Isoxaben (3) Fluazifop-p-butyle Pyraflufen-ethile (2) Quizalofop-p-etile	500 125 26,50 50	45,50 13,40 2,60 5,40	1,2 l/ha 2 1,6 l/ha 1-3 l/ha
Graminacee e Dicotiledoni	Solo nei primi 3 anni di allevamento	Isoxaben (3) Oxyfluorfen (1) Diflufenican (Diflufenican + Glifosate) (4)	500 (* 500 (40 + 250)	45,50 (* 42 (3,48 + 21,76)	1,2 l/ha (* 0,5 l/ha 6 l/ha

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie

(1) Applicare al massimo sul 30% della superficie e utilizzare solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio

(*) Per la dose da impiegare fare riferimento al formulato

(2) Impiegabile come spollonante oppure come diserbante fogliare

(3) Applicare al massimo sul 30% della superficie e in inverno fino alla fioritura

(4) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura