

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI - POMACEE

INFESTANTI	CRITERI	SOSTANZA ATTIVA	g/l	% s.a.	Dose l/ha all'anno		
Graminacee e Dicotiledoni	Interventi agronomici Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno				Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi:		
	Non ammesse lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione						
	Interventi chimici Non ammessi interventi chimici nelle interfile	Glifosate			9 l/ha		
	Interventi localizzati sulle file operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo						
	Ripetere le applicazioni in base alle necessità						
	Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale						
	L'uso di diserbanti può essere opportuno quando vi siano: - sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a 1,5 / 2 m - le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per i pero portanesti cotogni e BA29, per il melo M9 e M26) - rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici						
			Isoxaben (3)	500		45,50	1,2 l/ha
			Quizalofop-p-etile	50		5,40	1-3 l/ha
			Pyraflufen-ethyle (4)	26,50		2,60	1,6 l/ha
	Carfentrazone (4)		60	6,45		2 l/ha	
	Ciclossidim		100	10,90		2 - 4	
	Fluroxypir (5)	20	200	2			
	MCPA (2)	222	20,60	3,8 l/ha			
Graminacee e Dicotiledoni	Solo nei primi 3 anni di allevamento	Isoxaben (3)	500	45,50	1,2 l/ha		
		Pendimetalin	455	38,72	2		
		Oxadiazon	380	34,10	4		
		Oxifluorfen (1)	(*)	(*)	(*)		
		Diflufenican	500	42	0,5 l/ha		
		(Diflufenican + Glifosate)	(40 + 250)	(3,48 + 21,76)	6 l/ha		

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie

(1) Applicare al massimo sul 30% della superficie e utilizzare solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio

(*) Per la dose da impiegare fare riferimento al formulato

(2) Fare attenzione al rispetto del periodo di carenza che è di 80 giorni

(3) Applicare al massimo sul 30% della superficie e in inverno fino alla fioritura

(4) Impiegabile come spollonante (0,9-1 l/ha per intervento) o come erbicida fogliare (0,25-0,3 l/ha per intervento)

(5) Non ammesso su pero