INFESTANTI	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZA ATTIVA	% s.a.	Dose l/ha all'anno
Graminacee e Dicotiledoni	**Interventi agronomici** operare con gli inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno **Interventi chimici** - nei periodi compresi tra 1 gennaio – 30 giugno e 16 settembre – 31 dicembre gli interventi chimici di diserbo vengono ammessi esclusivamente sulla fila per cui la superficie effettivamente trattata deve essere al massimo pari al 50% della della superficie complessiva del noccioleto - nel periodo 1 luglio – 15 settembre sono permessi interventi chimici di diserbo sull'intera superficie del noccioleto Esclusivamente nei noccioleti con pendenze pari o superiori al 15% è ammesso il diserbo chimico sull'intera superficie senza limitazioni temporali di alcun tipo Gli interventi localizzati sulle file devono essere operati con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo Ripetere le applicazioni in base alle necessità L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a metri 3,5 – 4 - vi siano impianti con impalcature basse e dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici - vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)	Glifosate Pyraflufen ethyle Carfentrazone (1) Fluazifop-p-butyle (2) Quizalofop-p-etile	30,40 2,6 6,45 13,40	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi 9 l/ha 1,6 1 l/ha 2 l/ha

(1) Impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha oppure come diserbante fogliare con dosi di 0,3 l/ha
(1) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro
(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 1 l/ha