

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI - NOCE

INFESTANTI	CRITERI	SOSTANZA ATTIVA	g/l	% s.a.	Dose l/ha all'anno
Graminacee e Dicotiledoni	Interventi agronomici Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno				Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi: 9 l/ha 1-3 l/ha
	Interventi chimici Non ammessi interventi chimici nelle interfile				
	Interventi localizzati sulle file operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo Ripetere le applicazioni in base alle necessità Con infestazioni in atto sono consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale L'uso di diserbanti può essere opportuno quando vi siano: - rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici	Glifosate	360	30,40	
		Quizalofop-p-etile	50	5,40	
Graminacee e Dicotiledoni	Solo nei primi 3 anni di allevamento	Pendimetalin (2) (Diflufenican + Glifosate) (1)	365 (40 + 250)	31,70 (3,48 + 21,76)	2,50 6 l/ha

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 30% dell'intera superficie

(1) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura

(2) Utilizzabile nei primi 4 anni localizzato sulla fila