

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI - OLIVO

INFESTANTI	CRITERI	SOSTANZA ATTIVA	g/l	% s.a.	Dose l/ha all'anno
Graminacee e Dicotiledoni	Interventi agronomici Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno				Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi:
	Interventi chimici Non ammessi interventi chimici nelle interfile	Glifosate	360	30,40	9 l/ha
	Interventi localizzati sulle file operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo Ripetere le applicazioni in base alle necessità Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale L'uso di diserbanti può essere opportuno quando vi siano: - sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a 1,5 /2 m - rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.	Flazasulfuron Pyraflufen-ethile (1) Carfentrazone (2)	250 26,50 60	25 2,60 6,45	0,06 l/ha 1,6 l/ha 1 l/ha
Graminacee e Dicotiledoni	Solo nei primi 3 anni di allevamento	Oxadiazon Diflufenican	380 500	34,10 42	4 0,5 l/ha

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie

(1) Impiegabile come spollonante oppure come diserbante fogliare

(2) Impiegabile come spollonante (0,9-1 l/ha per intervento) o come erbicida fogliare (0,3 l/ha per intervento)