

DIFESA CARDO

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
MALATTIE FUNGINE Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) Maculatura anulare, malattie delle macchie brune (<i>Ramularia cynarae</i>)		Prodotti rameici	6 Kg*		(*) In 1 anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Oidio (<i>Leveillula</i> spp.)		Zolfo			
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	<u>Interventi agronomici</u> - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno <u>Interventi chimici</u> in presenza di prolungate bagnature	<i>Pythium oligandrum</i>			
BATTERIOSI (<i>Erwinia carotovora</i> var. <i>carotovora</i>)		Prodotti rameici	6 Kg*		(*) In 1 anno al massimo 6 kg di s.a./ha
FITOFAGI					
Afidi (<i>Capitophorus eleagni</i>)		Imidacloprid Tau fluvalinate Piretrine pure	1 2		
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Vanessa (<i>Vanessa cardui</i>) Depressaria (<i>Agonopterix</i> spp.)	<u>Soglia di intervento</u> 6-10 mine / foglia	<i>Bacillus thuringensis</i>			
Altri fitofagi occasionali: Cassida (<i>Cassida deflorata</i>) Punteruoli (<i>Larinus cynarae</i>) Mosca (<i>Agromyza andalusiana</i>) Altica (<i>Sphaeroderma rubidum</i>)	<u>Interventi chimici</u> intervenire in presenza di infestazioni diffuse	Piretrine pure			
Nottue fogliari (<i>Hydroecia xanthenes</i> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Spodoptera exigua</i>)	<u>Soglia di intervento</u> presenza	Tau fluvalinate	2		
Lumache e Limacce (<i>Helix</i> spp. <i>Limax</i> spp.)	<u>Trattamenti localizzati</u>	Metaldeide esca Fosfato ferrico			