

## DISERBO FAVINO

| EPOCA                                     | INFESTANTI                             | SOSTANZA ATTIVA                                      | NOTE   |
|---|--|--|--|
| Pre-semina                                | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni        | Glifosate (1)  | (1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree |
| Pre-emergenza                             | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni        | Pendimetalin<br>Clomazone<br>Aclonifen<br>Metribuzin |  |
| Pre-emergenza o<br>Post-emergenza precoce | Dicotiledoni<br>e<br>alcune Graminacee | Imazamox   |  |
| Post-emergenza                            | Graminacee                             | Ciclossidim<br>Propaquizafop<br>Quizalofop-p-etile   |  |
|   | Dicotiledoni                           | Bentazone  |  |

**(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha}$  ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.