

DISERBO MAIS

EPOCA	INFESTANTI		SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina o Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni		Dimetenamide-p Pendimetalin Terbutilazina (2) S-Metolaclo (3) Aclonifen (4) Pethoxamide Clomazone Isoxaflutolo (5) Flufenacet Thiencarbazone-methyl (6)	(2) Impiegabile in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) oppure impiegabile in post-emergenza sul 50% della superficie a mais (2) In 1 anno impegnabile al massimo 750 g/ha di sostanza attiva di Terbutilazina e solo coformulato con altre sostanze attive (3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) oppure impiegabile in post-emergenza sul 50% della superficie a mais (4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) (5) Impiegabile solo in pre o post emergenza (6) Al massimo 1 intervento all'anno
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	HPPD HPPD ALS ALS HPPD	Terbutilazina (2) Pendimetalin Isoxaflutolo (5) Dimetenamide-P Thiencarbazone-methyl (6) S-Metolaclo (3) Sulcotrione Mesotrione	Nei terreni torbosi con più del 2,5% di sostanza organica, dove non si effettua il pre emergenza: - si raccomanda l'impiego tutti gli anni di ALS ad azione graminicida - se si tratta contro le graminacee opportuno l'uso di HPPD (Mesotrione, Tembotrione, Sulcotrione) almeno una volta ogni 2 anni
	Graminacee e Dicotiledoni		Rimsulfuron (7) Nicosulfuron Tembotrione (8) Terbutilazina (2) Sulcotrione Mesotrione Foramsulfuron	(7) Possibile ripetere il il trattamento con dosi dimezzate (8) In pre-emergenza o post-emergenza precoce
Post-emergenza	Dicotiledoni		Tifensulfuron - metile Tritosulfuron Florasulam Prosulfuron (9) Piridate Clopiralid Dicamba Fluroxipir	(9) Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
	Equisetum		MCPA (10)	(10) Al massimo sul 10% della superficie aziendale destinata a mais

I trattamenti in post emergenza precoce sono alternativi a quelli in pre-emergenza.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.