

DIFESA INTEGRATA COLZA

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | S. A. E AUSILIARI | (1) | (2) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|--|---|-------------------|-------|-----|--|
| CRITTOGAME (<i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Peronospora parasitica</i>) | Non sono ammessi interventi chimici | | | | |
| FITOFAGI | | Fluvalinate | | | |
| Meligete (<i>Meligethes aeneus</i>) | Soglia 3 meligeti/pianta Intervenire prima dell'apertura dei fiori | Cipermetrina | 1 | 2 | |
| | | Acetamiprid | 1* | | |
| Afide (<i>Brevicoryne brassicae</i>) | Soglia 2 colonie/mq | Deltametrina | | | |
| | | Fluvalinate | | 2 | |
| | | Esfenvalerate | 1 | | |
| | | Labdacialotrina | | | |
| Altica Punteruolo Nottue | Soglia presenza accertata | Deltametrina | | | |
| | | Fluvalinate | | | |
| | | Cipermetrina | 1 (*) | 2 | (*) Impiegabile solo su altica |
| | | Labdacialotrina | 1** | | (**) Tra Labdacialotrina e Esfenvalerate |
| | | Acetamiprid | 1* | | (*) Impiegabile solo su altica |

Regione Emilia-Romagna 2019

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità