

Controllo integrato delle infestanti di SPINACINO e baby leaf in coltura protetta

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	BABY LEAF	NOTE
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	si si	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Pre-semina Pre-emergenza	Dicotiledoni	Lenacil Metamitron	si si	Non controlla Amaranto, Veronica e Solanum
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolaclor (2) Lenacil Cloridazon (3) + Metamitron	si si si	(2) Impiegabile solo tra febbraio e agosto (3) Al massimo 2,6 kg di s.a. in tre anni sullo stesso appezzamento
Post-emergenza	Graminacee	Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop	si no si	

(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha}$ ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.