

Difesa integrata MAIS DOLCE

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Carbone comune (<i>Ustilago maydis</i>)	Interventi agronomici - concimazione equilibrata - ampie rotazioni - raccolta e distruzione dei giovani tumori prima che lascino fuoriuscire le spore				
Marciume del fusto (<i>Gibberella zeae</i>)	Interventi agronomici - evitare le semine troppo fitte - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici - fare ricorso a ibridi resistenti o tolleranti				
BATTERIOSI					
Batteriosi (<i>Erwinia stewartii</i> <i>Erwinia chrysanthemi</i>)	Si richiede la segnalazione tempestiva della eventuale presenza in campo di questa malattia per poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della coltura colpita				
VIROSI					
Virus del nanismo maculato del mais (MDMV) Virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV)	Interventi preventivi eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno e in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti del virus)				
FITOFAGI					
Elateridi (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi agronomici evitare la coltura in successione a prati stabili per almeno 2 anni In caso di successione a medica, operare nel modo seguente: - rompere i medica in quell'estate precedente in modo che la maggior parte delle larve subisca l'azione negativa del secco estivo - rompere il prato immediatamente prima di seminare in modo che gli eventuali elateridi si approfondiscano temporaneamente - con infestazioni in atto, eseguire sarchiature ripetute per creare un ambiente sfavorevole alle larve				I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.
	Interventi chimici Soglia alla semina presenza accertata secondo le modalità indicate nella tabella 23 (Norme Generali)	Cipermetrina Lambdacialotrina Zetacipermetrina Teflutrin Spinosad	(*) (*)	1	(*) Da non considerare nel limite dei Piretroidi
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	Interventi agronomici sfibratura degli stocchi e aratura tempestiva	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
	Interventi chimici a cattura avvenuta dell'adulto con appropriate trappole a feromoni	Betacyflutrin Deltametrina Lambdacialotrina Indoxacarb Clorantraniliprole Spinosad		2* 1 2 3	(*) Tra tutti i Piretroidi

Regione Emilia-Romagna 2020

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata MAIS DOLCE

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE		
Nottue terricole <i>(Agrotis spp.)</i>	<u>Interventi chimici</u>						
	Soglia						
	presenza diffusa di attacchi iniziali						
	Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo localizzato Danni soprattutto alle colture in primo raccolto con infestazioni cicliche	Deltametrina			2*	(*) Tra tutti i Piretroidi	
		Labdacialotrina	1				
		Betacyflutrin					
Nottue fogliari <i>(Helicoverpa armigera</i> <i>Spodoptera spp.)</i>	<u>Interventi chimici</u>						
	Soglia						
	presenza diffusa di attacchi iniziali						
		Clorantraniliprole		2			
		Labdacialotrina	1		2*	(*) Tra tutti i Piretroidi	
		Betacyflutrin					
Afidi dei cereali <i>(Rhopalosiphum padi</i> <i>Metopolophium dirhodum</i> <i>Sitobion avenae</i> <i>Schizaphis graminum)</i>	<u>Interventi chimici</u>						
	Soglia						
	presenza di colonie sulle pagine inferiori						
		Maltodestrina					
		Deltametrina				2*	(*) Tra tutti i Piretroidi
		Labdacialotrina	1				
	Betacyflutrin						
	Pirimicarb		1				

Regione Emilia-Romagna 2020

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità