

DIFESA INTEGRATA RISO DA SEME

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.)	Interventi chimici concia del seme				Consigliata la concia delle sementi
Elmintosporiosi (<i>Drechslera oryzae</i>)	Interventi chimici tra botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali	Azoxystrobin (Difenoconazolo + Azoxystrobin) Flutriafol Trifloxystrobin		1*	(*) Complessivamente 1 solo intervento fungicida all'anno
Brusone delle foglie (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Interventi chimici tra botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali Interventi agronomici - fare uso di varietà tolleranti - evitare somministrazioni eccessive di azoto - evitare semine troppo ritardate - evitare semine troppo fitte	(Difenoconazolo + Azoxystrobin) Azoxystrobin Flutriafol Trifloxystrobin		1*	(*) Complessivamente 1 solo intervento fungicida all'anno Sono ammessi 2 interventi sulle varietà sensibili gruppo Carnaroli e consimili
FITOFAGI CROSTACEI					
Coppette (<i>Triops cancriformis</i>)	Interventi agronomici asciutta				
INSETTI					
Ditteri Chironomidi (<i>Chironomus</i> spp., <i>Cricotopus</i> spp.)	Interventi agronomici asciutta				
Ditteri Efrididi (<i>Hidrella griseola</i>)	Interventi agronomici asciutta				Non sono ammessi interventi chimici
VERMI					
Vermi di risaia (<i>Brachyura</i> spp.)	Interventi agronomici asciutta				Non sono ammessi interventi chimici