

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>CRITTOGAME</b>					
<b>Patogeni tellurici</b> ( <i>Rhizoctonia</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. etc.)	<u>Interventi agronomici</u> - impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali - limitati apporti di azoto <b>- impiego di seme conciato</b>				
<b>Peronospora e Antracnosi</b> ( <i>Peronospora pisi</i> ) ( <i>Ascochyta</i> spp.)	<u>Interventi agronomici</u> - ampie rotazioni colturali - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato - impiego di varietà resistenti <u>Interventi chimici</u> <b>solo in caso di attacchi precoci</b> Si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7-8 giorni	Prodotti rameici Cimoxanil Azoxystrobin (Pyraclostrobin Boscalid ) Fluxapyroxad+difenconazolo	(*) <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b>	<b>3</b> <b>3</b> <b>2*</b>	<b>(* Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno</b> <b>(* Tra Fluxapyroxad e Boscalid</b> <b>(* Massimo 1 intervento tra Tebuconazolo e Difenconazolo</b>
<b>Mal bianco</b> ( <i>Erysiphe polygoni</i> )	<u>Interventi agronomici</u> impiego di varietà resistenti <u>Interventi chimici</u> giustificato solo in caso di attacco elevato	Zolfo Bicarbonato di potassio Azoxystrobin (Pyraclostrobin Boscalid ) Tebuconazolo Penconazolo	<b>8</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>1*</b>	<b>3</b> <b>2</b>	<b>(* Massimo 1 intervento tra Tebuconazolo e Difenconazolo</b>
<b>Ruggine</b> ( <i>Uromyces pisi</i> )	<u>Interventi chimici</u> <b>- solo in caso di attacchi precoci</b>	Tebuconazolo Pyraclostrobin	<b>1*</b> <b>1*</b>		<b>(* Massimo 1 intervento tra Tebuconazolo e Difenconazolo</b> <b>(* Massimo 2 interventi tra Pyraclostrobin e Pyraclostrobin + Boscalid</b>
<b>Muffa grigia</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<u>Interventi chimici</u> da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e piogge frequenti	(Fludioxonil + Cyprodinil) Fludioxonil	<b>(*)</b>	<b>2</b>	<b>(* Autorizzato solo su pisello mangiatutto</b>
<b>BATTERIOSI</b>					
( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisii</i> )	<u>Interventi agronomici</u> - impiego di seme controllato. - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici				
<b>VIOSI</b>					
(PSBMV)	Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non persistente valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) è di fondamentale importanza l'uso di seme sano (virus-esente)				
<b>FITOFAGI</b>		<b>Al massimo 1 trattamento contro questa avversità</b>			
<b>Afide verde e Afide nero</b> ( <i>Acythosiphon pisum</i> <i>Aphis fabae</i> )	<u>Interventi chimici</u> <b>Intervenire in presenza di infestazioni diffuse e colonie in accrescimento</b>	Maltodestrine Pirimicarb Betacyflutrin Cipermetrina Deltametrina Tau-Fluvalinate Lambdacialotrina Acetamiprid	<b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	<b>2*</b>	<b>(* Tra tutti i Piretroidi e il Pirimicarb</b>

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>Mamestra</b> <i>(Mamestra brassicae)</i>	<b>Interventi chimici</b> intervenire in presenza di infestazioni diffuse, indicativamente 1 larva/mq	Al massimo 1 trattamento contro questa avversità			
		Betacyflutrin		2*	(*) Tra tutti i Piretroidi e il Pirimicarb
		Cipermetrina	1		
		Deltametrina			
		Lambdacialotrina	1		
		Spinosad	1		
Emamectina	1				
<b>Elateridi</b> <i>(Agriotes spp.)</i>	<b>Indicazione d'intervento</b> infestazione generalizzata accertata mediante specifici monitoraggi secondo le modalità riportate nella Tabella 23 (Norme Generali)				