

Controllo integrato delle infestanti di RAVANELLO DA SEME

| EPOCA          | INFESTANTI                | SOSTANZA ATTIVA   | Note   |
|----------------|---------------------------|---|--|
| Pre-semina     | Dicotiledoni e Graminacee | Glifosate (1)<br>Acido pelargonico                      | (1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree |
| Post-emergenza | Graminacee                | Ciclossidim<br>Fluazifop-p-butile<br>Quizalofop-p-etile |  |

**(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha ammissibili}$  è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.