

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila per tutti i diserbanti; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie totale del frutteto				
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1) Glifosate (1) + 2,4 D (2)	(1) Al massimo 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l (2) Al massimo 1 applicazione
		Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizafop Fluazifop-p-butyle	
		Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen ethyle (3) Carfentrazone (4)	(3) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 l/ha (4) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e al massimo 1 l/ha come spollonante
Allevamento (fino a 3 anni) e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	(Isoxaben + Oryzalin) (5)	(5) Al massimo 5 l/ha in allevamento da dormienza a fine fioritura, al massimo 3,75 l/ha impianti in produzione da dormienza a pre-fioritura
			Diflufenican (6)(7) Pendimetalin (7) Oxyfluorfen (7)	(6) Solo in miscela con glifosate (7) In produzione al massimo un intervento tra pendimetalin, diflufenican e oxyfluorfen

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

È permesso un intervento chimico sull'intera superficie in pre-raccolta

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

- vi sia, sulle file, una distanza tra pianta e pianta inferiore a metri 3,5 – 4
- vi siano impianti con impalcature basse e dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici
- vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

Agronomico:

operare con gli inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno